

Bot.

o.

183^a

B. X.

PFLANZEN - KALENDER

oder

V e r s u c h

einer

A n w e i s u n g

welche

Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe

finden könne

und

auf welchem Standorte.

Von

F. A. H e y n e

Herzoglich Sächsischer Rath.

E r s t e s H e f t.

Leipzig,

bey Johann Ambrosius Barth.

1804.

PLANTEN - KALENDER

oder

Versuch

einer

A. M. W. C. S. H. G.

weiche

Planten sind in jedem Monat in ihrer Blüte

haben können



F. A. H. v. M.

Herausgegeben von F. A. H. v. M.

Erster Heft

Leipzig

bei Johann Ambrosius Barth

1804

VORERINNERUNG.

Da das Pflanzenreich dem Menschen und bey-
nahe allen lebenden Geschöpfen bey weitem den
größten Theil der Nahrungsmittel liefert — da
aus ihm wir, und gewifs eine ansehnliche Zahl
der übrigen Bürger der Thierwelt, die heilsam-
sten Arzneymittel holen — da es uns in andern
Rücksichten die dringendsten Bedürfnisse auf
das vollkommenste befriedigt — da es die Erde
erst zu dem angenehmen und reizenden Aufent-
halte macht, der sie ist — da es mehrern unsern
Sinnen unmittelbar, und allen mittelbar, das
mannigfaltigste und höchste Vergnügen gewährt
— da es zu jeder Stunde des Tages, und an je-
dem Tage des Jahres, den gefühlvollen und den-
kenden Anbeter zu ihm hinführt — ; so darf man

sich wohl nicht wundern, wenn man der Botanik, welche uns die Körper des Pflanzenreichs kennen lehrt, beynahe allgemein das Lob einer der lieblichsten und interessantesten Wissenschaften beylegt.

Aber man macht auch beynahe noch allgemeiner dieser lieblichen Wissenschaft den Vorwurf, daß sie mit außerordentlichen Schwierigkeiten verknüpft wäre. Man hat Recht, wenn man damit die höhere Botanik meynt, die das Geschäft und das Eigenthum der eigentlichen Botaniker von Profession, der Gesetzgeber in dieser Wissenschaft ist, wie wir sie bey einem Linnée, Joh. Hedwig, Hoffmann, Rothe, Schreber, Schkuhr, Wildenow und mehreren andern Veteranen dieser Doctrin zu suchen haben. Man hat Unrecht, wenn man es von der Botanik für das häusliche und bürgerliche Leben versteht; denn diese setzt bloß die Kenntniß irgend eines Systems, vorzüglich des leichtesten und anschaulichsten, des Linnéischen Sexual-Systems, voraus. Dieses aber zu fassen, dazu reicht bey nur einiger Aufmerksamkeit selbst der noch wenig geübte Verstand eines Kindes von acht Jahren in den meisten Fällen schon voll-

kommen aus; und zu dem Geschäfte der Deutlichmachung des genannten Linnéischen Systems selbst möchte wohl jeder Botaniker in einem blumenreichen Monat, z. B. im May, Juny u. s. w. über eine Stunde Zeit nicht bedürfen. Ist aber das System einmal gefast, so ist alsdann auch mit wenig Mühe die Fertigkeit erworben, die gefundenen und noch unbekannten Pflanzen an ihren gehörigen Ort zu setzen, und sich aus irgend einem guten botanischen Handbuche über den Namen, die Eigenheiten, den Nutzen oder Schaden derselben näher zu belehren.

Ich habe selbst mehrere auffallende Erfahrungen über die Wahrheit dieser Behauptung gemacht, und ich erlaube mir, wenigstens eine davon hiermit anzuführen. Ich fand nämlich, es sind schon mehrere Jahre her, eine Pflanze, welche nicht gar zu häufig wächst, und welcher ich längst nachgegangen war, um sie in meiner Pflanzensammlung nicht fehlen zu lassen. Mein darüber bezeigtes Vergnügen machte die mich begleitende Gesellschaft aufmerksam. Ein Theil wunderte sich, wie ich über so eine kleine und gar nicht ansehnliche Pflanze eine so große

Freude haben könnte, und der andere Theil fragte, was es denn nun eigentlich für eine Wunderblume wäre, und wie sie genannt würde. Ich konnte mich in der That nicht sogleich des systematischen Namens der Pflanze entsinnen, versicherte aber, daß sie ihn erfahren sollten, sobald wir in die Wohnung zurückkehrten, wo ich das treffliche botanische Handbuch des wackern Schkuhr in meinem Koffer hatte.

„Sie können uns jeden beliebigen Namen nennen,“ fing der Kammerherr an, „denn wir können Sie keiner Unwahrheit beschuldigen, da wir Alle zusammen von der Botanik nicht mehr verstehen, als mein Kanarienvogel von der Baukunst.“

„Nicht jeden beliebigen Namen, Herr Kammerherr, sondern den, welchen sie bey den Botanikern in allen Ländern Europens und selbst in den übrigen Welttheilen führt, und den sollen Sie mir selbst, oder eine Ihrer drey Fräulein Töchter da nennen.“

Die drey lieblichen Geschöpfe, von welchen die Älteste dreyzehn und die Jüngste neun Jahr

war, wurden hochroth darüber, daß ich ihnen eine Weisheit zutraute, von welcher sie selbst noch nicht das Geringste geahnet hatten.

„Da haben Sie sich sehr schlimm addressirt, Herr R.,“ fuhr der Kammerherr fort.

„Nicht so schlimm, als Sie meynen, und die Erfahrung wird mich rechtfertigen. Jetzt bitte ich blos um die Erlaubniß, Ihnen allseits einige Worte über die Klassen und Ordnungen zu sagen, in welche einer der scharfsinnigsten Naturforscher, der Ritter Linné, das ungeheuer zahlreiche Pflanzen-Heer gestellt hat, um doch einigermaßen dasselbe übersehen zu können.“

Es geschah, man war aufmerksam, als wenn der Stein der Weisen gefunden werden sollte, und fleißig im Blumenabpflücken, um das, was ich gesagt hatte, noch mehr zu versinnlichen. Nach einer halben Stunde kamen wir wieder zurück, und man forderte mir nun freywillig die oben gefundene Pflanze und das Buch ab, weil man sich schon selbst zutraute, den Namen der Pflanze vielleicht finden zu können.

Es dauerte auch gar nicht lange, so erscholl es unter lauter Jubel: „Es ist die Europäische

Trientale, die Europäische Trientale, nicht wahr, Herr R.?"

„Richtig, die Europäische Trientale. Nun Herr Kammerherr, hatte ich mich schlimm addressirt?"

„Aber warum kann es denn keine andere seyn, lieben Kinder?" fing der betroffene Kammerherr an.

„Hören Sie nur, lieber Vater, die Pflanze ist hier so genau beschrieben, daß sie gar nicht zu verkennen ist. Sie hat sieben Staubfäden und einen Staubweg, gehört also in die siebente Klasse und erste Ordnung; sie hat ferner einen in sieben Blättchen getheilten Kelch, und ein rad- oder sternförmig getheiltes Blumenblatt. Alles, Alles trifft zu, sogar bis auf den Eichenwald, in welchem der Hr. R. die Pflanze fand. Es ist ganz gewiß die Trientale.

So hatte sich in so kurzer Zeit die Sprache geändert. Vor einer halben Stunde wollte man nicht zugeben, daß man den eigentlichen Namen der Pflanze überhaupt bestimmen könnte, und nach einer halben Stunde wollte man nicht zugeben, daß es nur irgend eine andere Pflanze seyn könnte, als die Trientale.

Ich holte das dazu gehörige Kupfer, und nun war ihr Glaube unumstößlich, daß es die Trientale sey.

„Das ist aber doch zum Erstaunen,“ sagte der Kammerherr, „daß man so einen sichern Leitfaden hat, um sich in dem ungeheuern Labyrinth des Pflanzenreichs zurecht finden, und mit Andern darüber verständigen zu können. Ich habe die Botanik mir immer als eine entsetzlich schwere Wissenschaft vorgestellt, und meine eigenen Kinder werden mich nun bald eines Andern belehren.“

„Sie ist wirklich dafür ausgeschrien, Herr Kammerherr, und wird deswegen beynahe allenthalben vernachlässigt; aber, wie Sie sehen, mit Unrecht. Vielleicht haben Nichtkenner, und Kenner einen gleichen Theil daran; die erstern, um sich dadurch zu entschuldigen, daß sie in so einer interessanten Wissenschaft Fremdlinge geblieben wären, die andern, um sich das Ansehen zu geben, daß sie keine gemeinen Köpfe seyn müßten, weil sie so eine schwere Wissenschaft hätten begreifen können.“

Während dessen kamen die drey lieblichen Schwestern, welche nach dem letzten Ausruf:

es ist die Trientale, zur Stube hinaus gehüpft waren, wieder zurück, und es brachte jede, wie ich vermuthete, eine blühende Pflanze mit.

Fräulein Auguste hatte eine Pflanze mit blauer Blume, und versicherte sogleich bestimmt, daß sie in die zweyte Klasse und erste Ordnung gehören müsse, denn es wären sehr deutlich zwey Staubfäden und ein Staubweg zu sehen. Sie schlug im Schkuhr nach, und fand bald, daß sie aus der Gattung des Ehrenpreiſs sey, wegen des in vier eyrunde Lappen getheilten Blumenblatts, von welchen der oberste der größte, der unterste der kleinste sey, und versicherte endlich triumphirend, daß es ganz gewiß die Bachbunge (*Veronica Beccabunga*) wäre, weil die blauen Blumentrauben sich an der Seite des Stengels befänden, weil die Blätter eyrund und saftig, gekerbt und flach wären, und der untere Theil des Stengels kröch, der Obertheil aber aufrecht ständ, und weil Zweige und Blätter einander gegenüber ständen, genau so, als sie es im Schkuhrischen Handbuche beschrieben fand. Auch versicherte sie, wie es ihr sehr glaublich wäre, daß die Bachbungen einen sehr guten Kräuter-Salat

abgeben mußten, und daß sie das nächste Frühjahr es gewiß nicht versäumen wollte, sich einen zuzubereiten.

Fräulein Louise hatte eine Pflanze, welche ihr schon unter dem Namen Hundsribbe (*Plantago lanceolata*) bekannt war. Sie schlug ebenfalls im Schkuhr nach, und fand bald, daß sie in der vierten Klasse und ersten Ordnung zu suchen sey, wo sie sie auch wirklich unter dem oben angeführten Namen fand. Alles traf ein, die lanzenförmigen, langen, schmalen, spitzigen, am Rande schwach gezahnten, und mit sieben Nerven versehenen rauchen Blätter, die ziemlich eyrunde Blumenähre und der lange eckige Blumenstengel. Als sie vollends an die Stelle kam:

„Der grüne, aus dem Kraute gepresste Saft
„ist äußerlich und innerlich eine vortreff-
„liche Wundsalbe, wovon mir besonders
„ein Beyspiel eines armen, im höchsten
„Grade schwind- oder lungensüchtigen Sol-
„daten bekannt ist. Er war eines mittlern
„Alters, von dieser Krankheit aber so ent-
„kräftet, daß er am Stocke täglich herum
„schlich, und auf Anrathen dieses treffliche

„Wundkraut aufsuchte. Aus Schwäche und
„Mattigkeit aber legte er sich, wo er es
„fand, und verzehrte die besten und saft-
„tigsten Blätter eine Zeit lang, wodurch
„derselbige seine völlige Gesundheit wieder
„erhielt — “

da hüpfte das gutmüthige Mädchen für Freuden
in die Höhe, fiel ihrem Vater um den Hals,
und bat ihn, bald zu ihrem Onkel zu reisen,
der auch schwindsüchtig wäre, damit sie die
Pflanze suchen und ihn heilen könne.

Fräulein Julie konnte ihre Pflanze für La-
chen kaum zeigen, und sie meynte, sie wüßte
gar nicht, ob eine Blüthe daran wäre, es säße
zwar wohl oben etwas darauf, aber es mache
eine Miene, als wenn es einen verschlingen
wolle. Drollig genug sah die Blüthe aus, darin
hatte sie Recht, denn das Blumenblatt war ziem-
lich rund aufgeblasen, und hatte eine kleine
fünfspaltige Mündung. Bey der Section fanden
wir denn, daß sie zwey lange und zwey kurze
Staubfäden hatte, und daß sie also in die vier-
zehnte Klasse gehörte; die Ordnung aber war
noch nicht zu bestimmen, weil noch keine reife
Blüthe vorrätzig war, und man also nicht sehen

konnte, ob der Saame bedeckt wäre, oder nicht. Beym Nachschlagen aber fanden sie die Pflanze in der zweyten Ordnung unter dem Namen knotige Braunwurz, Kropfwurz (*Scrophularia nodosa*.)

Die Anmerkung des Hrn. Schkuhr:

„Wider die Kröpfe werden die knolligen
„Wurzeln rein gewaschen, die äußere Haut
„davon ins Wasser geschabt, und davon ge-
„trunken, die Wurzeln aber an einem Faden
„um den Hals gebunden, bis sie durre sind:
„dieses wird ein bis zwey Monate fortge-
„setzt, bis sich der Kropf verliert. Nichts
„mehr und nichts weniger hat einige bey
„Leipzig noch lebende Personen von diesem
„Übel befreyt —“

erwarb der Pflanze viele Lobeserhebungen, und Julie meynte, sie wolle nun mit ihr noch manchen garstigen Kropf aus der Welt practiciren.

Die Freude des Kammerherrn über die vermeintlich ansehnlichen Fortschritte in der Pflanzenkunde, welche seine Töchter in so kurzer Zeit gemacht hatten, und über die noch ansehnlichen, welche er selbst in Zukunft im Wett-eifer mit ihnen zu machen gedachte, war groß.

Er versprach seinen Kindern, das botanische Handbuch des Hrn. Schkuhr sogleich selbst zu verschreiben, wenn sie recht fleißig mit ihm botanisiren wollten.

Das Versprechen wurde angenommen, und die Bedingungen eingegangen. Auf meine Veranlassung wurden dem Handbuche noch Willdenows Anfangsgründe der Kräuterkunde und Hedwigs Kunst die Pflanzen zu trocknen u. s. w. beygesetzt.

Als ich nach einigen Monaten wieder zum Kammerherrn kam, hatte sich bey ihm sowohl, als seinen Töchtern, die Anzahl der selbst getrockneten und richtig bestimmten Pflanzen schon bis auf einige Hundert vermehrt, und die unschuldige Trientale, welche diese unschuldige Metamorphose veranlaßt hatte, mußte sich zum Andenken unter Glas ziehen lassen.

Diese und einige ähnliche Erfahrungen haben mich vollkommen überzeugt, daß man freylich nicht ohne Kräuter, aber doch ohne Zauberey, Jemanden binnen einer sehr kurzen Zeit, und mit sehr wenig Mühe, so weit in der Botanik orientiren könne, daß er sich alsdann mit Hülfe

eines guten botanischen Handbuchs, besonders des Schkuhrischen, leicht selbst weiter fortzuhelfen wisse.

Auch scheint sich der Glaube an die vielen Schwierigkeiten, mit welchen ein angehender Botaniker zu kämpfen habe, immer mehr zu verlieren, denn die Anzahl der Liebhaber der Kräuterkunde vermehrt sich mit jedem Jahre. Auch weiß ich schon zwey Beyspiele, daß kluge Väter, welche einen Hauslehrer für ihre Kinder zu engagiren suchten, Bekanntschaft mit der Botanik zu einer Hauptbedingung machten.

Und fürwahr, es verdient diese interessante Wissenschaft recht geflissentlich in unsere Haus-erziehung mit eingeführt zu werden, denn ohne die oben gleich im Anfange dieser Vorerinnerung bemerkten sehr wichtigen Rücksichten zu wiederholen, lassen sich mit ihrer Hülfe die vielen leeren Stunden, welche nach Vollendung des eigentlichen Schulunterrichts übrig sind, und über deren zweckmäßige Ausfüllung man oft sehr verlegen ist, auf die lehrreichste und angenehmste Art ausfüllen.

Man mache den Versuch, und bringe seinen Kindern oder Zöglingen Sinn und Geschmack

an der Botanik bey, lehre sie Pflanzen aufsuchen, auflegen, trocknen und in ordentliche Herbarien sammeln, und man kann sich darauf verlassen, daß ihnen eher Zeit mangeln werde, als daß sie Überfluß daran haben sollten. Ihr kindlicher Geist ist dabey immer in zweckmäßiger Thätigkeit, er muß immer untersuchen, immer vergleichen, um aufzufinden, worin die oft sehr kleine Verschiedenheit einer Pflanze von der andern bestehe, und welches ihr charakteristisches Kennzeichen sey; und die sonst gewöhnlich zwecklosen und daher langweiligen und unangenehmen Spaziergänge werden nun zweckmäßige und daher auch unterhaltende botanische Excursionen.

Daß aber in dieser Rücksicht ein kleines Taschenbuch nach Art eines Kalenders, welcher uns belehrte, was für Eroberungen für sein Herbarium man in jedem Monat machen könne, das heißt, welche Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe finden könne, und auf welchem Standorte — daß ein solches Buch für Hauslehrer sowohl und ihre Zöglinge, als für jede andere angehende Pflanzensammler und Pflanzensammlerin von Nutzen seyn könne, indem es die

botanischen Excursionen selbst zweckmäßiger einrichten liefs, darüber darf ich wohl keinen Widerspruch befürchten.

Als ich einst selbst anfang der Botanik zu huldigen, fühlte ich den Mangel eines solchen Buches recht sehr. Gern und theuer hätte ich es bezahlt, wenn es zu haben gewesen wäre, weil mir manche Stunde Zeit dadurch erspart worden wäre, und ich manche Pflanze nicht in meinem Herbario vermissen würde, die ich recht wohl hätte einsammeln können; wenn ich theils in dem rechten Monat, theils an den rechten Standort nach ihr ausgegangen wäre.

Obschon eine ziemliche Anzahl Jahre seit jener Zeit verflossen sind, so ist doch dem Mangel eines ähnlichen Buches, wenigstens so viel mir bekannt ist, noch nicht abgeholfen worden, und diefs verleitete mich zu dem Gedanken, selbst einen Versuch damit zu machen, und der Erfolg davon ist der gegenwärtige Pflanzen-Kalender, welchen ich hiermit dem Publico, oder vielmehr nur den angehenden Freunden und Freundinnen der Botanik mit aller Achtung übergebe.

Ich habe zwar manche Stunde darüber hin und her gosonnen, um diesen Pflanzen-Kalender

so vollständig und zweckmäfsig, als möglich, einzurichten, und an meinem guten Willen, es dahin zu bringen, hat es wahrlich nicht gefehlt; demungeachtet will ich gar nicht in Abrede seyn, dafs ein Anderer, als ich, ihn noch vollständiger und zweckmäfsiger geliefert haben würde. Unterdeß bis es irgend einem Andern gefallen wird, uns einen vollständigeren zu liefern, wird man sich des meinigen auch nicht ganz fruchtlos bedienen können.

Nun noch einige Worte über die Einrichtung des Pflanzen-Kalenders selbst. Ich habe ihn absichtlich in zwey Hefte getheilt, von welchen jedes sechs Monate des Jahres enthält. Ein solches Taschenbuch, welches man meinen Absichten gemäß bey botanischen Excursionen gern bey sich tragen soll, darf nicht voluminös und lastend seyn; und diese Theilung konnte um desto eher statt finden, da ich alle Zurückweisungen auf frühere Monate absichtlich vermieden habe, um denjenigen, welche den Kalender benutzen wollten, das lästige Nachschlagen der Zurückweisungen zu ersparen. Jedes Heft wird nun, wenn anders sein Schicksal so günstig ist, selbst in dem niedlichsten Arbeitsbeutelchen eines wissbegierigen Mädchens vollkommen Platz finden können.

Dafs ich die Pflanzen nach den Klassen und Ordnungen des Linnéischen Sexual-Systems aufgeführt habe, darüber befürchte ich durchaus keinen Tadel. Es ist bis jetzt das leichteste und anschaulichste, und also auch, für Anfänger besonders, das allerzweckmässigste.

Über die Rubriken der Standörter aber glaube ich nöthig zu haben, noch einige Worte sagen zu müssen, um über dieselben nicht mißverstanden zu werden. Die Rubriken selbst sind folgende:

1) Am Meerstrande — hieher gehören auch, zum Theil wenigstens, die Ufer grosser Landseen, wie sie sich in der Niederlausitz, im Brandenburgischen, Mecklenburgischen u. s. w. befinden.

2) Im Wasser — d. h. in stillen Gewässern, in grössern und kleinen Teichen, in Sümpfen, in kleinern Dorfbächen, in Mühlgräben, besonders kleinern, in Feld- und Wiesengräben, wenn sie auch nicht stets mit Wasser angefüllt sind, und an Orten, welche von Zeit zu Zeit vom Wasser überschwemmt werden, wo das Regenwasser gern zusammenläuft, und einige Zeit stehen bleibt.

3) Am Wasser — darunter verstehen sich die Ufer der Ströme, Flüsse, Bäche, Teiche, Sümpfe, die Ränder der Pfützen und Wassergräben, auch Teiche, welche nicht völlig angespannt sind, und viele halbtrockne Stellen haben; auch Feldörter, welche, der sich daselbst befindlichen Wassergallen wegen, sich immer feucht erhalten.

4) An Salzquellen.

5) An quelllichten Orten.

6) Auf Torf- und Moor-Grund — wohin denn auch die sogenannten Brüche gehören.

7) Auf feuchten und sumpfigen Wiesen.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und Grasplätzen — hierzu sind auch unsere gewöhnlichen Grasplätze, Ackerränder und Lehden zu rechnen.

9) Auf Sandboden — er mag sich nun auf unsern Äckern, Wiesen, oder auf Anhöhen befinden; auch, der sogenannte kiesichte Boden ist hierher zu rechnen.

10) Auf kleinen Hügeln und Anhöhen — sie können mit Gebüsch bewachsen oder bloß grasicht seyn.

11) Auf gebauten Äckern — solche, die eben schon eine bestimmte und absichtlich dahin gesäete oder gepflanzte Frucht tragen.

12) Auf ungebauten Äckern — Braachen, Stoppeln, auch Sturzücker.

13) Im Getreide.

14) In größern und dichten Waldungen — welche gemeinlich etwas finster sind, wie besonders die Nadelholzwälder.

15) In lichtern Laubholz-Waldungen.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

17) An Hecken und Zäunen.

18) An Wegen und Dämmen — wozu auch die vielen Feldraine gehören.

19) An und auf Mauern und Dächern — ich hoffe hier nicht mißverstanden zu werden, oder befürchten zu müssen, daß irgend Jemand das bair. auch auf die Dächer beziehen werde, so wie es auch wohl keiner Erinnerung

bedürfte, daß besonders die Wellerwände und Strohdächer gemeynt sind, welche gewöhnlich noch mit Rasen belegt werden, und also einen Wohnplatz für mehrere Pflanzen abgeben können.

20) An ganz ungebauten Orten — das sind hauptsächlich die Plätze um die Häuser und die sogenannten Dörfer, auch alle Straßsen und Feldwege.

21) In gewöhnlichen Gärten — ich meyne unsere Gemüs- und Blumengärten; da aber die Blumen gewöhnlich nicht viel einbringen, und manche Gartenbesitzer auch deshalb kein sonderliches Interesse daran finden, so ist es sehr leicht denkbar, daß man in vielen Gärten viele unter dieser Rubrik eingetragene Pflanzen vergebens suchen wird; aber sie werden dafür in andern, besonders den sogenannten Lustgärten, gewiß zu finden seyn.

22) In botanischen Gärten — ich habe bey dieser Rubrik auf den gewöhnlich sehr kleinen Umfang unserer botanischen Gärten Rücksicht nehmen müssen, sonst würde die Anzahl der aufgeführten Pflanzen ungleich größer ausgefallen seyn. Und auch diese wird der Vorsteher eines botanischen Gartens, wenn er auch

eine eben so unermüdete Thätigkeit und unbeschränzte Vorliebe für die Wissenschaft besäße, wie der selige Dr. Joh. Hedwig in Leipzig, nicht in einem Jahre zu liefern im Stande seyn. Die angeführten habe ich meistentheils von ihm binnen einer Zeit von drey Jahren erhalten.

23) Allenthalben — d. h. auf Äckern und Wiesen, an Wegen, in Wäldern, an trocknen und feuchten Orten, auf Bergen und in Thälern, ja selbst auf Schutthaufen u. s. w., und es enthält also diese Rubrik überhaupt Pflanzen, nach welchen man nicht weit umher zu suchen braucht.

24) In Lustwäldern und Alleen.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

26) Schmarozerpflanzen.

Da in dem Pflanzen-Kalender bloß von deutlich blühenden Pflanzen die Rede seyn soll, so folgt von selbst, daß ich bloß die erstern drey und zwanzig Klassen des Linnéischen Systems habe aufnehmen können.

In Rücksicht auf die deutschen Benennungen habe ich die gewöhnlichsten gewählt, wem an

mehrern gelegen seyn sollte, kann leicht aus den mehresten Handbüchern befriedigt werden.

Dieß wäre es, was ich vorher zu erinnern für nöthig erachtete. Ich wünsche übrigens recht sehr, daß ich den Zweck, den ich mir bey dieser wirklich mühevollen Arbeit vorgesteckt hatte, erreichen, den angehenden Freunden und Freundinnen der lieblichen und interessanten Wissenschaft das zweckmäßige Botanisieren erleichtern, und vielleicht Veranlassung zur Auffindung mancher Pflanze in Deutschland geben möge, welche man noch nicht für einheimisch halten will.

Roitzsch bey Wurzen, im Februar 1804.

H.

JANUAR UND FEBRUAR.

Jedermann weiß, daß in diesen beyden Monaten gewöhnlich noch keine lauen Zephirs wehen, sondern daß eiskalte und Erstarren bewirkende Nordwinde oft ihr sehr unfreundliches Wesen treiben. Nicht Mücken, sondern Schneeflocken tanzen in der Luft umher, und der sonst nährende Thau ist bis jetzt noch kältender Reif. Daher darf man sich auch nicht wundern, daß sich noch keine Kinder Florens bey einer ihnen so ungünstigen und ihrem zarten Saamen nachtheiligen Witterung entdecken lassen. Treten einmal in diesen Monaten einige wärmere Tage und Nächte hinter einander ein, wie dies

bisweilen sich ereignet, und auch in diesem gegenwärtigen Jahre 1804, schon noch vor der Mitte des Januars, der Fall war, so wird auch sogleich die Vegetationskraft rege, und treibt einige Pflanzen selbst bis zur Blüthe hervor; aber es sind deren nur wenige, und leider müssen sie gewöhnlich bey rückkehrendem Froste, wie auch dieß im gegenwärtigen Jahre der Fall war, ihre schuldlose Kühnheit mit einem frühzeitigen Tode büßen.

Ich will diese frühzeitig blühenden Pflanzen der Reihe nach aufführen, ohne auf die in den folgenden Monaten bestimmten Rubriken zu achten, weil die meisten dieser Rubriken außerdem mit Vacat - Scheinen ausgestattet werden müßten.

Es blühen also im Januar und Februar, wenn die Witterung günstig ist (außerdem erst im März), nachstehende Pflanzen:

Cornus IV, 1. Cornelbaum

arborea — gemeiner Cornelbaum — findet sich auf den schweizerischen und deutschen Gebirgen wild, und wird gewöhnlich in unsern Gärten gezogen.

Atropa V, 1. Tollkraut

Mandragora — Alraun, Alraunwurzel —
wächst in der Schweiz und den südlichen
Ländern Europas wild, in Deutschland
nur in Gärten.

Alsine V, 3. Vogelkraut

media — gemeines Vogelkraut; Hühnerdarm
— auf Feldern, in Gärten und ungebauten
Orten.

Galanthus VI, 1. Schneeglöckchen

nivalis — gemeines Schneeglöckchen — auf
feuchten Gebirgswiesen, in Wäldern und
in unsern Gärten.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

helioscopia — Garten W. Sonnenwendige W.
— in Gärten und an ungebauten Orten.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz

hyemalis — Winterwolfskraut, Christwurz
— auf den schweizerischen Gebirgen und
in unsern Gärten.

niger — schwarze Nieswurz, Weynachts-
rose — an mehreren Orten Deutschlands,
an steinigen, schattigen Orten, und in un-
sern Gärten.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
purpureum — rother B. — allenthalben.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr. — allenthalben.

Bellis XIX, 2. Maßliebe, Gänseblümchen

perennis — ausdauernde M. — allenthal-
ben.

Corylus XXI, 7. Haselstaude

Avellana — gemeine H. — in Hölzern, Hecken und Gärten.

Viscum XXII, 3. Mistel

album — weiße Mistel — als Schmarozer-Pflanze auf mehreren Bäumen, besonders in Laubholzwäldern auf Aspen und Birken.

M Ä R Z.

1) Am Meerstrande.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
anglica — engländisches L.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
verna — Frühlings W.

3) Am Wasser.

Chrysosplenium VIII, 2. Goldenmilzkraut
alternifolium — größeres G.
oppositifolium — kleineres G.

4) An Salzquellen.
Vacat.

5) An quelllichten Orten.

Chrysosplenium VIII, 2. Goldenmilzkraut
alternifolium — größeres G.
oppositifolium — kleineres G.

6) Auf Torf- und Moorgrund.
Vacat.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Vacat.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften,
Grasplätzen.

Pinguicula II, 1. Fettkraut
vulgaris — gemeines F.

9) Auf Sandboden.

Spergula X, 4. Spark
pentandra — fünffädiger S.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Anemone XIII, 6. Windblume
Pulsatilla — große Küchenschelle
nemorosa — Waldhähnchen.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
montanum — Berg T.

11) Auf gebauten Äckern.

Vacat.

12) Auf ungebauten Äckern.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
triphyllos — dreyblättriger E.
verna — Frühlings E.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch
luteum — gelbe V.
minimum — kleinste V.

auf ungebauten Äckern.

Draba XV, 1. Hungerblümchen

verna — Frühlings H.

incana — bestäubtes H.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

thaliana — thalianisches G.

13) Im Getreide.

Vacat.

14) In größern u. dichten Wäldern.

Juncus VI, 1. Binsen

pilosus — haarichte B.

Daphne VIII, 1. Kellersalz

Mezereum — gemeines K.

Anemone XIII, 6. Windblume

hepatica — Edelleberkraut.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

cava — hohler E.

intermedia — mittlerer E.

solida — dichter E.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Pulmonaria V, 1. Lungenkraut

angustifolia — schmalblättriges L.

officinalis — gebräuchliches L.

Vinca V, 1. Wintergrün

minor — kleines W.

Adoxa VIII, 4. Bisamkraut

moschatellina — gemeines B.

Asarum XI, 1. Haselwurz

Europaeum — gemeine H.

in lichten Laubholzwäldern.

Anemone XIII, 6. Windblume
nemorosa — Waldhähnchen
ranunculoides — ranunkelartige W.

Viola XIX, 6. Veilchen
hirta — rauhes V.
odorata — wohlriechendes V.

Betula XXI, 4. Erle
alnus — gemeine E.

Corylus XXI, 7. Haselstaude
avellana — gemeine H.

16) In Feldbüschen und Gesträuchen.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch
luteum — gelbe V.
minimum — kleinste V.

Asarum XI, 1. Haselwurz
Europaeum — gemeine H.

Viola XIX, 6. Veilchen
odorata — wohlriechendes V.

17) An Hecken und Zäunen.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch
luteum — gelbe V.
minimum — kleinste V.

Adoxa VIII, 4. Bisamkraut
moschatellina — gemeines B.

Viola XIX, 6. Veilchen
odorata — wohlriechendes V.

Corylus XXI, 7. Haselstaude
avellana — gemeine H.

18) An Wegen und Dämmen.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

thaliana — thalianisches G.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Draba XV, 1. Hungerblümchen

muralis — Mauer H.

20) An ganz ungebauten Orten.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

verna — Frühlings F.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Crocus III, 1. Safran

sativus vernus — Frühlings S.

Cornus IV, 1. Cornelbaum

Mascula arborea — gemeiner C.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge

omphalodes — nabelförmige H.

Galanthus VI, 1. Schneeglöckchen

nivalis — gemeines S.

Leucojon VI, 1. Sommerthierchen

vernum — Frühlings S.

Narcissus VI, 1. Narcisse

Pseudo-Narcissus — gelbe N.

Daphne VIII, 1. Kellersalz

Mezereum — gemeines K.

Prunus XII, 1. Pflaumen

Armeniaca — Aprikosenbaum.

in gewöhnlichen Gärten.

Anemone XIII, 6. Windblume
hepatica — Edelleberkraut.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz
hyemalis — Winter N.

niger — schwarze N.

viridis — grüne N.

foetidus — stinkende N.

Viola XIX, 6. Veilchen

odorata — wohlriechendes V.

Taxus XXII, 10. Taxus

baccata — gemeiner T.

22) In botanischen Gärten.

Atropa V, 1. Tollkraut

Mandragora — Alraunwurzel.

Erythronium VI, 1. Hundszahn

dens canis — gemeiner H.

Scilla VI, 1. Sternhyazinth

bifolia — zweyblättriger St.

Asarum XI, 1. Haselwurz

canadense — canadische H.

virginicum — virginische H.

Halesia XI, 1. Halesie

tetraptera — vierflügelichte H.

diptera — zweyflügelichte H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

cava — hohler E.

solida — dichter E.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

Alsine V, 3. Vogelmeyer

media — gemeiner V.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

Bursa Pastoris — Hirten - Täschel.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines K.

Bellis XIX, 2. Gänseblümchen

perennis — ausdauerndes G.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Populus XXII, 6. Pappel

nivea — Silber P.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Vinca V, 1. Wintergrün

major — grosses W.

Daphne VIII, 1. Kellersalz

alpina — Alpen K.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz

viridis — grüne N.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

pallens — bleiches K.

26) Schmarozerpflanzen.

Viscum XXIII, 3. Mistel
album — weiße M.

(Auf mehrern Bäumen in Laubholzwäldern, hauptsächlich auf Aspen und Birken.)

A P R I L.

1) Am Meerstrande.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
anglica — engländisches L.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
verna — Frühlings W.

Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

Hottonia V, 1. Hottonie
palustris — Sumpf H.

Carex XXI, 3. Riedgras
vesicaria — Blasen R.

3) Am Wasser.

Chrysosplenium VIII, 2. Goldenmilzkraut
alternifolium — größeres G.
oppositifolium — kleineres G.

Caltha XIII, 6. Dotterblume
palustris — Sumpf D.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Nasturtium — Brunnenkresse.

am Wasser.

Tussilago XIX, 2. Huflattig

Farfara — gemeiner H.

Petasites — großer H.

Carex XXI, 3. Riedgras

Pseudo-Cyperus — Cyperartiges R.

riparia — Ufer R.

vesicaria — Blasen R.

ampullacea — Flaschen R.

Salix XXII, 1. Weide

triandra — dreifädige W.

pentandra — fünffädige W.

vitellina — Gold W.

fragilis — Bruch W.

monandra — einfädige W.

aurita — geöhrt Salbey W.

acuminata — gemeine große Werft W.

4) An Salzquellen.

Vacat.

5) An quelllichten Orten.

Chrysosplenium VIII, 2. Goldenmilzkraut

alternifolium — größeres G.

oppositifolium — kleineres G.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Eryophorum III, 1. Dünngras

polystachion — vielähmiges D.

Carex XXI, 3. Riedgras

filiformis — fadenförmiges R.

Salix XXII, 1. Weide

rosmarinifolia — rosmarinblättrige W.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
Petasites — großer H.

Carex XXI, 3. Riedgras
tomentosa — filziges R.

filiformis — fadenförmiges R.

panicea — Hirse R.

riparia — Ufer R.

ampullacea — Flaschen R.

Salix XXII, 1. Weide

aurita — geöhrte Salbey W.

acuminata — gemeine große Werft W.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften,
Grasplätzen.

Pinguicula II, 1. Fettkraut
vulgaris — gemeines F.

Poa III, 2. Rispengras
annua — jähriges R.

Festuca III, 2. Schwingel
elatior — Wiesen S.

Avena III, 2. Hafer
elatior — Wiesen H. Französisch Raygras.

Primula V, 1. Schlüsselblume
veris officinalis — gebräuchliche S.

elatior — frühzeitige S.

Anemone XIII, 6. Windblume
pratensis — Wiesen W.

ranunculoides — ranunkelartige W.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Adonis XIII, 6. *Adonis*

vernalis — Frühlings A.

Ajuga XIV, 1. Günsel

reptans — kriechender G.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

pratensis — Wiesen S.

Scorzonera XIX, 1. *Scorzonere*

humilis — niedrige S.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

pallens — bleiches K.

9) Auf Sandboden.

Sagina IV, 3. Mastkraut

erecta — aufrechtes M.

Spergula X, 4. Spark

pentandra — fünffädiger S.

Anemone XIII, 6. Windblume

patens — offene Küchenschelle.

Iberis XV, 1. Bauernsenf

nudicaulis — nackend stengliger B.

Carex XXI, 3. Riedgras

ciliata — gefranztes R.

Salix XXII, 1. Weide

incubacea — Matten W.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere

Vitis *Idaea* — gemeine P.

Anemone XIII, 6. Windblume

vernalis — Frühlings W.

Pulsatilla — gemeine große Küchenschelle.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
montanum — Berg T.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
Farfara — gemeiner H.
alba — weißer H.

Viola XIX, 6. Veilchen
mirabilis — wunderbares V.

11) Auf gebauten Äckern.
Vacat.

12) Auf ungebauten Äckern.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
triphyllus — dreyblättriger E.
verna — Frühlings E.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch
luteum — gelbe V.
minimum — kleinste V.

Rumex VI, 3. Ampfer
acetosella — Schafampfer.

Lamium XIV, 1. Nessel, Bienensaug
purpureum — rothe Ackernessel
amplexicaule — ungestielte N.

Draba XV, 1. Hungerblümchen
verna — Frühlings H.
incana — bestäubtes H.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
perfoliatum — durchstochenes T.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

13) Im Getreide.

Myosurus V, 7. Mäuseschwanz
minimus — kleinster M.

14) In gröfsern und dichten Wäldern.

Hedera V, 1. Epheu
helix — gemeiner E.

Juncus VI, 1. Binsen
pilosus — haarichte B.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere
Vitis Idaea — gemeine Pr.

Daphne VIII, 1. Kellersalz
Mezereum — gemeines K.

Adoxa VIII, 4. Bisamkraut
moschatellina — gemeines B.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
dulcis — Wald W.

Anemone XIII, 6. Windblume
hepatica — Edelleberkraut.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfufs
auricomus — goldgelber H.

Lathraea XIV, 2. Schuppenwurz
squamaria — eigentliche S.

Dentaria XV, 2. Zahnkraut
enneaphylla — neunblättriges Z.
bulbifera — bollentragendes Z.
pentaphylla — fünfblättriges Z.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
cava — hohler E.
intermedia — mittlerer E.
solida — dichter E.

in größern und dichten Wäldern.

Carex XXI, 3. Riedgras

digitata — fingerförmiges R.

pillulifera — pillenförmiges R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Pulmonaria V, 1. Lungenkraut

angustifolia — schmalblättriges L.

officinalis — gebräuchliches L.

Primula V, 1. Schlüsselblume

veris officinalis — gebräuchliche S.

elatior — frühzeitige S.

Vinca V, 1. Wintergrün

minor — kleines W.

Ulmus V, 2. Ulmbaum, Rüster

campestris — Feldulmbaum

carpinifolia — Haynbuchenrüster

octandra — achtfädige R.

tetrandra — vierfädige R.

Oxalis X, 4. Sauerklee

acetosella — gemeines S.

Asarum XI, 1. Haselwurz

Europaeum — gemeine H.

Prunus XII, 1. Pflaumen

Padus — gemeine Traubenkirsche.

Anemone XIII, 6. Windblume

nemorosa — Waldhähnchen.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

humilis — niedrige S.

Viola XIX, 6. Veilchen

hirta — rauhes V.

odorata — wohlriechendes V.

canina — Hundsv.

in lichten Laubholzwäldern.

Betula XXI, 4. Erle

Alnus — gemeine E.

laciniata — zerschitztblättrige E.

quercifolia — eichenblättrige E.

incana — weisse E.

Salix XXII, 1. Weide

Caprea — Sahl-Weide.

Populus XXII, 6. Pappel

alba — Pappel-Weide

tremula — Zitter-Pappel, Aspe

nigra — schwarze P.

Fraxinus XXIII, 2. Esche

excelsior — gemeine E.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch

luteum — gelbe V.

minimum — kleinste V.

Asarum XI, 1. Haselwurz

Europaeum — gemeine H.

Viola XIX, 6. Veilchen

odorata — wohlriechendes V.

canina — Hunds V.

Carex XXI, 3. Riedgras

digitata — fingerförmiges R.

pillulifera — pillenförmiges R.

Salix XXII, 1. Weide

Caprea — Sahl W.

17) An Hecken und Zäunen.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

an Hecken und Zäunen.

Cornus IV, 1. Cornelbaum

mascula arborea — gemeiner C.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch

luteum — gelbe V.

minimum — kleinste V.

Adoxa VIII, 4. Bisamkraut

moschatellina — gemeines B.

Stellaria X, 3. Sternpflanze

holostea — Augentrostgras.

Oxalis X, 4. Sauerklee

acetosella — gemeiner S.

Glechoma XIV, 1. Gundermann

hederacea — gemeiner G.

Viola XIX, 6. Veilchen

odorata — wohlriechendes V.

Valantia XXIII, 1. Vaillante

cruciata — kreuzförmige V.

18) An Wegen und Dämmen.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

thaliana — thalianisches G.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Hedera V, 1. Epheu

helix — gemeiner E.

Draba XV, 1. Hungerblümchen

muralis — Mauer H.

20) An ganz ungebauten Orten.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

verna — Frühlings F.

an ganz ungebauten Orten.

Lamium XIV, 1. Nessel
purpureum — rothe N.

Draba XV, 1. Hungerblümchen
verna — Frühlings H.

Viola XIX, 6. Veilchen
odorata — wohlriechendes V.
canina — Hund's V.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Cornus IV, 1. Cornelbaum
mascula arborea — gemeiner C.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge
omphalodes — nabelförmige H.

Symphytum V, 1. Beinwell
officinale — knolliger B.

Primula V, 1. Schlüsselblume
acaulis — stammlose S.

farinosa — mehlichte S.
Auricula — Aurikel.

Phlox V, 1. Flammenblume
paniculata — rispentragende F.

Ribes V, 1. Krausbeere
rubrum — Johannisbeere

alpinum — wilde Johannisbeere
reclinatum — rothe Stachelbeere

Grossularia — haarichte Stachelbeere
Vua crispa — glatte Stachelbeere.

Scandix V, 2. Kerbel
Cerrefolium — gemeiner K.

in gewöhnlichen Gärten.

Galanthus VI, 1. Schneeglöckchen
 nivalis — gemeines S.

Leucojon VI, 1. Sommerthierchen
 vernum — Frühlings S.

Narcissus VI, 1. Narcisse
 Pseudo-Narcissus — gelbe N.

Daphne VIII, 1. Kellersalz
 Mezereum — gemeines K.

Amygdalus XII, 1. Mandelbaum
 persica — Pfirsichbaum
 nana — Zwergmandelbaum.

Prunus XII, 1. Pflaumen
 Armeniaca — Aprikosenbaum
 Cerasus — gemeiner Kirschbaum.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
 crenata — gekerbte Sp.

Paeonia XIII, 2. Pfingstrose
 tenuifolia — schmalblättrige Pf.

Anemone XIII, 6. Windblume
 hepatica — Edelleberkraut.

Helleborus XIII, 6. Nießwurz
 viridis — grüne N.
 foetidus — stinkende N.

Viola XIX, 6. Veilchen
 odorata — wohlriechendes V.
 canina — Hunds V.

Buxus XXI, 4. Buchsbaum
 sempervirens — immergrünender B.

Taxus XXII, 2. Taxus
 baccata — gemeiner T.

22) In botanischen Gärten.

Epimedium IV, 1. Sockenblume
alpinum — Alpen S.

Cornus IV, 1. Cornelbaum
florida — nordamerikanischer C.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
sempervirens — immergrünende O.

Borago V, 1. Borretsch
orientalis — morgenländischer B.

Androsace V, 1. Androsace
elongata — verlängerte A.
septentrionalis — nördliche A.

Primula V, 1. Schlüsselblume
minima — kleinste S.
integrifolia — ganzblättrige S.
longiflora — langblumige S.
villosa — zottige S.
glutinosa — klebrige S.
carniolica — kraynsche S.
rubra — rothe S.
Halleri — Alpen S.

Cortusa V, 1. Cortuse
Matthioli — Matthiols C.

Phlox V, 1. Flammenblume
paniculata — rispenträgende F.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut
physaloides — schluttenartiges B.
scopolia — scopolisches B.

Ribes V, 1. Krausbeere
alpinum — wilde Johannisbeere.

in botanischen Gärten.

Hedera V, 1. Epheu

quinquefolia — fünfblätteriger E.

Claytonia V, 1. Claytonie

virginica — virginische C.

sibirica — sibirische C.

Erythronium VI, 1. Hundszahn

dens canis — gemeiner H.

Scilla VI, 1. Sternhyacinth

bifolia — zweyblätteriger St.

Asphodelus VI, 1. Assodille

ramosus — weißse A.

Convallaria VI, 1. Mayblume

verticillata — wirtelförmige M.

Laurus IX, 1. Lorbeer

Sassafras — Sassafrasbaum.

Asarum XI, 1. Haselwurz

canadense — canadische H.

virginicum — virginische H.

Halesia XI, 1. Halesie

tetraptera — vierflügelichte H.

diptera — zweyflügelichte H.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

crenata — gekerbte S.

Paeonia XIII, 2. Pfingstrose

tenuifolia — schmalblätterige Pf.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

parnassifolius — doldentragender H.

amplexicaulis — durchwachsartiger H.

bullatus — blasiger H.

Thora — schweizerischer H.

in botanischen Gärten:

Lamium XIV, 1. Nessel

garganicum — garganische N.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

anglica — engländisches L.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

moschatum — nach Bisam riechender St.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

cucularia — kappenförmiger E.

spectabilis — ansehnlicher E.

nobilis — edler E.

cava — hohler E.

solida — dichter E.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

fruticosa — straubige H.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

Valeriana III, 1. Baldrian

officinalis — gebräuchlicher B.

Nardus III, 1. Borstengras

stricta — starrendes B.

Poa III, 2. Rispengras

annua — jähriges R.

Holostium III, 3. Spurre, Nelkengras

umbellatum — doldenförmige S.

Lycopsis V, 1. Krummhals

arvensis — Acker Kr.

Alsine V, 3. Vogelmeier

media — gemeiner V.

allenthalben.

Rumex VI, 3. Ampfer

acetosella — Schafampfer.

Cerastium X, 4. Hornkraut

vulgatum — gemeines H.

semidecandrum — halbzehnfädiges H.

arvense — Acker H.

Fragaria XII, 5. Erdbeere

vesca — gemeine E.

Chelidonium XIII, 1. Schoellkraut

majus — großes S.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

Bursa Pastoris — Hirten T.

Geranium XVI, 1. Storschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn

Taraxacum — gemeiner L.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines K.

Bellis XIX, 2. Gänseblümchen

perennis — ausdauerndes G.

Carex XXI, 3. Riedgras

Schreberi — Schreberisches R.

praecox — frühzeitiges R.

Salix XXII, 1. Weide

alba — weiße W.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cornus IV, 1. Cornelbaum

florida — nordamerikanischer C.

in Lustwäldern und Alleén.

Azalea V, 1. Mayblumenbusch
nudiflora — nacktblumiger M.
viscosa — klebriger M.

Lonicera V, 1. Lonicere
tatarica — tatarische L.
pyrenaica — pyrenäische L.
alpigena — Alpen L.
caerulea — blaue L.

Betula XXI, 4. Birke
serrulata — Haselbirke.

Hippophae XXII, 5. Sanddorn
rhamnoides — weidenblättriger S.

Populus XXII, 6. Pappel
nivea — Silber P.
nigra — schwarze P.
dilatata — italienische P.
balsamifera — Balsam P.
monilifera — canadische P.
candicans — weifs schimmernde P.
graeca — griechische P.
angulata — eckige P.
heterophylla — verschieden blättrige P.

Acer XXIII, 1. Ahorn
dasycarpum — Silber A.

Fraxinus XXIII, 2. Esche
ornus — grosblumige E.
rotundifolia — rundblättrige E.
juglandifolia — wallnufsblättrige E.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Primula V, 1. Schlüsselblume

Auricula — Aurikel

minima — kleinste S.

integrifolia — ganzblättrige S.

longiflora — langblumige S.

villosa — zottige S.

glutinosa — klebrige S.

carniolica — kraynsche S.

rubra — rothe S.

Halleri — Alpen S.

Cortusa V, 1. Cortuse

Matthioli — Matthiols C.

Vinca V, 1. Wintergrün

major — großblumiges W.

Gentiana V, 2. Enzian

acaulis — stammloser E.

verna — Frühlings E.

Daphne VIII, 1. Kellersalz

alpina — Alpen K.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

aurea — goldgelbes F.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

amplexicaulis — durchwachsartiger H.

Thora — schweizerischer H.

Isopyrum XIII, 6. Doldocke

thalictroides — thalictrumartige D.

aquilegioides — akeleyartige D.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz

viridis — grüne N.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Draba XV, 1. Hungerblümchen

pyrenaica — pyrenäisches H.

Lepidium XV, 1. Kresse

alpinum — Alpen Kr.

Dentaria XV, 2. Zahukraut

enneaphylla — neunblättriges Z.

pentaphylla — fünfblättriges Z.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

trifolia — dreyblättriges S.

Carex XXI, 3. Riedgras

rigida — steifes R.

montana — Berg R.

clandestina — heimliches R.

pilosa — haarichtes R.

alba — weißes R.

26) Schmarozerpflanzen.

Vacat.

M A Y.

1) Am Meerstrande.

- G**laux V, r. Milchkraut
maritima — gemeines M.
Scilla VI, 1. Meerzwiebel
maritima — wahre gebräuchliche M.
Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Paralias — Sand W.
Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
danica — dänisches L.
Carex XXI, 3. Riedgras
arenaria — Sand R.
intermedia — mittelmänniges R.

2) Im Wasser.

- Hipparis** I, 1. Thannwedel
vulgaris — gemeiner Th.
Callitriche I, 2. Wasserstern
verna — Frühlings W.
Scirpus III, 1. Binsengras
palustris — Sumpf B.

im Wasser.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
crispum — krauses S.

Menyanthes V, 1. Zottenblume
trifoliata — dreyblättrige Z.

Hottonia V, 1. Hottonie
palustris — Sumpfhottonie.

Carex XXI, 3. Riedgras
vesicaria — Blasen R.

3) Am Wasser.

Iris III, 1. Schwerdlilie
Pseudacorus — Wasser S.

Alopecurus III, 2. Fuchsschwanz

Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

Solanum V, 1. Nachtschatten
Dulcamara — Bittersüßs.

Euphorbia XI, 5. Wolfsmilch
palustris — Sumpf W.

Geum XII, 5. Benediktenkraut
rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
flammula — kleiner H. Egelkraut.
lingua — großer Sumpf H.

Catha XIII, 6. Dotterblume
palustris — Sumpf D.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut
amara — bitteres S.

am Wasser.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Nasturtium — Brunnenkresse

amphibium — Wasser- oder Land-Rauke

palustre — Sumpf R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

palustre — Sumpf St.

Tussilago XIX, 2. Huflattig

Farfara — gemeiner H.

Viola XIX, 6. Veilchen

palustris — Sumpf V.

Carex XXI, 3. Riedgras

elongata — verlängertes R.

Pseudo-Cyperus — cyperartiges R.

flacca — schlaffes R.

paludosa — Sumpf R.

riparia — Ufer R.

vesicaria — Blasen R.

ampullacea — Flaschen R.

Salix XXII, 1. Weide

triandra — dreyfädige W.

pentandra — fünffädige W.

vitellina — Gold W.

fragilis — Bruch W.

monandra — einfädige W.

aurita — geöhrte Salbey W.

acuminata — gemeine grofse Werft W.

4) An Salzquellen.

Glaux V, 1. Milchkraut

maritima — gemeines M.

5) An quelllichten Orten.

Montia III, 3. Burzelkraut

fontana — Wasser B.

Stellaria X, 3. Meirich

alsine — vogelkrautartiger M.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Nasturtium — Brunnenkresse.

Tussilago XIX, 2. Huflattig

hybrida — unaechter H.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Scirpus III, 1. Binsengras

cespitosus — Moor B.

Eryophorum III, 1. Dünngras

vaginatum — scheidiges D.

polystachion — vielähriges D.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere

uliginosum — Sumpf-Heidelbeere.

Oxycoccus — Moosbeere

Carex XXI, 3. Riedgras

pulicaris — flohartiges R.

filiformis — fadenförmiges R.

Salix XXII, 1. Weide

rosmarinifolia — rosmarinblättrige W.

7) Auf sumpfigen und feuchten Wiesen.

Valeriana III, 1. Baldrian

dioica — kleiner Sumpf B.

Iris III, 1. Schwerdlilie

sibirica — sibirische S.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Agrostis III, 2. Straußgras

pumila — Zwerg St.

Isnardia IV, 1. Isnardie

palustris — Sumpf I.

Stellaria X, 3. Meirich

alsine — vogelkrautartiger M.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke

flos cuculi — Guckgucksblume.

dioica sylvestris — getrennte wilde L.

Geum XII, 5. Benediktenkraut

rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut

palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

flammula — kleiner H. Egelkraut.

Trollius XIII, 6. Trollblume

Europaeus — Europäische Tr.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

palustris — Sumpf L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz

vernalis — Frühlings Br.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

hirsuta — rauches S.

Viola XIX, 6. Veilchen

palustris — Sumpf V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

latifolia — breitblättriges K.

sambuccina — Holunder K.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

ovata — eyrunde R.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Arum XX, 3. Aron

maculatum — gefleckter u. gebräuchlicher A.

Carex XXI, 3. Riedgras

pulicaris — flohartiges R.

intermedia — mittelmänniges R.

vulpina — Fuchs R.

muricata — zackiges R.

tenella — zartes R.

teretiuscula — rundliches R.

ovalis — eyrundähriges R.

curta — kurzähriges R.

stellulata — sternförmiges R.

remota — entferntes R.

cespitosa — Rasen R.

acuta — spitziges R.

Oederi — Oederisches R.

tomentosa — filziges R.

flava — gelbliches R.

filiformis — fadenförmiges R.

distans — entferntes R.

pallescens — blasses R.

panicea — Hirse R.

flacca — schlaffes R.

riparia — Ufer R.

ampullacea — Flaschen R.

Salix XXIII, 1. Weide

aurita — geöhrte Salbey W.

acuminata — gemeine grofse Werft W.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften,
Grasplätzen.

Pinguicula II, 1. Fettkraut
vulgaris — gemeines F.

Iris III, 1. Schwerdlilie
spuria — Bastard S.

Phleum III, 2. Lischgras
pratense — Wiesen L.
notosum — knotiges L.

Agrostis III, 2. Straußgras
minima — kleinstes Str.

Poa III, 2. Rispengras
trivialis — dreyblüthiges R.
angustifolia — schmalblättriges R.
pratensis — Wiesen R.
balbosa — knolliges R.

Festuca III, 2. Schwingel
duriuscula — harter S.
elator — Wiesen S.

Avena III, 2. Hafer
pratensis — Wiesen H. wilder Berg H.

Galium IV, 1. Labkraut
boreale — mitternächtliches L.

Alchemilla IV, 1. Sinau
vulgaris — gemeiner S. Frauenmantel.

Primula V, 1. Schlüsselblume
veris officinalis — gebräuchliche S.
elator — frühzeitige S.

Phytovma V, 1. Rapunzel
spicata — ährentragende R.
orbicularis — kreisrunde R.

- auf trocknen Wiesen u. s. w.
Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch
 nutans — hangende V.
Scilla VI, 1. Sternhyazinth
 amoena — angenehmer St.
Anemone XIII, 6. Windblume
 pratensis — Wiesen W.
Adonis XIII, 6. Adonis
 vernalis — Frühlings A.
Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
 bulbosus — knolliger H.
 repens — kriechender H.
 polyanthemos — vielblumiger H.
 acris — scharfer H.
Ajuga XIV, 1. Günsel
 pyramidalis — pyramidenförmiger G.
 reptans — kriechender G.
Betonica XIV, 1. Betonie
 officinalis — gebräuchliche B.
Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm
 Crista galli — gewöhnlicher H.
 Alektorolophus — haarichter H.
Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen
 pratense — Wiesen K.
Cardamine XV, 2. Schaumkraut
 pratensis — Wiesen S.
Polygala XVII, 2. Kreuzblume
 vulgaris — gemeine K. Natterzünglein.
Orobus XVII, 3. Fasanakraut, Erven
 tuberosus — knollichtes F.
 tenuifolius — zartblättriges F.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere
humilis — niedrige S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
dubium — zweifelhaftes H.

Auricula — großes Mausöhrchen
cymosum — langes Mausöhrchen.

Crepis XIX, 1. Pippau
tectorum — Dach-Pappau.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
dioicum — getrenntes R.

Viola XIX, 6. Veilchen
montana — Berg V.

persicifolia — pfirsichblättriges V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut
coriophora — stinkendes K.

Morio — Guckgucksblume

mascula — männliches K.

militaris — kriegerisches K.

pallens — bleiches K.

Carex XXI, 3. Riedgras

curta — kurzähriges R.

9) Auf Sandboden.

Cynosurus III, 2. Kammgras
durus — hartes K.

Festuca III, 2. Schwingel
rubra — rother S.

Sagina IV, 3. Mastkraut
erecta — aufrechtes M.

auf Sandboden.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Arenaria X, 3. Sandkraut
rubra — rothes S.

Lychnis X, 4. Lychnis
viscaria — Pechnelke.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Cyparissias — Cypressen W.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
Helianthemum — gemeiner Sonnengünsel.

Anemone XIII, 6. Windblume
patens — offene Küchenschelle.

Iberis XV, 1. Bauernsenf
nudicaulis — nackendstengliger B.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
coronopifolia — krähenufußblätteriges D.
laevigata — glattes D.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
arenosum — Sandrauke.

Genista XVII, 3. Ginster
pilosa — haarichter G.
germanica — deutscher G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
dubium — zweifelhaftes H.

Crepis XIX, 1. Pippau
foetida — stinkender P.

Carex XXI, 3. Riedgras
arenaria — Sand R.
ciliata — gefranztes R.

Salix XXII, 1. Weide
incubacea — Matten W.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

prostrata — gestreckter E.

latifolia — breitblättriger E.

Aira III, 2. Schmelengras

flexuosa — bogrige S.

praecox — frühe S.

caryophyllea — nelkenartige S.

Melica III, 2. Perlgras

ciliata — gefranztes P.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

tinctoria — färbende O.

Asclepias V, 2. Schwalbenwurz, Hundskohl

Vincetoxicum — gemeine S.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut

nutans — überhängende S.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Anemone XIII, 6. Windblume

vernalis — Frühlings W.

Pulsatilla — gemeine große Küchenschelle.

Cheiranthus XV, 2. Levkoie

crysimoides — hederichartige L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

montanum — Berg T.

Turritis XV, 2. Thurmkraut

glabra — glattes Th.

hirsuta — zottiges Th.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

arenosum — Sand R.

auf kleinen Bergen u.s.w.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
lucidum — glänzender St.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume
amara — bittere Kr.
comosa — zopfige Kr.

Genista XVII, 3. Ginster
germanica — deutscher G.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
exscapus — schaftloses W.

Trifolium — XVII, 3. Klee.
alpestre — rother Bergklee
montanum — weißer Bergklee.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere
graminifolia — grasblättrige Sc.
purpurea — purpurrothe Sc.
angustifolia — schmalblättrige Sc.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
lactucaceum — lattigartiges H.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
Farfara — gemeiner H.
alba — weißer H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
dioicum — getrenntes R.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz
plantagineum — wegerichblättrige G.
Bellidiasium — maßliebartige G.

Viola XIX, 6. Veilchen
montana — Berg V.
mirabilis — wunderbares V.

auf kleinen Bergen u. s. w.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
arachnites — spinnenartige R.
myodes — insectentragende R.

Serapias XX, 1. Zimbel
ensifolia — schwerdförmige Z.
lancifolia — lanzettblättrige Z.

Carex XXI, 3. Riedgras
arenaria — Sand R.

Juniperus XXII. 10. Wachholder
communis — gemeiner W.

11) Auf gebauten Äckern.

Secale III, 2. Korn, Roggen
cereale — gemeines K.

Brassica XV, 2. Kohl
Napus sativa — Rübsaamen, Rübsen
Rapa — gemeine Rübe

Isatis XV, 2. Waid
tinctoria — Färberwaid.

12) Auf ungebauten Äckern.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
triphyllus — dreyblättriger E.
verna — Frühlings E.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel

Alopecurus III, 2. Fuchsschwanz
agrestis — Acker F.

Asperula IV, 1. Waldmeister, Meyerkraut
arvensis — Acker W.

auf ungebauten Äckern.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch, Ackerslarn

luteum — gelbe V.

minimum — kleinste V.

Rumex VI, 3. Ampfer

acetosella — Schafampfer.

Scleranthus X, 2. Knauel

annuus — jähriger K.

perennis — ausdauernder Kn.

Lamium XIV, 1. Nessel, Bienensaug

purpureum — rothe N.

plexicaule — ungestielte N.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm

Crista galli — gewöhnlicher H.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen

arvense — Acker K.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

arvense — Teld T.

perfoliatum — durchstochenes T.

Arabis XV, 2. Gänzekraut

thaliana — thalianisches G.

Brassica XV, 2. Kohl

austriaca — österreichischer K.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

officinalis — gewöhnlicher E.

Vicia XVII, 3. Wicke

monantha — einblumige W.

auf ungebauten Äckern.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Auricula — großes Mausöhrchen.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 2. Ohmkrant

arvensis — Acker O.

Myosurus V, 7. Mäuseschwanz

minimus — kleinster M.

Euphorbia XI, 3. Wollsmilch

segetalis — Korn W.

Adonis XIII, 6. Adonis

aestivalis — Sommer A.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuss

arvensis — Acker H.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

arvense — Acker T.

campestre — Feld T.

Brassica XV, 2. Kohl

campestris — Acker K.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

officinalis — gebräuchlicher E.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

teclorum — Dach P.

14) In gröfsern u. dichten Wäldern.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

latifolia — breitblättriger E.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

nemorum — Hayn L.

in größern u. dichten Wäldern.

Phyteuma V, 1. Rapunzel
spicata — ährentragende R.

Convallaria VI, 1. Mayblume
polygonatum — große M.
multiflora — vielblumige M.

Juncus VI, 1. Binsen
pilosus — haarichte B.
niveus — weiße B.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere
Myrtillus — gemeine Heidelbeere
Vitis Idaea — gemeine Preusselbeere.

Oxalis X, 4. Sauerklee
acetosella — gemeiner S.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
dulcis — Wald W.

Rubus XII, 5. Brommbeere
saxatilis — Felsenhimbeere.

Fragaria XII, 5. Erdbeere
sterilis — unfruchtbare E.

Actaea XIII, 1. Christophskraut
spicata — ährenförmiges Ch.

Anemone XIII, 6. Windblume
sylvestris — Waldanemone

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß.
auricomus — goldgelber H.
polyanthemos — vielblumiger H.
lanuginosus — wollichter H.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen
nemorosum — blauer K.

in größern u. dichten Wäldern.

Lunaria XV, 1. Mondkraut

rediviva — ausdauerndes M.

annua — jähriges M.

Dentaria XV, 2. Zahnkraut

enneaphylla — neunblättriges Z.

bulbifera — bollentragendes Z.

pentaphylla — fünfblättriges Z.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

tristis — traurige N.

matronalis — Frauen N.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

impatiens — Spring Sch.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

cava — hohler E.

intermedia — mittlerer E.

solida — dichter E.

Orobus XVII, 3. Erven, Fasankraut

vernus — Frühlings E.

tuberosus — knollichte E.

tenuifolius — zartblättrige E.

niger — schwarze E.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze

integrifolia — ganzblättrige A.

cordifolia — herzblättrige A.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

nidus avis — Vogelnest.

Arum XX, 3. Aron

maculatum — gefleckter Aron

in größern u. dichten Wäldern.

Pinus XXI, 8. Fichte

sylvestris — gemeine Kiefer

picea — Weißtanne, Edeltanne

Abies — Rothtanne, gemeine Tanne.

Carex XXI, 3. Riedgras

digitata — fingerförmiges R.

pillulifera — pillenförmiges R.

sylvatica — Wald R.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

perennis — ausdauerndes B.

15) In lichten Laubholz-Wäldern.

Melica III, 2. Perlgras

nutans — überhängendes P.

Poa III, 2. Rispengras

nemoralis, Wald R.

Avena III, 2. Hafer

pratensis — Wiesen H. wilder Berghafer.

Asperula IV, 1. Waldmeister, Meyerkraut

adorata — wohlriechender W.

Cornus IV, 1. Cornelbaum

sanguinea — wilder C. Hartriegel.

Lithospermum V, 1. Steinhirse

purpureo caeruleum — purpurblauer St.

Primula V, 1. Schlüsselblume

veris officinalis — gebräuchliche S.

elatior — frühzeitige S.

Phyteuma V, 1. Rapunzel

spicata — ährentragende R.

in licht. Laubholz-Wäldern.

Lonicera V, 1. Lonicere, Je länger, je lieber
nigra — schwarze L.

Xylosteum — gemeine Heckenkirsche.

Rhamnus V, 1. Wegdorn
catharticus — purgirender W.
frangula — Faulbaum.

Ewonymus V, 1. Spillbaum
Europaeus — Pfaffenhütchen.

Vinca V, 1. Wintergrün
minor — kleines W.

Viburnum V, 3. Schlingbaum
Opulus — Wasserholder.

Allium VI, 1. Lauch
ursinum — Bären L. Raemsel.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut
Liliago — großblumiges Erd Sp.

Convallaria VI, 1. Mayblume
majalis — gemeine M.
bifolia — zweyblättrige M.

Trientalis VII, 1. Schirmkraut, Trientale
Europaea — Eropäisches Sch.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere
Myrtillus — gemeine Heidelbeere
Vitis Idaea — gemeine Preusselbeere.

Arenaria X, 3. Sandkraut
trinervia — dreyribbiges S.

Prunus XII, 1. Pflaumen
Padus — gemeine Traubenkirsch
avium — Waldkirschbaum, Vogelkirsche.

in licht. Laubholz-Wäldern.

Galeopsis XIV, 1. Katzensgesicht, Hohlzahn.

Galeobdolon — gelbes K. Goldnessel.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

humilis — niedrige S.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Betula XXI, 4. Birke

alba — gemeine weiße B.

pendula — Hangebirke.

Quercus XXI, 7. Eiche

Robur — gemeine E.

pedunculata — gestielte E.

Fagus XXI, 7. Buche

sylvatica — gemeine Buche, Rothbuche

Carpinus XXI, 7. Hainbuche

Betulus — gemeine H. Weißbuche.

Salix XXII, 1. Weide

Caprea — Sahl W.

Acer XXIII, 1. Ahorn

campestre — Feld A. Maserle.

Fraxinus XXIII, 2. Esche

excelsior — gemeine E.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Melica III, 2. Perlgras

nutans — überhängendes P.

Galium IV, 1. Labkraut

boreale — mitternächtliches L.

in Feldebüschchen u. Gesträuchen.

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch, Ackerstern
luteum — gelbe V.

minimum — kleinste V.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
Behen — gemeiner weißer.

Galeopsis XIV, 1. Katzensicht, Hohlzahn
Galeobdolon — gelbes K. Goldnessel.

Betonica XIV, 1. Betonie
officinalis — gebräuchliche B.

Turritis XV, 2. Thurmkraut
glabra — glattes Th.
hirsuta — zottiges Th.

Genista XVII, 3. Ginster
germanica — deutscher G.

Orobanchus XVII, 3. Erven, Fasankraut
vernus — Frühlings E.
tuberosus — knollige E.
tenuifolius — zartblättrige E.
niger — schwarze E.

Viola XIX, 6. Veilchen
canina — Hunds V.
montana — Berg V.
Persicifolia — pfirsichblättrige V.

Carex XXI, 3. Riedgras
digitata — fingerförmiges R.
pilulifera — pillenförmiges R.

Salix XXII, 1. Weide
Caprea — Sahl W.

17) An Hecken und Zäunen.

- Cornus** IV, 1. Cornelbaum
sanguinea — wilder C. Hartriegel.
- Solanum** V, 1. Nachtschatten
dulcamara — Bittersüßs.
- Rhamnus** V, 1. Wegdorn
catharticus — purgirender W.
- Evonymus** V, 1. Spillbaum
Europaeus — Pfaffenhüthchen,
- Chenopodium** V, 2. Gänsefuß
Bonus Henricus — Guter Heinrich.
- Scandix** V, 2. Kerbel
Anthriscus — Kletten K.
- Ornithogalum** VI, 1. Vogelmilch, Ackerstern
luteum — gelbe V.
minimum — kleinste V.
umbellatum — doldenförmige V.
- Berberis** VI, 1. Sauerdorn
vulgaris — gemeiner S.
- Cucubalus** X, 3. Cucubalus
Behen — gemeiner weißer C.
- Stellaria** X, 3. Sternpflanze
Holostea — Augentrostgras.
- Oxalis** X, 4. Sauerklee
acetosella — gemeiner S.
- Prunus** XII, 1. Pflaumen
spinosa — Schwarzdorn.
- Crataegus** XII, 2. Hagedorn
Oxyacantha — gemeiner H. Weißdorn.
- Glechoma** XIV, 1. Gundermann
hederacea — gemeiner G.

an Hecken u. Zäunen.

Lamium XIV, 1. Bienensaug', taube' Nessel
maculatum — gefleckter B.
album — weißer B.

purpureum — rother B.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfkraut
vernalis — Frühlings Br.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.

Vicia XVII, 3. Wicke
sepium — Zaun W.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Viola XIX, 6. Veilchen
palustris — Sumpf V.
canina — Hunds V.

Carex XXI, 3. Riedgras
curta — kurzähriges R.

Valantia XXIII, 1. Vaillantie
cruciata — kreuzförmige V.

Parietaria XXIII, 1. Glaskraut
officinalis — gebräuchliches G.

Acer XXIII, 1. Ahorn
campestre — Feld Ah. Maserle.

18) An Wegen und Dämmen.

Lithospermum V, 1. Steinbirse
purpureo caeruleum — purpurblauer St.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
angustifolia — schmalblättrige O.

an Wegen und Dämmen.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
urbicum — Stadt G.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
foetida — stinkender P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

19) An und auf Mauern u. Dächern.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
Bonus Henricus — Guter Heinrich.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Cymbalaria — Cimbelkraut.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

Parietaria XXIII, 1. Glaskraut
officinalis — gebräuchliches Gl.

20) An ganz ungebauten Orten.

Asperugo V, 1. Scharfkraut
procumbens — gestrecktes Sch.

an ganz ungebauten Orten.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Esula — eigentliche W.

helioscopia — Garten W.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

verna — Frühlings F.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

Robertianum — stinkender St.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

divicum — getrenntes R.

Viola XIX, 6. Veilchen

canina — Hunds V.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Syringa II, 1. Flieder, Lilac

vulgaris — türkischer Hollunder

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta olitoria — Feld B. Rapunzel

Iris III, 1. Schwerdlilie

germanica — deutsche S.

squalens — schmuzfarbige S.

graminea — grasartige S.

Phalaris III, 2. Glanzgras

canariensis — Canarien Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere

Caprifolium — Je länger, je lieber.

in gewöhnlichen Gärten.

Ribes V, 1. Krausbeere

rubrum — rothe Johannisbeere

Grossularia — haarichte Stachelbeere

Vua crispa — glatte Stachelbeere.

Narcissus VI, 1. Narcisse

poeticus — weisse N.

bicolor — zweyfarbige N.

Tazetta — Tazette

Jonquilla — Jonquille

Fritillaria VI, 1. Kaiserkrone

Corona imperialis — gemeine K.

persica — persische K.

meleagris — gemeine Schachblume.

Tulipa VI, 1. Tulpe

sylvestris — wilde T.

Gesneriana — gemeine Tulpe

Ornithogalum VI, 1. Vogelmilch

pyrenaicum — pyrenäische V.

narbonense — narbonensische V.

Hyacinthus VI, 1. Hyacinthe

orientalis — gemeine morgenländische H.

botryoides — Traubenhyazinthe.

Laurus IX, 1. Lorbeer

nobilis — gemeiner L.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

Cotyledon — nabelkrautartiger St.

Philadelphus XII, 1. Pfeifenstrauch

coronarius — wohlriechender Bastard-Jasmin

inodorus — geruchloser.

in gewöhnlichen Gärten.

Amygdalus XII, 1. Mandelbaum

persica — Pfirsichbaum

communis — gemeiner M.

nana — Zwerg M.

Prunus XII, 1. Pflaumen

Cerasus — gemeiner Kirschbaum

domestica — gemeiner Pflaumenbaum

insititia — Haberschlehen.

Pyrus XII, 4. Birn

communis — gemeiner Birnbaum

Malus — gemeiner Apfelbaum

Cydonia oblonga — der Birnquittenbaum

Cydonia maliforma — der Apfelquittenbaum

Spiraea XII, 4. Spierstaude

hypericifolia — Johanniskrautblättrige Sp.

crenata — gekerbte Sp.

opulifolia — wasserholderblättrige Sp.

Rosa XII, 5. Rose

rubiginosa — rostfarbige R.

Papaver XIII, 1. Mohn

orientale — morgenländischer M.

Aquilegia XIII, 5. Akeley

vulgaris — gemeine Ak.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

aconitifolius — eisenhutartiger H.

repens — kriechender H.

chaerophyllus — kerbelblättriger H.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz

viridis — grüne N.

foetidus — stinkende N.

in gewöhnlichen Gärten.

Lepidium XV, 1. Kresse

sativum — gemeine Garten Kr.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

tristis — traurige N.

matronalis — Frauen N.

Brassica XV, 2. Kohl

orientalis — morgenländischer K.

oleracea capitata — gemeiner weißer Kopf K.

rubra — rother oder blauer Kopfkohl

sabauda — Savoyerkohl

sabellica — grüner Wirsingkohl

selenisia — Plümagekohl, Krauskohl

botrytis — Blumenkohl

Napobrassica — Kohlrüben

gongylodes — Kohlrabi.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

moschatum — nach Bisam riechender St.

chium — griechischer St.

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

officinalis — gebräuchlicher E.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

Onobrychis — hahnenkammartiges W.

Buxus XXI, 4. Buxbaum

sempervirens — gemeiner B.

Cupressus XXI, 8. Cypresse

disticha — zweyzeilige C.

in gewöhnlichen Gärten.

Spinacia XXII, 4. Spinat
oleracea — kohltartiger S.

Juniperus XXII, 10. Wachholder
Sabina — Sadebaum.

Taxus XXII, 10. Taxus
baccata — gemeiner T.

Ficus XXIII, 3. Feigenbaum
Carica — gemeiner F.

22) In botanischen Gärten.

Iris III, 1. Schwerdlilie
squalens — schmutzfarbige S.
pumila — kleine S.

Lagurus III, 2. Sammtgras
ovatus — eyförmiges S.

Epimedium IV, 1. Sockenblume
alpinum — Alpen S.

Ilex IV, 3. Stechpalme, Stecheiche
aquifolium — gemeine St.

Lithospermum V, 1. Steinhirse
purpureo caeruleum — purpurblauer St.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
sempervirens — immergrüne O.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge
virginicum — virginische H.
lusitanicum — portugiesische H.
linifolium — leinblättrige H.
cheirifolium — levcoienblättrige H.

Symphytum V, 1. Beinwell
tuberosum — knolliger B.

in botanischen Gärten.

Borago V, 1. Boretsch
orientalis — morgenländischer B.

Cortusa V, 1. Cortuse
Matthioli — Matthiols C.

Dodecatheon V, 1. Götterblume
Meadia — Meadische G.

Convolvulus V, 1. Winde
cantabrica — cantabrische W.

Polemonium V, 1. Griechischer Baldrian
caeruleum — himmelblauer B.
reptans — kriechendes Sperrkraut.

Campanula V, 1. Glocken
pulla — dunkelfarbige G.

Ribes V, 1. Krausbeere
alpinum — wilde Johannisbeere
nigrum — schwarze Joh.

Claytonia V, 1. Claytonie
virginica — virginische C.
sibirica — sibirische C.

Heuchera V, 2. Heuchere
americana — amerikanische H.

Scandix V, 2. Kerbel
nodosa — knotiger K.
procumbens — darniederliegender K.

Smyrniurn V, 2. Smirnenkraut
Olus atrum — gemeines S.

Staphylea V, 3. Pimpernuß
pinnata — gemeine P.
trifolia — virginische P.

in botanischen Gärten.

Fritillaria VI, 1. Kaiserkrone

Corona imperialis — gemeine K.

persica — persische K.

meleagris — gemeine Schachblume.

Scilla VI, 1. Sternhyazinth

italica — italienischer aschgrauer St.

amoena — angenehmer St.

Asphodelus VI, 1. Affodille

luteus — gelbe A.

ramosus — weisse, ästige A.

Convallaria VI, 1. Mayblume

racemosa — traubentragende M.

stellata — sternförmige M.

trifolia — dreyblättrige M.

Laurus IX, 1. Lorbeer

nobilis — gemeiner L.

Borbonia — borbonischer, rother L.

aestivalis — Sommer L.

Benzoin — Benzoin L.

Sassafras — Sassafrasbaum, Fenchelholz.

Cercis X, 1. Judasbaum, Griffelbaum

siliquastrum — gemeiner europäischer J.

canadensis — canadischer J.

Kalmia X, 1. Kalmie

latifolia — breitblättrige K.

angustifolia — schmalblättrige K.

Rhododendron X, 1. Alprose, Schneerose

hirsutum — zottige A.

Chamaecistus — niedrige A.

ponticum — pontische A.

maximum — größte A.

in botanischen Gärten.

Mitella X, 2. Bischofshuth
diphylla — zweyblättriger B.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
crenata — gekerbte Sp.
opulifolia — wasserholderblättrige Sp.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
occidentalis — virginische Br.
hispidus — borstige Br.
jamaicensis — jamaische Br.
canadensis — canadische Br.

Potentilla XII, 5. Fingerkraut, Potentille
sericea — seidenartiges F.
multifida — vielspaltiges F.
fragarioides — erdbeerartiges F.

Calycanthus XII, 5. Kelchblume
floridus — Specereypfeffer.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
Glaucium — eisengraues Sch.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
salvifolius — salbeyblättrige C.
incanus — bestäubte C.

Papaver XIII, 1. Mohn
orientale — morgenländischer M.

Fothergilla XIII, 2. Fothergille
gardeni — gemeine F.

Paeonia XIII, 2. Pfingstrose
tenuifolia — schmalblättrige Pf.

Aquilegia XIII, 5. Akeley
canadensis — canadische A.

in botanischen Gärten.

Magnolia XIII, 6. Magnolie, Tulpenbaum

glauca — eisengraue M.

acuminata — spitzblättrige M.

tripetata — Sonnenschirmbaum.

Anemone XIII, 6. Windblume, Anemone

coronaria — Kronen A.

hortensis — Garten A.

palinata — handförmige A.

virginiana — virginische A.

dichotoma — zweytheilige A.

trifolia — dreyblättrige A.

quinquefolia — fünfblättrige A.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

aconitifolius — eisenhuthartiger H.

platanifolius — ahornblättriger H.

asiaticus — asiatischer H.

chaerophyllus — kerbelblättriger H.

Ajuga XIV, 1. Günsel

orientalis — morgenländischer G.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

garganicum — garganischer B.

Betonica XIV, 1. Betonie

orientalis — morgenländische B.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf

austriacum — österreichischer D.

sibiricum — sibirischer D.

thymiflorum — thymianartiger D.

Melittis XIV, 1. Waldmelisse

Melissophyllum — Melissenblatt.

in botanischen Gärten.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz
orientalis — morgenländische Br.
peregrina — fremde Br.

Bignonia XIV, 2. Trompetenbaum
Catalpa — amerikanischer Tr.
caerulea — blauer Tr.
sempervirens — immergrünender Tr.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
hirtum — steithäufiges T.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
danica — dänisches L.
anglica — engländisches L.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
clypeatum — schildförmiges St.
sinuatum — ausgehöhltes St.

Lunaria XV, 1. Mondkraut
annua — jähriges M.

Erysimum XV, 2. Hederich
repandum — geschweiffter H.

Hesperis XV, 2. Nachtviole
africana — afrikanische N.
tristis — traurige N.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
moschatum — nach Bisam riechender St.
chium — griechischer St.
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
cucularia — kappenförmiger E.
spectabilis — ansehnlicher E.

in botanischen Gärten.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

nobilis — edler E.

cava — hohler E.

lutea — gelber E.

capnoides — weißer E.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

fruticosa — strauchichte H.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

sessilifolius — ungestielter G.

Robinia XVII, 3. Robinie, Erbsenbaum

Caragana — Caraganastrauch, Bohnenbaum

frutescens — strauchartige R.

pygmaea — Zwerg R.

hispida — borstige R.

echinata — stachlichte R.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum

orientalis — morgenländischer Bl.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

glauca — eisengraue Kr.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

Onobrychis — hahnenkammartiges W.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

flava — gelbes Kn.

hyperborea — isländisches Kn.

abortiva — Bastard Kn.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

andropophora — menschenähnliche R.

Cypripedium XX, 1. Frauenschuh

bulbosum — knollichter Fr.

in botanischen Gärten.

Aristolochia XX, 2. Osterluzey

Clematidis — gemeine O.

Taxus XXII, 10. *Taxus*

baccata — gemeiner T.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1, Ehrenpreiſs

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

hederifolia — epheublätteriger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras

odoratum — wahres R.

Valeriana III, 1. Baldrian

officinalis — gebräuchlicher B.

Nardus III, 1. Borstengras

stricta — starrendes, haarförmiges B.

Alopecurus III, 2. Fuchsschwanz

pratensis — Wiesen F.

Poa III, 2. Rispengras

annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras

glomerata — rauhes Hundsgras.

Bromus III, 2. Tresp

sterilis — tauber Tr.

tectorum — Dach Tr.

Triticum III, 3. Weizen

repens — gemeine Quecken.

Holosteum III, 3. Spurre, Nelkengras

umbellatum — doldenförmige Sp.

allenthalben.

Plantago IV, 1. Wegerich

major — großer W.

media — mittlerer W.

lanceolata — spitziger W. Hundsribbe.

Lithospermum V, 1. Steinhirse

officinale — gebräuchlicher St.

arvense — Acker St.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

officinalis — gebräuchliche O.

Lycopsis V, 1. Krummhals

arvensis — Acker Kr.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

sylvestre — wilder K.

Aegopodium V, 2. Girsch, Geißfuß

Podagraria — gemeiner G.

Alsine V, 2. Vogelmeyer

media — gemeiner V.

Juncus VI, 1. Binsen

campestris — Feldbinsen.

Rumex VI, 3. Ampfer

acetosella — Schafampfer.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

Persicaria — Kottig, Flöhkraut

aviculare — gemeiner W. Vogel W.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

granulata — körniger St.

Arenaria X, 3. Sandkraut

serpyllifolia — quendelblättriges S.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke

dioica arvensis — getrennte Acker L.

allenthalben.

Cerastium X, 4. Hornkraut

vulgatum — gemeines H.

viscosum — klebriges H.

semidecandrum — halbzehnfädiges H.

arvense — Acker H.

Prunus XII, 1. Pflaumen

spinosa — Schwarzdorn.

Crataegus XII, 2. Hagedorn

Oxyacantha — Weissdorn.

Sorbus XII, 3. Spierling

aucuparia — gemeine Ebischbeere

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

Idaeus — gemeine Himbeere.

Fragaria XII, 5. Erdbeere

vesca — gemeine E.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

majus — gemeines S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuss

ficaria — Feigwarzenkraut.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

Bursa Pastoris — Hirten - Täschel.

Erysimum XV, 2. Hederich

Barbarea — Barbenkraut

alliaria — Knoblauchskraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium XVII, 2. Klee

repens — kriechender Kl.

pratense — gemeiner Spanischer Kl.

allenthalben.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn

Taraxacum — gemeiner L.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Gänseblümchen

perennis — ausdauerndes G.

Carex XXI, 3. Riedgras

Schreberi — Schreberisches R.

praecox — frühzeitiges R.

hirta — borstiges R.

Salix XXII, 1. Weide

alba — weiße W.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Ilex IV, 3. Stechpalme, Stecheiche

aquifolium — gemeine St.

Viburnum V, 3. Schlingbaum

Lantana — gemeiner Schl.

Staphylea V, 3. Pimpernuß

pinnata — gemeine P.

trifolia — virginische P.

Berberis VI, 1. Sauerdorn

vulgaris — gemeiner S.

Aesculus VII, 1. Rosskastanie

Hippocastanum — gemeine R.

Pavia — Carolinische R.

Crataegus XII, 2. Hagedorn

Aria — Mehlbeerbaum, Arolsbeere

torminalis — Darmbeerenbaum, Elsebeere

coccinea — scharlachrother Hagedorn

Crus galli — Hahnenstirn.

in Lustwäldern und Alleen.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen-Geißklee

nigricans — schwärzlicher G.

sessilifolius — ungestielter G.

hirsutus — zottiger G.

argenteus — silberfarbiger G.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum

orientalis — morgenländischer Bl.

humilis — niedriger Bl.

Betula XXI, 4. Birke

populifolia — pappelblättrige B.

nigra — schwarze B.

davurica — davurische B.

papyracea — Papier B.

lenta — zähe B.

excelsa — hohe B.

pumila — kleine, niedrige B.

Morus XXI, 4. Maulbeerbaum

alba — weißer M.

nigra — schwarzer M.

papyrifera — Papier M.

rubra — rother M.

Quercus XXI, 7. Eiche

cerris — Cerreiche, Burgundische E.

coccifera — Kermes E.

Aesculus — Speiße E. italienische E.

alba — weiße E.

rubra — rothe E.

nigra — schwarze E.

marylandica — marylandische E.

in Lustwäldern und Alleen.

Quercus XXI, 7. Eiche

discolor — haarichte E.

ilicifolia — stechpalmblättrige E.

Phellos — weidenblättrige E.

villosa — zottige E.

Juglans XXI, 7. Wallnufsbaum

regia — gemeiner W. Welschernufsbaum.

Fagus XXI, 7. Buche

Castanea — eigentlicher Kastanienbaum.

Platanus XXI, 7. Platanus

orientalis — morgenländischer P.

occidentalis — abendländischer P.

Pinus XXI, 8. Fichte

Strobus — Tannen-Fichte, Weymuthskiefer

Larix — Lerchen F. Lerchenbaum

Balsamea — Balsamtanne

canadensis — Hemlocks F. Schierlingstanne

nigra — schwarze F.

Thuja XXI, 8. Lebensbaum

occidentalis — abendländischer L.

orientalis — morgenländischer L.

Hippophae XXII, 5. Sanddorn

ramnoides — weidenblättriger S.

Populus XXII, 6. Pappel

dilatata — italienische P.

carolinensis — carolinische P.

monilifera — canadische P.

graeca — griechische P.

Juniperus XXII, 10. Wachholder

Virginiana — virginischer W.

in Lustwäldern und Alleen.

Juniperus XXII, 10. Wachholder

Caroliniana — carolinischer W.

thurifera — Weyrauch W.

lycia — lycischer W.

Oxycedrus — spanischer W.

Acer XXIII, 1. Ahorn

Platanoides — spitzblättriger A.

Pseudo-Platanus — unächter Platanus

tataricum — russischer Ahorn.

rubrum — rother A.

saccharinum — Zucker A.

pensylvanicum — gestreifter A.

Opalus — italienischer A.

Negundo — eschenblättriger A.

Celtis XXIII, 1. Zirgelbaum

australis — südlicher Z.

occidentalis — amerikanischer Z.

orientalis — ostindischer Z.

Gleditschia XXIII, 2. Gleditschie

triacantha — dreydornige G.

monosperma — einsaamige G.

inermis — unbewährte G.

Fraxinus XXIII, 2. Esche

juglandifolia — wallnufsblättrige E.

caroliniana — carolinische E.

pubescens — weichhaarige E.

sambuccifolia — hollunderblättrige E.

parvifolia — kleinblättrige E.

25) Auf Alpen und andern hohen
Gebirgen.

Paederota II, 1. Bonarotte

Ageria — gelbe B.

Bonarota — blaue B.

Iris III, 1. Iris

graminea — grasartige I.

Asperula IV, 1. Meyerkraut

Taurina — taurinisches M.

Epimedium IV, 1. Sockenblume

alpinum — Alpen S.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge

apenninum — apenninische H.

Androsace V, 1. Androsace

villosa — haarichte A.

lactea — milchweifse A.

Primula V, 1. Schlüsselblume

Auricula — Berg S.

Cortusa V, 1. Cortuse

Matthioli — Matthiols C.

Soldanella V, 1. Drattelblume

alpina — Alpen Dr.

Azalea V, 1. Mayblumenbusch

procumbens — liegender M.

Phyteuma V, 1. Rapunzel

pauciflora — wenigblumige R.

comosa — zopfige R.

Lonicera V, 1. Lonicere

alpigena — Alpen L.

caerulea — blaue L.

- auf Alpen und hohen Gebirgen.
- Hyoscyamus** V, 1. Bilsenkraut
 scopolia — scopolisches B.
- Rhamnus** V, 1. Wegdorn
 alpinus — Alpen W.
- Evonymus** V, 1. Spillbaum
 latifolius — breitblättriger Sp.
- Thesium** V, 1. Leinkraut
 alpinum — Alpen L.
- Vinca** V, 1. Sinngrün, Wintergrün
 major — großblumiges W.
- Gentiana** V, 2. Enzian
 acaulis — stammloser E.
 verna — Frühlings E.
- Chaerophyllum** V, 2. Kälberkern
 hirsutum — zottiger K.
- Pimpinella** V, 2. Bibernell
 glauca — eisengraue B.
 dioica — niedrige B.
- Staphylea** V, 3. Pimpernuß
 pinnata — gemeine P.
- Fritillaria** VI, 1. Kaiserkrone
 persica — persische K.
 pyrenaica — pyrenäische K.
 meleagris — gemeine Schachblume.
- Ornithogalum** VI, 1. Vogelmilch
 pyrenaicum — pyrenäische V.
- Hyacinthus** VI, 1. Hyacinthe
 comosus — zopfige H.
 botryoides — Trauben H.
 racemosus — gemeine kleine Trauben H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Rhododendron X, 1. Alprose, Schneerose

hirsutum — zottige A.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

Cotyledon — nabelkrautartiger St.

mutata — veränderter St.

androsacea — zweyblumiger St.

Arenaria X, 3. Sandkraut

saxatilis — Stein S.

verna — Frühlings S.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

pilosa — haarichte W.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

aurea — goldgelbes F.

Capparis XIII, 1. Kappern

spinosa — stachlichte K.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

Glaucium — eisengraues S.

Anemone XIII, 6. Windblume

sylvestris — Haynanemone.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenkraut

alpinum — Alpen W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

platanifolius — ahornblättriger H.

rutaefolius — rautenblättriger H.

glacialis — Eiss H.

nivalis — Schnee H.

alpestris — Alpen H.

Isopyrum XIII, 6. Doldocke

thalictroides — thalictrumartige D.

aquilegioides — akeleyartige D.

- auf Alpen und hohen Gebirgen.
Helleborus XIII, 6. Nießwurz
viridis — grüne N.
Ajuga XIV, 1. Gänsef
alpina — Alpen G.
Teucrium XIV, 1. Gamander
montanum — Berg G.
Bartsia XIV, 2. Bartschie
alpina — Alpenbartsche.
Tozzia XIV, 2. Tozzie
alpina — Alpen T.
Erinus XIV, 2. Leberbalsam
alpinus — Alpen T.
Myagrum XV, 1. Leindotter
saxatile — Alpen L.
Draba XV, 1. Hungerblümchen
pyrenaica — pyrenäisches H.
hirta — rauchhaarichtes H.
alpina — Alpen H.
Lepidium XV, 1. Kresse
alpinum — Alpen Kr.
petraeum — Stein Kr.
Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
saxatile — Stein T.
Dentaria XV, 2. Zahnkraut
enneaphylla — neunblättriges Z.
pentaphylla — fünfblättriges Z.
Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.
Ononis XVII, 3. Hauhechel
rotundifolia — rundblättrige H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Orobis XVII, 3. Erven, Fasankraut

luteus — gelbe E.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

exscapus — schaftloses W.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpinum — Alpen K.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

mollis — weiche Distel.

Tussilago XIX, 2. Huflattig

frigida — nordischer H.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz

Pardalianches — gemeine G.

plantagineum — wegerichblättrige G.

Belldiastrum — maßliebartige G.

Viola XIX, 6. Veilchen

montana — Berg V.

canis — Alpen V.

biflora — zweyblumiges V.

calcarata — gesporntes V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

pallens — bleiches Kn.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

Corallorhiza — Corallenwurzel

myodes — insektentragende R.

arachnites — spinnenartige R.

Carex XXI, 5. Riedgras

Bellardi — Bellardisches mäuseschwanzartig. R.

rigida — steifes R.

montana — Berg R.

elandestina — heimliches R.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carex XXI, 3. Riedgras

pilosa — haarichtes R.

alba — weisses R.

capillaris — haarförmiges R.

brachystachys — kurzähriges R.

Michelii — Michelisches R.

atro fusca — schwarzbraunes R.

Salix XXII, 1. Weide

phylicifolia — phylicablätterige W.

myrsinites — glänzende W.

arbuscula — Zwerg W.

retusa — stumpfblätterige W.

reticulata — netzartige W.

bicolor — zweyfarbige W.

Ephedra XXII, 10. Meerträubel

distachya — europäischer M.

26) Schmarozerpflanzen.

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz

major — grofse S.

(Auf Äckern, Wiesen, bergigen Wäldern,
auf den Wurzeln anderer Gewächse, be-
sonders der Bäume und Sträuche.)

J U N Y.

1) Am Meerstrande.

Scirpus III, 1. Binsengras

lacustris — See B.

maritimus — Ufer B.

Elymus III, 2. Haargras

arenarius — Sand H.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Seestrands W.

subulata — Pfriemenförmiger W.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut

marinum — Meer S.

Convolvulus V, 1. Winde

Soldanella — Meerwinde.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valeraudi — rundblätterigo Wasserpimpinello.

Glaux V, 1. Milchkraut.

maritima — Meestrands M.

am Meerstrande.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
maritimum — Seestrands G.

Salsola V, 2. Salzkraut
Kali — rauchblättriges S.
Tragus — glattblättriges S.
Soda — Sode, Seesalzkraut
altissima — höchstes S.
fruticosa — strauchartiges S.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
maritimum — Meestrand-Salzbinse.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Paralias — Sand W.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
maritima — Meestrands W.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
officinalis — gebräuchliches L.
danica — dänisches L.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume
maritimus — grünblättrige Meer L.
incanus — bestäubte L.
annuus — jährige L.
tricuspidatus — dreyzackige L.

Crambe XV, 2. Meerkohl.
maritima — eigentlicher M.

Athanasia XIX, 1. Athanasie
maritima — Seestrands A.

Zostera XX, 3. Wasserriemen
marina — Meer W.
oceanica — oceanischer W.

2) Im Wasser.

Hippuris I, 1. Thannwedel
vulgaris — gemeiner Th.

Galium IV, 1. Labkraut
palustre — Sumpf L.

Trapa IV, 1. Stachelnuss
natans — schwimmende St.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
natans — schwimmendes S.
perfoliatum — durchstochenes S.
densum — dichtes S.
lucens — leuchtendes S.
serratum — sägenartiges S.
compressum — zusammengedrücktes S.
pectinatum — kammförmiges S.
setaceum — borstenförmiges S.
marinum — Meer S.

Menyanthes V, 1. Zottenblume
trifoliata — dreyblättrige Z.

Oenanthe V, 2. Rebendolde
fistulosa — röhrige R.

Cicuta V, 2. Wüterich, Wasserschierling
virens — giftiger W.

Acorus VI, 1. Kalmus
calamus — gemeiner K.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechselwegtritt.

Butomus IX, 3. Wasserviole
umbellatus — doldenförmige W.

im Wasser.

Nymphaea XIII, 1. Seeblume

lutea — gelbe S.

alba — weisse S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuss

sceleratus — Gift H. Wassereppich

heterophyllus — Wasser H. mit zweyerley
Blättern

aquaticus — Wasser H.

fluvialis — Fluss H.

Chara XXI, 1. Armleuchter

tomentosa — filziger A.

vulgaris — gemeiner A.

hispida — steifborstiger A.

flexilis — biegsamer A.

Lemna XXI, 2. Wasserlinsen

trisulca — grosse, dreyspitzige W.

minor — kleine W.

gibba — höckerichte W.

Sparganium XXI, 3. Igelsknospe

ramosum — ästige I.

simplex — einfache I.

natans — schwimmende I.

Najas XXI, 6. Najade

minor — kleine N.

Myriophyllum XXI, 7. Federkraut

spicatum — ährenförmiges F.

Ceratophyllum XXI, 7. Wasserhorn

demersum — rauhes W.

submersum — glattes W.

im Wasser.

Sagittaria XXI, 7. Pfeilkraut
sagittifolia — gemeines Pf.

3) Am Wasser.

- Veronica* II, 1. Ehrenpreis
Beccabunga — Bachbungen
anagallis aquatica — Wassergauchheil
scutellata — schildförmiger E.
- Lycopus* II, 1. Wolfsfuß
Europaeus — Europäischer W.
- Iris* III, 1. Schwerdlilie
Pseudacorus — Wasser S.
foetidissima — stinkende S.
- Scirpus* III, 1. Binsengras
capitatus — köpfiges B.
lacustris — See B.
- Alopecurus* III, 2. Fuchsschwanz
geniculatus — knieförmiger F.
- Agrostis* III, 2. Straußgras
stolonifera — auslaufendes Str.
- Aira* III, 2. Schmelengras
aquatica — Wasser Sch.
- Poa* III, 2. Rispengras
aquatica — Wasser R.
palustris — Sumpf R.
- Galium* IV, 1. Labkraut
uliginosum — Morast L.
- Plantago* IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — Pfriemenförmiger W.
coronopifolia — Krähenfuß W.

am Wasser.

Myosotis V, 1. Mausohr — Vergifs mein nicht
scorpioides palustris — Sumpf — V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
nummularia — Wiesengeld.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle

Solanum V, 1. Nachtschatten

Dulcamara — Bittersüßs.

Cicuta V, 2. Wüterich

virosa — Wasserschierling.

Juncus VI, 1. Binsen

conglomeratus — Knopfbinsen

effusus — Flatterbinsen

inflexus — gebogene B.

articulatus — gegliederte B.

aquaticus — gegliederte Wasser B.

uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.

bulbosus — knollige B.

Rumex VI, 3. Ampfer.

crispus — krausblättriger A.

optusifolius — stumpfblättriger A.

aquaticus — Wasserampfer.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

amphibium — Wechselwegtritt

hydropiper — Wasserpfeffer.

Stellaria X, 3. Meirich

pulustris — grasblättriger Sumpf M.

Cerastium X, 4. Hornkraut

aquaticum — Wasser H.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

palustris — Sumpf W.

am Wasser.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

Ulmaria — Wiesenkönigin, Wiesenwedel

Geum XII, 5. Benediktenkraut

rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut

palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

flammula — kleiner H. Egelkraut

reptans — kriechender H.

lingua — großer Sumpf H.

Stachys XIV, 1. Stachys, Andorn

palustris — brauner Wasser A.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfkraut

nodosa — knotige Br.

aquatica — Wasser Br.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Nasturtium — Brunnenkresse

sylvestre — wilde R.

amphibium — Wasser od. Land R.

palustre — Sumpf R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

palustre — Sumpf R.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

maritimus — Meerstrands Sch.

uliginosus — Sumpf Sch.

Senecio XIX, 2. Krenzkraut

paludosus — Sumpf Kr.

Calla XX, 3. Schlangenkraut

palustris — Sumpf Sch. Wasseraron.

am Wasser.

Carex XXI, 3. Riedgras
 cyperoides — cyperartiges R.
 flacca — schlaffes R.
 paludosa — Sumpf R.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
 maritima — Meerstrands W.
Potamogeton IV, 3. Saamkraut
 marinum — Meer S.
Convolvulus V, 1. Winde
 soldanella — Meerwinde
Samolus V, 1. Samoskraut
 Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.
Glaux V, 1. Milchkraut
 maritima — Meerstrands M.
Chenopodium V, 2. Gänsefuß
 maritimum — Meerstrands G.
Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack.
 maritimum — Meerstrands S.
Sedum X, 4. Sedum, Fettehenne
 Cepaea — Burzelkrautartiges Sedum.
Chara XXI, 1. Armlencher
 hispida — steifborstiger A.

5) An quelllichten Orten

Scirpus III, 1. Binsengras
 acicularis — nadelförmiges B. Quell B.
Panicum III, 2. Hirsegras
 crus corvi — rabenfüssiges H.

an quéllichten Orten.

Galium IV, 1. Labkraut

palustre — Sumpf-Labkr.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

Stellaria X, 3. Meirich

alsine — vogelkrautartige M.

6) Auf Torf - und Moorgrund.

Scirpus III, 1. Binsengras

cespitosus — Moor B.

Eriophorum III, 1. Dünngras, Wollgras

polystachion — vielähriges D.

Alopecurus III, 2. Fuchsschwanz

geniculatus — knieförmiger F.

Juncus VI, 1. Binsen

conglomeratus — Knopf B.

effusus — Flatter B.

inflexus — gebogene B.

filiformis — fadenförmige B.

squarrosus — sparrichte B.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere

Oxycoccus — Moosbeere.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

monophyllos — einblättrige R.

7) Auf sumpfigen und feuchten Wiesen.

Iris III, 1. Schwerdlilie

sibirica — sibirische S.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Cynosurus III, 2. Kammgras
caeruleus — blauer K.

Galium IV, 1. Labkraut
rubroides — rötheartiges L.
uliginosum — morast L.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifs mein nicht
scorpioides palustris — Sumpf V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
thyrsiflora — sträufsige L.
nummularia — Wiesengeld.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — europäische P.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
palustre — Sumpf S.

Stellaria X, 3. Meirich
palustris — grasblättriger Sumpf M.
alsine — vogelkrautartiger M.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
flos cuculi — Guckkucksblume
dioica sylvestris — getrennte wilde L.

Geum XII, 5. Benediktenkraut
rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuss
flammula — kleiner H. Egelkraut
reptans — kriechender H.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Trollius XIII, 6. Trollblume

Europaeus — Europäische Tr.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

palustris — Sumpf L.

sylvatica — Wald L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz

vernalis — Frühlings Br.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

hirsuta — rauches S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

chaerophyllum — kerbelblättriger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern

palustris — Sumpf P.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

siliquosus Wiesen Sch.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

paludosus — Sumpf Kr.

Arnica XIX, 2. Wolverley

montana — Berg W.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

latifolia — breitblättriges Kn.

sambuccina — hollunder Kn.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

ovata — eyrunde R.

monorchis — einknollichte R.

Arum XX, 3. Aron

maculatum — gefleckter, gebräuchlicher A.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Sparganium XXI, 3. Igelsknospe

simplex — einfache I.

Carex XXI, 3. Riedgras

vulpina — Fuchs R.

muricata — zackiges R.

stellulata — sternförmiges R.

remota — entferntes R.

cespitosa — Rasen R.

acuta — spitziges R.

Oederi — Oederisches R.

flava — gelbliches R.

fulva — dunkelrothes R.

distans — entferntes R.

pallescent — blasses R.

panicea — Hirse R.

flacca — schlaffes R.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften,
Grasplätzen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

spicata — einähriger kleiner Berg E.

Phalaris III, 2. Glanzgras

phleoides — lischartiges Gl.

Phleum III, 2. Lischgras

pratense — Wiesen L. Thimotheusgras

nodosum — knotiges L.

Agrostis III, 2. Straußgras

canina — Hunds Str.

capillaris — haarförmiges Str.

alba — weißes Str.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Aira III, 2. Schmelengras

cespitosa — Rasenschmelen

flexuosa — bogrige Schmelen

praecox — frühe Sch.

curyophyllea — nelkenartige Sch.

Poa III, 2. Rispengras

trivialis — dreyblüthiges, gemeines R.

angustifolia — schmalblättriges R.

pratensis — Wiesen R.

cristata — kammförmiges R.

bulbosa — knolliges R.

Briza III, 2. Zittergras

minor — kleines Z.

media — mittleres Z.

Festuca III, 2. Schwingel

decumbens — liegender S.

Bromus III, 2. Tresp

arvensis — Acker Tr.

Avena III, 2. Hafer

flavescens — Gold H. gelber H.

pratensis — Wiesen H.

Elymus III, 2. Haargras

Europaeus — Europäisches H.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

boreale — mitternächtliches L.

Alchemilla IV, 1. Sinau

vulgaris — gemeiner S. Frauenmantel.

Phyteuma V, 1. Rapunzel

spicata — ährentragende R.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Gentiana V, 2. Enzian

Centaureum — Tausendgüldenkraut.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

aromaticum — gewürzhafter K.

Allium VI, 1. Lauch

vineale — Weinlauch, rother Feldknoblauch.

Rumex VI, 3. Ampfer

Patientia — gelinder Garten A. Englischer Spinat

sanguineus — bluthrother A.

crispus — krausblättriger A.

acetosa — gemeiner Sauerampfer.

Polygonum VIII, 2. Wegtritt

Bistorta — Natterwurz, Krebswurz.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

filipendula — Filipendel.

Thalictrum XIII, 6. Thalictrum, Wiesenraute

aquilegifolium — ackleyblättrige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

bulbosus — knollichter H.

repens — kriechender H.

polyanthemos — vielblumiger H.

acris — scharfer H.

Ajuga XIV, 1. Günsel

pyramidalis — pyramidenförmiger G.

reptans — kriechender G.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Prunella XIV, 2. Brunelle, Braunheil

laciniata — zerschlässene Br.

- auf trocknen Wiesen u. s. w.
Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm
 Crista Galli — gewöhnlicher H.
 Alektorolophus — haarichter H.
Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen
 pratense — Wiesen K.
Cardamine XV, 2. Schaumkraut
 pratensis — Wiesen S.
Geranium XVI, 1. Storchschnabel
 pratense — Wiesen St.
 dissectum — zerschnittener St.
 sanguineum — blutiger St.
Polygala XVII, 2. Kreuzblume
 vulgaris — gemeine Kr. Natterzünglein.
Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weiberkrieg
 arvensis — Acker H.
 spinosa — stachlichte H.
Orobanchus XVII, 3. Erven, Fasankraut
 tuberosus — knollichte E.
 tenuifolius — zartblättrige E.
Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kicher
 tuberosus — knollichte Pl.
 pratensis — Wiesen Pl.
Ervum XVII, 3. Linse
 tetraspermum — viersaamige L.
 hirsutum — zottige L.
 monanthus — einblumige L.
Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß
 perpasillus — sehr kleiner V.
Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut
 Cicer — wilde Kichern, kichernartiges W.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Trifolium XVII, 3. Klee

repens — kriechender Kl. weißer Wiesen Kl.

pratense — gemeiner spanischer Wiesen Kl.

procumbens — liegender Kl.

Lotus XVII. 3. Schotenklee

arvensis — Feld Sch.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichel Kl.

lupulina — kleiner Hopfen Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Scorzonera XIX, 1., Scorzonere

humilis — niedrige S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — Nagelkraut, kleines gelbes Maus-
öhrchen

dubium — zweifelhaftes H.

Auricula — großes Mausöhrchen

cymosum — langes Mausöhrchen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

maculata — geflecktes F.

radicata — langwurzlichtes F.

Gnaphalium XIX, 1. Ruhrkraut

dioicum — getrenntes R.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume,

Wucherblume

Levcanthemum — große Maßliebe.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Viola XIX, 6. Veilchen

persicifolia — pfirsichblättriges V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

bifolia — zweyblättriges Kn.

coriophora — stinkendes Kn.

mascula — männliches Kn.

ustulata — Zwerg Kn.

militaris — kriegerisches Kn.

fusca — braunes Kn.

maculata — geflecktes Kn.

conopsea — schnakenartiges Kn.

9) Auf Sandboden.

Cynosurus III, 2. Kammgras

durus — hartes K.

Festuca III, 2. Schwingel

ovina — Schafschwingel

myosurus — mäuseschwanzartiger S.

Avena III, 2. Hafer

sesquiteria — dritthalber Hafer, Silberhafer

pubescens — zarthäriger H.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf

arenaria — Sandschilf

Plantago IV, 1. Wegerich

psyllium — flöhsaamen W.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Allium VI, 1. Lauch

arenarium — Sandlauch.

Dianthus X, 2. Nelke

arenarius — Sand N. Bergfelder N.

auf Sandboden.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke

viscaria — Pechnelke.

Spergula X, 4. Spark

saginoides — mastkrautartiger Sp.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Papaver XIII, 1. Mohn

Argemone — keulenförmig M. klein. Acker M.

dubium — zweifelhafter M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

Helianthemum — gemeiner Sonnengünsel.

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz

ramosa — ästige S.

Iberis XV, 1. Bauernsenf

nudicaulis — nackendstengliger B.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

campestre — Feld St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

coronopifolia — krähensfußblättriges D.

laevigata — glattes D.

Brassica XV, 2. Kohl

Erucastrum — raukenartiger K.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — Färber G.

pilosa — haarichter G.

germanica — deutscher G.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weibekrieg

arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichte H.

auf Sandboden.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
arenarius — Sand Tr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — Nagelkraut, kleines gelbes Maus-
öhrchen

dubium — zweifelhaftes H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
foetida — stinkender P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
glabra — glattes F.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
arenarium — Sand R. Mottenblume

Holcus XXIII, 1. Honiggras
mollis — weiches H.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen:

Aira III, 2. Schmelengras
montana — Berg Sch.

canescens — graues Sch. Silbergras.

Melica III, 2. Perlgras
ciliata — gefranztes P.

Briza III, 2. Zittergras
Eragrostis — schönstes Z.

Galium IV, 1. Labkraut
saxatile — Stein L.
pusillum — kleinstes L.
glaucum — eisengraues L.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
tinctoria — färbende O.

Campanula V, 1. Glocken
latifolia — breitblättrige Gl.
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Thesium V, 1. Leinblatt, Flachskraut

linophyllum — leinblättriges *Thesium*.

Asclepias V, 2. Schwalbenwurz, Hundskohl

Vincetoxicum — gemeine S.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Eryngium V, 2. Manstreu

campestre — Feldmanstreu

Erica VIII, 1. Heide

vulgaris — gemeine H.

Dictamnus X, 1. Diptam

albus — weißer gemeiner D.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut

nutans — überhängendes L.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

reflexum — zurückgebogenes *Sedum*

rupestre — Felsen - *Sedum*.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Botrys — Traubengamander.

Thymus XIV, 1. Thymian

Serpyllum — Feldkümmel.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

montanum — Berg St.

saxatile — eigentliches St.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje

erysimoides — hederichartige L.

Turritis XV, 2. Thurmkraut

glabra — glattes Th.

hirsuta — zottiges Th.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Brassica XV, 2. Kohl

Erucastrum — raukenartiger K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

lucidum — glänzender St.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume

amara — bittere Kr.

Genista XVII, 3. Ginster

sagittalis — pfeilförmiger G.

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G. Stachelpfrieme.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weibekrieg

arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichte H.

Vicia XVII, 3. Wicke

pisiformis — erbsenartige W.

dumetorum — Hecken W.

sylvatica — Wald W.

cassubica — cassubische W.

multiflora — vielblumige W.

angustifolia — schmalblättrige W.

lathyroides — platterbsenartige W.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

galegiformis — geißrautenartiges W.

microphyllus — kleinblättriges W.

glycyphyllus — süßholzartiges W.

danicus — dänisches W.

exscapus — schaftloses W.

Trifolium — XVII, 3. Klee.

rubens — röthlicher, langähriger Kl.

montanum — Bergklee, weißer Spitzklee

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Trifolium XVII, 3. Klee

aureum — goldfarbiger Kl.

spadiceum — kastanienbrauner Kl.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichelklee

lupulina — kleiner Hopfen Schn.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu

montanum — Berg J.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

hispanica — spanische Sc.

graminifolia — grasartige Sc.

purpurea — purpurrothe Sc.

laciniata — zerschlossene Sc.

Sactuca XIX, 1. Salat

perennis — ausdauernder S.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

viminea — klebrichte Pr.

purpurea — purpurrothe Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

lactucaceum — lattichartiges H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

arenarium — Sand R.

dioicum — getrenntes R.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz

plantagineum — wegerichblättrige G.

Bellidiastrum — maßliebartige G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

paniculata — rispenförmige Fl.

alba — weiße Fl.

auf kleinen Bergen u. s. w.

Satyrion XX, 1. Stendel
hircinum — stinkender St.
viride — grüner St.
albidum — weißlicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
myodes — insektentragende R.
arachnites — spinnenartige R.

Serapias XX, 1. Zimbel
ensifolia — schwerdförmige Z.
lancifolia — lanzettblättrige Z.
rubra — rothe Z.

Poterium XXI, 7. Becherblume
Sanguisorba — gemeine B. Nagelkraut.

11) Auf gebauten Äckern.

Avena III, 2. Hafer
sativa — gemeiner H.
nuda — nackender H.

Secale III, 2. Korn, Roggen
cereale — gemeines K.

Triticum III, 2. Weizen
hybernum — Winter W.
compositum — vieljähriger W. Wunder W.
turgidum — englischer W.
polonicum — polnischer W.
spelta — zweykörniger W.
monococcon — einkörniger W.
glaucum — thüringischer W., ganz glatter W.

Rubia IV, 1. Grapp
tinctorum — Färberröthe.

auf gebauten Äckern.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — Türkischer T.

Carum V, 2. Kümmel

carvi — gemeiner K.

Linum V, 5. Lein oder Flachs

usitatissimum — gewöhnlicher jähriger L.

humile — niedriger L.

perenne — ausdauernder L.

Spergula X, 4 Spark

arvensis — Acker Sp.

Brassica XV, 2. Kohl

Napus sativa — Rübsaamen, Rübsen

Rapa — gemeine Rübe

Sinapis XV, 2. Senf

alba — weißer S.

nigra — gemeiner schwarzer S.

Isatis XV, 2. Waid

tinctoria — Färberwaid.

Vicia XVII, 3. Wicke

sativa — zahme W. Futterwicke.

Ervum XVII 3. Linse

Lens — gemeine Linse.

Hedysarum XVII, 3 Hahnenkopf

Onobrychis — Esparcette, Hahnenkammklee.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

sativa — zahmer Schneckenklee, Lucerne.

Cucurbita XXI, 9. Kürbiss

Pepo — gemeiner K.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides arvensis — klein Ackermause-
öhrchen.

Anagallis V, 1. Gauchheil
arvensis — gemeiner Acker G.
caerulea — blauer Acker G.

Convolvulus V, 1. Winde
arvensis — Ackerwinde.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume
verticillatum — wirtelförmige Kn.

Linum V, 5. Lein
Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch
vineale — Weinlauch, rother Feldknoblauch.

Rumex VI, 3. Ampfer
acetosella — Schafampfer.

Scleranthus X, 2. Knauel
annuus — jähriger Kn.
perennis — ausdauernder Kn.

Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
arvensis — großblättriger Acker-Meirich.

auf ungebauten Äckern.

Cerastium X, 4. Hornkraut
arvense — Ackerhornkraut.

Spergula X, 4. Spark
arvensis — Acker Sp.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
purpureum — rother B.
amplexicaule — ungestielter B.

Thymus XIV, 1. Thymian
Serpyllum — Feldkümmel.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm
Crista galli — gewöhnlicher H.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
arvense — Acker L.
minus — kleines L.
Orontium — Kalbsnase, Dorant.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
arvense — Acker T.
campestre — Feld T.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
campestre — Feld St.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Brassica XV, 2. Kohl
austriaca — österreichischer K.
Napus sylvestris — wilder K.

Sinapis XV, 2. Senf
arvensis — Ackersenf

auf ungebauten Äckern.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
dissectum — zerschnittener St.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
officinalis — gebräuchlicher E.

Ononis XVII, 2. Hauhechel, Weiberkrieg
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichte H.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern.
sativus — zahme Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
biennis — Winter W. zweyjährige W.
monantha — einblumige W.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.
hirsutum — zottige L.
monanthus — einblumige L.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß
perpusillus — sehr kleiner V.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
lupulina — gelber Sichelklee
falcata — kleiner Hopfen Schn.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel.
arvensis — Acker G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Auricula — großes Mausöhrchen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

auf ungebauten Äckern.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Levcanthemum — große Maßliebe

inodorum — geruchlose M.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — Acker Ch.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V.

arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Agrostis III, 2. Straußgras

Spica venti — Acker Str.

Bromus III, 2. Tresp

secalinus — Roggen Tr.

squarrosus — sparrichte Tr.

Avena III, 2. Hafer

fatua — wilder H. Flug H.

Lolium III, 2. Lolch

temulentum — Taumellolch.

Plantago IV, 1. Wegerich

Psyllium — Flöhsaamen W.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O.

Anagallis V, 1. Gauchheil

arvensis — gemeiner Acker G.

caerulea — blauer G.

Campanula V, 1. Glocken

Speculum Veneris — Venusspiegel, Frauensp.

hybrida — unächter Frauenspiegel.

im Getreide,

Myosurus V, 7. Mäuseschwanz
minimus — kleinster M.

Agrostemma X, 4. Raden
Githago — Korn R.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblättrige W.
segetalis — Korn W.
helioscopia — Garten W. sonnenwendige W.

Papaver XIII, 1. Mohn
Rhoeas — Feld M. Klatschrosen.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn
Consolida — Feld R.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel
arvensis — Acker N.

Adonis XIII, 6. Adonis
aestivalis — Sommer A.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
arvensis — Acker H.

Myagrum XV, 1. Leindotter
sativum — zahmer L. Flachsdotter
paniculatum — rispenförmiger L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
arvense — Acker T.

Brassica XV, 2. Kohl
campestris — Acker K.

Sinapis XV, 2. Senf
arvensis — Acker S.

Raphanus XV, 2. Rettig
Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich.

im Getreide.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
officinalis — gebräuchlicher E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern
Nissolia — Nissolische Pl.

hirsutus — zottige Pl.

tuberosus — knollige Pl.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
arvensis — Acker G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
 cherblume

segetum — Getreide W.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — Acker Ch.

Valantia XXIII, 1. Vaillante
Aparine — klebkrautartige V.

14) In größern und dichten Wäl-
 dern.

Salvia II, 1. Salbey
glutinosa — klebrige S.

Poa III, 2. Rispengras
nemoralis, Hain R.

Asperula IV, 1. Waldmeister
tinctoria — färbender W.

Galium IV, 1. Labkraut
sylvaticum — Wald L.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
nemorum — Hain L.

in grössern u. dichten Wäldern.

Campanula V, 1. Glocken

persicifolia — pfirsichblättrige G.

latifolia — breitblättrige G.

Phyteuma V, 1. Rapunzel

spicata — ährentragende R.

Lonicera V, 1. Lonicere

Periclimenum — gemeine L. Je länger, je lieber.

Viburnum V, 3. Schlingbaum

Opulus — Wasserholder.

Convallaria VI, 1. Mayblume

bifolia — zweyblättrige M.

Juncus VI, 1. Binsen

articulatus sylvaticus — gegliederte Wald B.

uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.

bulbosus — knollige B.

niveus — weisse B.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere

Myrtillus — gemeine Heidelbeere.

Paris VIII, 4. Einbeere

quadrifolia — vierblättrige E.

Ledum X, 1. Kühnrost

palustre — Sumpf K. wilder Rosmarin.

Pyrola X, 1. Pyrole, Wintergrün

rotundifolia — rundblättriges W.

minor — kleines W.

secunda — einseitigblühendes W.

umbellata — doldenförmiges W.

uniflora — einblumiges W.

Rubus XII, 5. Brommbeere

saxatilis — Felsen-Himbeere.

- in größern u. dichten Wäldern.
- Actea** XIII, 1. Christophskraut
 spicata — ährenförmiges Ch.
- Ranunculus** XIII, 6. Hahnenfuß
 lanuginosus — wollichter H.
- Scrophularia** XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz
 nodosa — knotige Br.
- Lunaria** XV, 1. Mondkraut
 rediviva — ausdauerndes M.
 annua — jähriges M.
- Hesperis** XV, 2. Nachtviole
 tristis — traurige N.
 matronalis — Frauen N.
- Cardamine** XV, 2. Schaumkraut
 impatiens — Spring Sch.
- Sisymbrium** XV, 2. Rauke
 Loeselii — Lösels R.
- Orobus** XVII, 3. Erven, Fasankraut
 vernus — Frühlings E.
 tuberosus — knollige E.
 tenuifolius — zartblättrige E.
 niger — schwarze E.
- Cineraria** XIX, 2. Aschenpflanze
 integrifolia — ganzblättrige A.
 cordifolia — herzblättrige A.
- Ophrys** XX, 1. Ragwurz
 Nidus avis — Vogelnest.
- Arum** XX, 3. Aron
 maculatum — gefleckter A.
- Carex** XXI, 3. Riedgras
 sylvatica — Wald R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
officinalis — gebräuchlicher E.

Salvia II, 1. Salbey
sylvestris — wilde S.

Milium III, 2. Milisgras, Fladdergras
effusum — Waldhirsegras.

Agrostis III, 2. Straußgras
arundinacea — rohrartiges St.
rubra — rothes St.

Melica III, 2. Perlgras
nutans — überhängendes P.

Poa III, 2. Rispengras
nemoralis — Wald R.

Briza III, 2. Zittergras
media — mittleres Z.

Festuca III, 2. Schwingel
bromoides — trespartiger S.

Bromus III, 2. Tresp
giganteus — Futter Tr.

Avena III, 2. Hafer
pratensis — Wiesen H.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf
arenaria — Sandschilf.

Cornus IV, 1. Cornelbaum
sanguinea — wilder C. Hartriegel.

Campanula V, 1. Glocken
persicifolia — pfirsichblättrige Gl.

Phyteuma V, 1. Rapunzel
spicata — ährentragende R.

in lichten Laubholzwäldern.

Rhamnus V, 1. Wegdorn
frangula — Faulbaum.

Evonymus V, 1. Spillbaum
Europaeus — Pfaffenhütchen.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut
ramosum — ästiges Sp.

Liliago — großblumiges Erd Sp.

Trientalis VII, 1. Trientale, Schirmkraut
Europaea — Europäische Tr.

Vaccinium VIII, 1. Preusselbeere
Myrtillus — gemeine Heidelbeere.

Erica VIII, 1. Heide
vulgaris — gemeine H.

Pyrola X, 1. Wintergrün
rotundifolia — rundblättriges W.

minor — kleines W.

secunda — einseitigblühendes W.

umbellata — doldenförmiges W.

uniflora — einblumiges W.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
nemorum — Waldmeirich.

Arenaria X, 3. Sandkraut
trinervia — dreyribbiges S.

Prunus XII, 1. Pflaumen
Padus — gemeine Traubenkirsche.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
Aruncus — Waldgeißbart.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
flammula — brennende W.

in licht. Laubholz-Wäldern.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
minus — kleine W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
polyanthemos — vielblumiger H.

Galeopsis XIV, 1. Katzensicht, Hohlzahn
Galeobdolon — gelbes K. Goldnessel.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Wachtel-
weizen.

nemorosum — blauer K.

sylvaticum — Wald Fleischblume.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
sylvaticum — Wald St.

sanguineum — blutiger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern
sylvestris — wilde Pl.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere
humilis — niedrige Sc.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
radicata — langwurzlichtes F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
nemorensis — Hainen Kr.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
officinalis — gebräuchlicher E.

in Feldbüschen u. Gesträuchen.

Galium IV, 1. Labkraut

Molugo — weisses L.

sylvaticum — Wald L.

boreale — mitternächtliches L.

Campanula V, 1. Glocken

rapunculoides — rapunzelartige Glocken.

Berberis VI, 1. Sauerdorn

vulgaris — gemeiner S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

Behen — gemeiner weisser C.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

Galeobdolon — gelbes K.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — stinkender Waldandorn.

Turritis XV, 2. Thurmkraut

glabra — glattes Th.

hirsuta — zottiges Th.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

dissectum — zerschnittener St.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — Farbe G.

Orobus XVII, 3. Erven, Fasankraut

vernus — Frühlings E.

tuberosus — knollige E.

tenuifolius — zartblättrige E.

niger — schwarze E.

in Feldbüschen u. Gesträuchen.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu
montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
radicata — langwurzlichtes F.

Viola XIX, 6. Veilchen
persicifolia — pfirsichblättriges V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut
bifolia — zweyblättriges K.

Carex XXI, 3. Riedgras
brizoides — zittergrasartiges R.

17) An Hecken und Zäunen.

Ligustrum II, 1. Hartriegel, Dintenbeerstrauch
vulgare — gemeiner H.

Galium IV, 1. Labkraut
Molugo — weißes L.

Aparine — Klebkraut.

Cornus IV, 1. Cornelbaum
sanguinea — gemeiner Corn. Hartriegel.

Convolvulus V, 1. Winde
sepium — Zaunwinde.

Lonicera V, 1. Lonicere, Je länger, je lieber
Periclimenum — gemeine L.

Solanum V, 1. Nachtschatten
Dulcamara — Bittersüßs.

Evonymus V, 1. Spillbaum
Europaeus — Pfaffenhüthchen,

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
Bonus Henricus — guter Heinrich.

an Hecken und Zäunen.

Aethusa V, 2. Gleifse

Cynapium — Gartengleifse, kleiner Schierling.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

temulentum — berauschender K. Taumelkerbel.

Berberis VI, 1. Sauerdorn

vulgaris — gemeiner S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

Behen — gemeiner weißer C.

Rosa XII, 5. Rose

cinamomea — Zimmtrose, Zuckerrose

arvensis — Ackerrose

villosa — rauhe Rose, Moosrose

sempervirens — immergrüne R.

canina — Hunds R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

reptans — kriechendes F.

Nepeta XIV, 1. Katzenmünze

cataria — gemeine K.

Glechoma XIV, 1. Gundermann

hederacea — gemeiner G.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

maculatum — gefleckter B.

album — weißer B.

purpureum — rother B.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — stinkender Waldandorn

Thymus XIV, 1. Thymian

serpyllum — Feldkümmel.

an Hecken und Zäunen.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfkraut
vernalis — Frühlings Br.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — malvenblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M: Käsepappel

sylvestris — wilde M.

Vicia XVII, 3. Wicke

cracca — Vogelwicke, Vogelheu

sepium — Zaunwicke.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

cicer — kichernartiges W.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Bryonia XXI, 9. Zaunrübe

alba — weiße Z.

Valantia XXIII, 1. Vaillante

cruciata — kreuzförmige V.

an Hecken und Zäunen.

Parietaria XXIII, 1. Glaskraut
officinalis — gebräuchliches G.

18) An Wegen und Dämmen.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — gemeines, wahres L.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
angustifolia — schmalblättrige O.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige G.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
urbicum — Stadt G.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Klettenkerbel
Anthriscus — gemeines Hecken Dr.
nodosum — knotiges Dr.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Thymus XIV, 1. Thymian
serpillum — Feldkümmel.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
Coronopus — Schweinskresse. Krähenfuß.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
molle — weicher St.
rotundifolium — rundblättriger St.
malvaefolium — malvenblättriger St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Feld Sch.

an Wegen und Dämmen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
foetida — stinkender P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

Leucanthemum — grofse Maßliebe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
panicalata — rispenförmige Fl.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras
compressa — zusammengedrücktes R.

Bromus III, 2. Tresp
tectorum — Dach Tr.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.

Molugo — weifses L.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
Bonus Henricus — guter Heinrich.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Sedum X, 4. fette Henne, Hauslaub
reflexum — zurückgebogenes Sedum.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
reptans — kriechendes F.

Nepeta XIV, 1. Katzenmünze
Cataria — gemeine K.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Cymbalaria — Cymbelkraut.

an und auf Mauern und Dächern.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtskrautblättriger H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lack

Cheiri — gemeine gelbe L.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M. Käsepappel

sylvestris — wilde M.

Ervum XVII, 3. Linse

hirsutum — zottige L.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifsmeinnicht

lappula — Kletten-Mauseohr.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge

officinale — gebräuchliche H.

Verbascum V, 1. Königskerze

lychnitis — lychnisartige K.

nigrum — schwarze K.

blattaria — Schaben- oder Mottenkraut

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut

niger — schwarzes B.

an ganz ungebauten Orten.

Solanum V, 1. Nachtschatten
villosum — gemeiner, raucher N.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

Tordylium V, 2. Drehkraut
anthriscus — Hecken Dr.
nodosum — knotiges Dr.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Aethusa V, 2. Gleifse
Cynapium — Gartengleifse

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
temulentum — brausender K. Taumelkerbel.

Reseda XI, 1. Resede, Wau
luteola — Färber-Wau
lutea — gelber W.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
exigua — kleine W.
Esula — eigentliche W.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
argentea — silberfarbiges F.

Ballotta XIV, 1. Ballote
nigra — schwarze B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Linaria — gemeines Leinkraut, Frauenflachs.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.
molle — weicher St.
dissectum — zerschnittener St.
rotundifolium — rundblättriger St.

an ganz ungebauten Orten.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
murorum — Dach H.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
dioicum — getrenntes R.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Syringa II, 1. Flieder, Lilac
vulgaris — türkischer Hollunder
persica — persischer H.
laciniata — petersilienblättriger H.

Monarda II, 1. Monarde
didyma — vierfädige M.
fistulosa — röhrichte M.

Salvia II, 1. Salbey
officinalis — gebräuchliche S.

Iris III, 1. Schwerdlilie
germanica — deutsche S.
squalens — schmuzfarbige S.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
alpina — Alpen Sc.

Heliotropium V, 1. Scorpionkraut
Europaeum — Europäisches S.

Borago V, 1. Boretsch
officinalis — gebräuchlicher B.

Convolvulus V, 1. Winde
tricolor — dreyfarbige W.

Trachelium V, 1. Halskraut
caeruleum — blaues H.

in gewöhnlichen Gärten.

Lonicera V, 1. **Lonicere**

caprifolium — Je länger, je lieber
sempervirens — immergrünende L.
Diervilla — Acadische L.

Nicotiana V, 1. **Tabak**

Tabaccum — gemeiner T.
rustica — türkischer, Bauern T.
paniculata — Jungfern T.

Atropa V, 1. **Tollkraut**

physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. **Schlutten, Judenkirschen**

Alkekengi — gemeine J.
pubescens — haarige J.

Ammi V, 2. **Ammey**

majus — großblättriger A.

Ligusticum V, 2. **Liebstockel**

Levisticum — gewöhnlicher L.

Aethusa V, 2. **Gleifse**

Cynapium — Garten Gl. kleiner Schierling.

Anethum V, 2. **Dille**

graveolens — gemeine D.
foeniculum — Fenchel.

Pimpinella V, 2. **Bibernell**

Anisum — Anis.

Apium V, 2. **Eppich**

Petroselinum — gemeine Petersilie.

Viburnum V, 3. **Lorbeertinus**

Tinus — immergrünender L.

in gewöhnlichen Gärten.

Sambucus V, 3. Hollunder

laciniata — petersilienblättriger H.

racemosa — rother Trauben H.

Allium VI, 1. Lauch

sativum — gemein. grasblättriger Knoblauch

scorodoprasum — Rockamboll, Feldknoblauch

schoenoprasum — Schnittlauch.

Lilium VI, 1. Lilie

pomponicum — pomponische L.

Asparagus VI, 1. Spargel

officinalis — gemeiner S.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

flava — gelbe Tagblume.

Tropaeolum VIII, 1. Capuzinerkresse

minus — kleine C.

majus — grofse C.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze

biennis — zweyjährige N.

Ruta X, 1. Raute

graveolens — gemeine Garten R.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

Cotyledon — nabelkrautartiger St.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke

barbatus — Bartnelke, schöner Hanns

Carthusianorum — Cartheusernelke.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

reflexum — zurückgebogenes H.

Oxalis X, 4. Sauerklee

corniculata — gehörnter S.

in gewöhnlichen Gärten.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
chalcedonica — brennende Liebe.

Reseda XI, 3. Resede, Wau
oderata — wohlriechende R.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Lathyris — Springkraut
helioscopia — sonnenwendige W.

Philadelphus XII, 1. Pfeifenstrauch
coronarius — wohlriechender Bastard-Jasmin
inodorus — geruchloser.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
salicifolia — weidenblättrige Sp.

Rosa XII, 5. Rose
Eglanteria — Weinrose, wohlriechende R.
rubiginosa — rostfarbige R.
villosa — rauhe R. Moosrose
centifolia — hundertblättrige R.
gallica — französische R.
alba — weisse R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

Papaver XIII, 1. Mohn
somniferum — Garten M. schlafmachender M.

Paeonia XIII, 2. Päonie, Pfingstrose
officinalis — gebräuchliche P.

Delphinium XIII, 2. Rittersporn
Ajacis — Garten R.

Aconitum XIII, 3. Eisenhut, Sturmhut
Napellus — blauer E.
Cammарum — giftiger E.

in gewöhnlichen Gärten.

Aconitum XIII, 3. Eisenhut, Sturmhut
uncinatum — hackenförmiger E.

variegatum — gefleckter E.

Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Aquilegia XIII, 5. Akeley
vulgaris — gemeine Ak.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel
damascena — damascenische N. Gretchen im
Busche

sativa — zahme N.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
platanifolius — ahornblättriger H.

repens — kriechender H.

chaerophyllus — kerbelblättriger H.

Lavendula XIV, 1. Lavendel
Stoechas — Stöchaskraut.

Thymus XIV, 1. Thymian
vulgaris — gemeiner T. Feldkümmel.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
majus — großes L. Kalbsnase.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
purpurea — purpurfarbiger F.
lutea — gelber F.

ambigua — ockergelber F.

Lepidium XV, 1. Kresse
sativum — gemeine Garten Kr.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
officinalis — gemeines L.

Armoracia — Meerrettig.

in gewöhnlichen Gärten.

Cheiranthus XV, 2. Levcoje, Lack

Cheiri — gemeiner gelber L.

incanus — bestäubter L.

fenestralis — Fenster L.

annuus — Sommer L.

tricuspidatus — dreyzackiger L.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

tristis — traurige N.

matronalis — Frauen N.

Brassica XV, 2. Kohl

orientalis — morgenländischer K.

oleracea viridis — gemeiner weißer Kopf K.

capitata

rubra — rother oder blauer Kopf K.

sabauda — Savoyer K.

sabellica — grüner Wirsing K.

selenisia — Plümage K. Kraus K.

botrytis — Blumen K.

Napobrassica — Kohlrüben

gonyglodes — Kohlrabi

Eruca — zahme Rauke

Sinapis XV, 2. Senf

alba — weißer S.

nigra — schwarzer S.

Raphanus XV, 2. Rettig

sativus — zahmer R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

moschatum — nach Bisam riechender St.

chium — griechischer St.

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

in gewöhnlichen Gärten.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
striatum — gestreifter St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosen P. gemeine Garten P.
ficifolia — feigenblätterige P.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
sempervirens — immergrüner E.
lutea — gelber E.
capnoides — weißer E.
officinalis — gebräuchlicher E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
juncum — binsenartiges Pf.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne
perennis — ausdauernde F.
albus — weiße F.
varius — bunte F.
hirsutus — zottige F.
pilosus — haarige F.
luteus — gelbe F.

Phaseolus XVII, 3. Bohne
vulgaris — gemeine B. Feuer B.
coccineus — Scharlach B. Fleisch B.
nanus — Zwerg B. Franz B.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
odoratus — wohlriechende Pl. Spanische
Wicke

latifolius — breitblätterige Pl. Pouquetwicke.

Vicia XVII, 3. Wicke

lutea — gelbe W.

hybrida — Bastard W.

faba — Buffbohne, große Gartenbohne.

in gewöhnlichen Gärten.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

Onobrychis — Esparcette.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

Onobrychis — hahnenkammartiges W.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

siliquosus — Wiesen S.

ornithopodioides — vogelfußartiger S.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

tingitana — tunitanische S.

picroides — bitterkrautartige S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

villosum — zottiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

benedicta — Cardobenedicten, Bitterdistel.

Cucurbita XXI, 9. Kürbiss

lagenaria — Flaschen K. Herkuleskeule

ovifera — eiförmiger K.

Pepo — gemeiner K.

verrucosa — warzichter K.

in gewöhnlichen Gärten.

Cucurbita XXI, 9. Kürbiss

Melopepo — Melonen K.

Citrullus — Wasser-Melone.

Cucumis XXI, 9. Gurke

Melo — Melone.

sativus — gemeine Gurke

flexuosus — boglichte G.

Spinacia XXII, 4. Spinat

oleracea — kohlartiger Sp.

22) In botanischen Gärten.

Salvia II, 1. Salbey

haematodes — blutige S.

glutinosa — klebrige S.

sclarea — Muskateller Kraut

coccinea — scharlachrothe S.

Valeriana III, 1. Baldrian

Phu — großer B.

Iris III, 1. Schwerdlilie

squalens — schmutzfarbige S.

Briza III, 2. Zittergras

Eragrostis — schönstes Z.

Spermace IV, 1. Zahnwirl

tenuior — dünner Z.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

alpina — Alpen S.

Rubia IV, 1. Grapp

tinctorum — Färberröthe.

Cornus IV, 1. Cornelbaum

alba — weisbeeriger C.

Amomum — blaubeeriger C.

in botanischen Gärten:

Ptelea IV, 1. Lederblume

trifoliata — dreyblättrige L.

pentaphylla — fünfblättrige L.

Eleagnus IV, 1. Oleaster

angustifolius — schmalblättriger O.

Hypecoum IV, 2. Lappeublume

procumbens — darniederliegende L.

pendulum — hangende L.

erectum — aufrechte L.

Ilex IV, 3. Stechpalme, Stecheiche

aquifolium — gemeine St.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

sempervirens — immergrüne O.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge

virginicum — virginische H.

lusitanicum — portugiesische H.

linifolium — leinblättrige H.

cheirifolium — levcojenblättrige H.

Cerinth V, 1. Wachsblume

major — größere W.

minor — kleinere W.

Lycopsis V, 1. Krummhals

vesicaria — blasiger Kr.

pulla — brauner Kr.

variegata — bunter Kr.

Androsace V, 1. Androsace, Mannsschild

maxima — größte A.

Cortusa V, 1. Cortuse

Matthioli — Matthiols C.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

quadrifolia — vierblättrige L.

punctata — gedüpfelte L.

in botanischen Gärten.

Plumbago V, 1. Bleywurz

Europaea — Europäische Bl.

Phlox V, 1. Flammenblume

pilosa — haarige Fl.

Carolina — Carolinische Fl.

glaberrima — sehr glatte Fl.

divaricata — auseinandergesperrte Fl.

Convolvulus V, 1. Winde

Scammonia — Scammonien, Purgir W.

purpureus — purpurrothe W.

tricolor — dreyfarbige W.

cantabrica — cantabrische W.

Polemonium V, 1. Sperrkraut

caeruleum — griechischer Baldrian

reptans — kriechendes Sp.

Campanula V, 1. Glocken

pulla — dunkelfarbige Gl.

latifolia — breitblättrige Gl.

Bononiensis — bononische Gl.

thyrsoides — straußige Gl.

petraea — Felsen Gl.

medium — Marien - Veilchen

hybrida — unächter Frauenspiegel.

Trachelium V, 1. Halskraut

caeruleum — blaues H.

Triosteum V, 1. Fieberwurz

perfoliatum — amerikanische F.

angustifolium — schmalblättrige F.

Verbascum V, 1. Königskerze

phoeniceum — rothe K.

Myconi — Myconische K.

in botanischen Gärten.

Datura V, 1. Stechapfel

tatula — bläulicher St.

fastuosa — rother St.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut

albus — weisses B.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche

Alkekengi — gemeine J.

pubescens — haarige J.

Rhamnus V, 1. Wegdorn

Paliurus — Christdorn, Judendorn

Capsicum V, 1. Spanischer Pfeffer

annuum — jähriger Sp. Pf.

Celastrus V, 1. Celaster

scandens — kletternder C.

Nerium V, 1. Lorbeerrose, Rosenlorbeer

Oleander — gemeine L. Oleander

Periploca V, 2. Schlingen

graeca — griechische Schl.

Heuchera V, 2. Heuchere

americana — amerikanische H.

Eryngium V, 2. Mannstreu

planum — flache M.

amethystinum — amethystfarbige M.

Tordylium V, 2. Drehkraut

maximum — größtes Dr.

Ammi V, 2. Ammey

majus — großblättriger A.

Crithmum V, 2. Bacillenkraut

maritimum — Meerfenchel.

in botanischen Gärten.

Ferula V, 2. Steckenkraut, Gartenkraut
communis — gemeines St.

Asa foetida — Teufelsdreck, stinkend. Asant.

Angelica V, 2. Angelik, Engelwurz
verticillaris — wirtelförmige E.

Oenanthe V, 2. Rebendolde
pimpinelloides — bibernellartige R.

Coriandrum V, 2. Coriander
sativum — gemeiner C.

Scandix V, 2. Kerbel
odorata — wohlriechender K.

nodosa — knotiger K.

procumbens — darniederliegender K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
aureum — goldgelber K.

aromaticum — gewürzhafter K.

Imperatoria V, 2. Meisterwurz, Kaiserwurz
Ostruthium — gemeine M.

Thapsia V, 2. Thapsie, Flügelsaame
villosa — rauche Th.

foetida — stinkende Th.

Smyrniurn V, 2. Smirnenkraut, Brustwurz
perfoliatum — durchstochenes Sm.

Olus atrum — gemeines Sm.

aureum — goldgelbes Sm.

Viburnum V, 3. Schlingbaum

prunifolium — pflaumenblätteriger Schl.

dentatum — sägeblätteriger Schl.

acerifolium — ahornblätteriger Schl.

lentago — Canadischer Schl.

in botanischen Gärten.

Staphylea V, 3. Pimpernuss

pinnata — gemeine P.

trifolia — virginische P.

Telephium V, 3. Telephie

Imperati — europäische T.

Aralia V, 5. Aralie, Beerangelik

racemosa — traubentragende A.

Scilla VI, 1. Sternhyazinth

Lilio-hyacinthus — Lilienhyazinth

italica — italienischer aschgrauer St.

Asphodelus VI, 1. Affodille

luteus — gelbe A.

fistulosus — röhrige A.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut

serotinum — spätblühendes Sp.

Liliastrum — lilienartiges Sp.

Convallaria VI, 1. Mayblume

racemosa — traubentragende M.

stellata — sternförmige M.

trifolia — dreyblättrige M.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

flava — gelbe A.

Frankenia VI, 1. Frankenie

laevis — glatte Fr.

hirsuta — zottige Fr.

Rumex VI, 1. Ampfer.

vesicarius — blasenartiger A.

scutatus — schildförmiger A.

Saururus VII, 3. Eydexenschwanz

cernuus — unter sich hängender E.

in botanischen Gärten.

Erica VIII, 1. Heide

triflora — dreyblumige H.

cinerea — aschgraue H.

australis — südliche H.

ciliaris — gefranzte H.

herbacea — krautartig grünliche H.

multiflora — vielblumige H.

mediterranea — mittelländische H.

Daphne VIII, 1. Daphne, Kellersalz

Laureola — Lorbeer D.

Thymelaea — gelbblühende D.

alpina — Alpen D.

Cneorum — schweizerische D.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

viviparum — keimender W.

virginicum — virginischer W.

orientale — morgenländischer W.

divaricatum — auseinandergesperrter W.

tartaricum — sibirischer Buchweizen

Rheum IX, 2. Rhabarber

Rhaponticum — Rhapontik

Rhabarbarum — krausblättrige Rh.

compactum — dichte Rh.

palmatum — handförmige Rh.

Ribes — persische Rh.

Sophora X, 1. Sophora, Schnurstrauch

alopecuroides — fuchsschwanzartige S.

tinctoria — färbende S.

alba — weisse S.

lupinoides — feigbohnenartige S.

in botanischen Gärten.

Circis X, 1. Judasbaum, Griffelbaum

siliquastrum — gemeiner Europäischer J.

Ruta X, 1. Raute

chalepensis — aleppische R.

patavina — patuanische dreyblättrige R.

Dictamnus X, 1. Diptam

albus — weißer D.

Tribulus X, 1. Burzeldorn

terrestris — Erdburzeldorn.

Rhododendron X, 1. Alprose, Schneerose

ferrugineum — rostfarbige A.

hirsutum — zottige A.

Chamaecistus — niedrige A.

ponticum — pontische A.

maximum — größte A.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut

lusitanica — portugiesische S.

quinquevulnera — bunte S.

conica — kegelförmige S.

noctiflora — nächtliche S.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne

Aizoon — immergrünes S.

Cepaea — burzelkrautartiges S.

Cerastium X, 4. Hornkraut

repens — kriechendes H.

Forskæhlea X, 4. Forskählie

tenacissima — zähe F.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Lathyris — Springkraut.

in botanischen Gärten.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
arachnoideum — spinnenwebenartiges H.
montanum — Berg H.

sediforme — sedumartiges H.

Punica XII, 1. Granatenbaum

Granatum — gemeiner Gr.

nana — Zwerggranaten.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

chamedrifolia — gamanderblättrige Sp.

ulmifolia — ulmenblättrige Sp.

opulifolia — wasserholderblättrige Sp.

laevigata — geglättete Sp.

palmata — handförmige Sp.

trifoliata — dreyblättrige Sp.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

occidentalis — virginische Br.

hispidus — borstige Br.

jamaicensis — jamaische Br.

canadensis — canadische Br.

odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut, Potentille

fruticosa — strauchartiges F.

sericea — seidenartiges F.

multifida — vielspaltiges F.

fragarioides — erdbeerartiges F.

bifurca — zweyzinkiges F.

recta — gerade aufrechtes F.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut

virginianum — virginianisches B.

montanum — Berg B.

in botanischen Gärten.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
reptans — kriechendes B.

Actaea XIII, 1. Christophskraut
racemosa — traubenförmiges Ch.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
Glaucium — eisengraues S.
corniculatum — rothblühendes gehörntes S.
hybridum — unächtes S.

Papaver XIII, 1. Mohn
hybridum — unächter M.
Argemone — keulenförmiger M.
orientale — morgenländischer M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
ladaniferus — Ladanum schwitzende C.
incanus — bestäubte C.
creticus — cretische C.
albidus — weißliche C.
crispus — krause C.
italicus — italienische C.

Paeonia XIII, 2. Pfingstrose
anomala — irreguläre Pf.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn
ambiguum — zweifelhafter R.
grandiflorum — großblumiger R.
elatum — hoher R.

Staphisagria — Stephanskraut.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut
Lycoctonum — gelber St.
pyrenaicum — pyrenäischer St.

in botanischen Gärten.

Aquilegia XIII, 5. Akeley

canadensis — canadische A.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel

damascena — damascenische N.

orientalis — morgenländische N.

Magnolia XIII, 6. Magnolie, Tulpenbaum

grandiflora — großblumige M.

glauca — eisengraue M.

acuminata — spitzblättrige M.

tripetata — Sonnenschirmbaum.

Annona XIII, 6. Annonenbaum

glabra — glatter A.

triloba — dreylappichter A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume

coronaria — Kronen A.

hortensis — Garten A.

palmata — handförmige A.

virginiana — virginische A.

dichotoma — zweygetheilte A.

trifolia — dreyblättrige A.

quinquefolia — fünfblättrige A.

narcissiflora — narcissenartige A.

thalictroides — thalictrumartige A.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

viticella — blaue W.

crispa — krause W.

orientalis — morgenländische W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

cornuti — canadische W.

minus — kleine W.

in botanischen Gärten.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

sibiricum — sibirische W.

purpurascens — röthliche W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

creticus — cretischer H.

illyricus — illyrischer H.

monspeliacus — languedokischer H.

orientalis — morgenländischer H.

grandiflorus — großblumiger H.

Isopyrum XIII, 6. Doldocke

fumarioides — erdrauchartige D.

Teucrium XIV, 1. Gamander

chamaedrys — edler G.

flavum — gelber G.

Satureja XIV, 1. Saturey

Thymbra — cretische S.

capitata — Kopf S.

Nepeta XIV, 1. Katzenmünze

pannonica — ungarische K.

violacea — violette K.

italica — italienische K.

Lavandula XIV, 1. Lavendel

Stoechas — Stöchaskraut.

Sideridis XIV, 1. Gliedkraut

scordioides — gezahntes staudiges Gl.

elegans — zierliches Gl.

Betonica XIV, 1. Betonie

orientalis — morgenländische B.

Origanum XIV, 1. Dosten

Dictamnus — cretischer Diptam.

in botanischen Gärten.

Thymus XIV, 1. Thymian

alpinus — Alpen Th.

mastichina — Mastixkraut

lanuginosus — wollichter Th.

Melissa XIV, 1. Melisse

grandiflora — großblumige M.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf

austriacum — österreichischer Dr.

sibiricum — sibirischer Dr.

thymiflorum — thymianartiger Dr.

Melittis XIV, 1. Waldmelisse

melissophyllum — Melissenblatt.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

purpureum — purpurfarbiges L.

linifolium — leinblättriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz

orientalis — morgenländische Br.

frutescens — staudige Br.

sambuccifolia — hollunderblättrige Br.

canina — Hunds Br.

lucida — glänzende Br.

peregrina — fremde Br.

Celsia XIV, 2. Celsie

orientalis — morgenländische C.

arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

lutea — gelber F.

ambigua — ockergelber F.

ferruginea — eisenrostfarbiger F.

in botanischen Gärten.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

obscura — dunkelfarbiger F.

thapsi — wollkrautartiger F.

Bignonia XIV, 2. Trompetenbaum

unguis cati — gelblicher Tr.

aequinotialis — cayennischer Tr.

Vella XV, 1. Vella, Löffelschote

annua — jährige V.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

hirtum — steifhaariges T.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

danica — dänisches L.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

sinuatum — ausgehöhltes St.

Lunaria XV, 1. Mondkraut

annua — jähriges M.

Erysimum XV, 2. Hederich

repandum — geschweiffter H.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

tristis — traurige N.

africana — afrikanische N.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

bellidifolia — maßliebenblätteriges G.

canadensis — canadisches G.

pendula — hängendes sibirisches G.

turrita — krummschotiges G.

Brassica XV, 2. Kohl

Eruca — zahme Rauke.

Sinapis XV, 2. Senf

orientalis — morgenländischer S.

in botanischen Gärten.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

altissimum — höchste R.

strictissimum — senkrechte R.

Bunias XV, 2. Stachelsenf, Zackenschote

Erucago — raukenartige Z.

aegyptiaca — ägyptische Z.

orientalis — morgenländische Z.

balearica — balearische Z.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

moschatum — nach Bisam riechender St.

chium — griechischer St.

malacoides — pappelartiger St.

gruinum — Kranichschnabel

Ciconium — eigentlicher St.

macrorhizum — großwurzlicher St.

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

nodosum — knotiger St.

striatum — gestreifter St.

bohemicum — böhmischer St.

carolinianum — carolinischer St.

prostratum — gestreckter St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosenpappel

ficifolia — feigenblätterige P.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

arborea — baumartige L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

sempervirens — immergrüner E.

lutea — gelber E.

capnoides — weißer E.

in botanischen Gärten.

Genista XVII, 3. Ginster

canariensis — canarischer G.

candicans — weiflicher G.

sagittalis — pfeilförmiger G.

tridentata — dreyzähliger G.

sibirica — sibirischer G.

florida — blühender G.

anglica — englischer G.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote

alba — weifsblumige Kl.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume

tetraphylla — vierblättrige W.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne

perennis — ausdauernde F.

albus — weisse F.

varius — bunte F.

hirsutus — zottige F.

Orobis XVII, 3. Erven, Fasankraut

lathyroides — platterbsenartige E.

luteus — gelbe E.

pyrenaicus — pyrenäische E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse

cicer — rothe Pl.

inconspicuus — kleinblumige Pl.

amphicarpos — unterirdische Pl.

angulatus — eckige Pl.

articulatus — gegliederte Pl.

tingitanus — mauritanische Pl.

clymenum — morgenländische Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke

onobrychoides — esparcettenartige W.

in botanischen Gärten.

Vicia XVII, 3. Wicke

nissoliana — nissolische W.

benghalensis — benghalische W.

lutea — gelbe W.

hybrida — Bastard W.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen G.

nigricans — schwärzlicher G.

sessilifolius — ungestielter G.

hirsutus — zottiger G.

argenteus — silberfarbiger G.

Robinia XVII, 3. Robinie

Caragana — sibirischer Erbsenbaum

frutescens — strauchartige E.

pygmaea — Zwerg-Robinie

hispida — borstige R.

echinata — stachlichte R.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum

arborescens — baumartiger Bl.

orientalis — morgenländischer Bl.

humilis — niedriger Bl.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

Emerus — Scorpions Kr.

juncea — binsenartige Kr.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

canadense — canadischer H.

junceum — binsenartiger H.

violaceum — violetter H.

paniculatum — rispenförmiger H.

in botanischen Gärten.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

alpinum — Alpen H.

coronarium — Kronen H.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.

galegiformis — geißrautenartiges W.

onobrychis — hahnenkammartiges W.

sulcatus — gefurchtes W.

uliginosus — Sumpf W.

hamosus — hackichtes W.

contortuplicatus — einwärtsgekrümmtes W.

baeticus — spanisches W.

sesameus — italienisches W.

pentaglottis — stachlichtes W.

epiglottis — luftröhrendeckelartiges W.

trimestris — ägyptisches W.

Tragacantha — wahrer Tragant.

Trifolium XVII, 3. Klee

stellatum — Sternklee.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

tetragonolobus — viereckiger S. Spargelerbse

conjugatus — gepaarter S.

edulis — essbarer S.

peregrinus — fremder S.

angustissimus — schmaler S.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

tingitana — tunitanische S.

picroides — bitterkrautartige S.

in botanischen Gärten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P. Christauge

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

aspera — rauher P.

rhagadioloides — rauchköpfiger P.

sibirica — sibirischer P.

Athanasia XIX, 1. Goldhaar, Athanasie

maritima — Seestrand A.

crithmifolia — meerfenchelblättrige A.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkrant

margaritaceum — perlartiges R.

plantaginifolium — wegerichblättriges R.

purpureum — purpurrothes R.

Inula XIX, 2. Alant

bifrons — geflügelter A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-

cherblume

graminifolium — grasblättrige W.

monspeliense — montpellierische W.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garbe

santolina — heiliges A.

tomentosa — filziges A.

atrata — schwärzliches A.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

cineraria — aschenfarbige Fl.

sempervirens — immergrüne Fl.

splendens — glänzende Fl.

Rhapontica — unächte Rhabarber

glastifolia — waidblättrige Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Isnardi — Isnards Fl.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

flava — gelbes Kn.

hyperborea — isländisches Kn.

abortiva — Bastard Kn.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

andropophora — menschenähnliche R.

Cypripedium XX, 1. Frauenschuh

bulbosum — knolliges Fr.

Aristolochia XX, 2. Osterluzey

arborescens — baumartige O.

sempervirens — immergrüne O.

serpentaria — Schlangenwurzel

longa — lange O.

rotunda — runde O.

Clematidis — gemeine O.

Arum XX, 3. Aron

Dracunculus — Schlangenkraut

Dracontium — Drachenwurz

triphyllum — dreyblättrige A.

Veratrum XXIII, 1. Niesswurz

album — weisse N.

nigrum — schwarze N.

americanum — amerikanische N.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

hederifolia — ephenblättriger E.

allenthalben.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras
odoratum — wahres R.

Valeriana III, 1. Baldrian
officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras
viride — grünes H.

Alopecurus III, 2. Fuchsschwanz
pratensis — Wiesen F.

Poa III, 2. Rispengras
annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundsgras
glomerata — rauhes Kn.

Bromus III, 2. Tresp
mollis — weicher Tr.
inermis — Quecken Tr.
sterilis — tauber Tr.
tectorum — Dach Tr.

Lolium III, 2. Lolch
perenne — ausdauernder L.

Hordeum III, 2. Gerste
murinum — Mäuse G.

Triticum III, 3. Weizen
repens — gemeine Quecken.

Plantago IV, 1. Wegerich
major — großer W.
media — mittlerer W.
lanceolata — spitziger W. Hundscribbe.

Sagina IV, 3. Mastkraut, Vierling
procumbens — darniederliegendes M.

allenthalben.

Lithospermum V, 1. Steinhirse

officinale — gebräuchlicher St.

arvense — Acker St.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf

vulgare — gemeiner O.

Campanula V, 1. Glocken

rotundifolia — rundblättrige Gl.

patula — weitblumige Gl.

rapunculus — Rapunzel.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum — schwarzer N.

Bunium V, 2. Erdnuss, Erdknoten

Bulbocastanum — gemeine E.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

sylvestre — wilder K.

Pimpinella V, 2. Bibernell

saxifraga — kleine B.

magna — große B.

Aegopodium V, 2. Giersch, Geißfuß

Podagraria — gemeiner G.

Sambucus V, 3. Hollunder

nigra — schwarzer H.

Alsine V, 3. Vogelmeyer

media — gemeiner V.

Juncus VI, 1. Binsen

campestris — Feldbinsen.

Rumex VI, 3. Ampfer

acetosella — Schafampfer.

Oenothera VIII, 3. Nachtkerze, Weinblume

biennis — zweyjährige N. Rhapentica.

allenthalben.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
 persicaria — Kottig, Flöhkraut
 aviculare — gemeiner W. Vogel W.

Arenaria X, 3. Sandkraut
 serpyllifolia — quendelblätteriges S.

Cerastium X, 4. Hornkraut
 vulgatum — gemeines H.
 viscosum — klebriges H.
 arvense — Acker H.

Spergula X, 4. Spark
 arvensis — Acker Sp.

Sorbus XII, 3. Spierling
 aucuparia — gemeine Ebischbeere.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
 Idaeus — gemeine H.
 caesius — blaue Kratzbeere
 fruticosus — gemeiner Brommbeerenstrauch.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
 anserina — Gänserich.

Tormentilla XII, 5. Tormentille, Blutwurz
 erecta — aufrechte T.

Geum XII, 5. Benediktenkraut
 urbanum — gemeines B. Heil aller Welt.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
 majus — gemeines S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
 ficaria — Feigwarzenkraut.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
 Bursa Pastoris — Hirtentäschel.

allenthalben.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

incanum — bestäubtes St.

calycinum — deutsches St.

Erysimum XV, 2. Hederich

Barbarea — Barbenkraut

Alliaria — Knoblauchsraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium XVII, 2. Klee

repens — kriechender Kl.

pratense — Wiesen K. gemeiner spanischer K.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn

Taraxacum — gebräuchlicher L.

Apargia XIX 1. Apargie

hispida — borstige A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart

Intybus — gemeine W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maßliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garbe

Ptarmica — deutscher Bertram

Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Urtica XXI, 4. Nessel

urens — kleine Brennessel, Eiternessel

dioica — gemeine große Brennessel.

Carex XXI, 3. Riedgras

hirta — borstiges R.

allenthalben.

Holcus XXIII, 1. Honiggras
lanatus — wollichtes H.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cornus IV, 1. Cornelbaum
alba — weifsbeeriger C.

Amomum — blaubeeriger C.

Ptelea IV, 1. Lederblume
trifoliata — dreyblättrige L.

Elaeagnus IV, 1. Oleaster, Ölbaum
angustifolius — schmalblättriger O. wilder
Ölbaum

Ilex IV, 3. Stechpalme, Stecheiche
aquifolium — gemeine St.

Lycium V, 1. Bocksdorn
Barbarum — chinesischer B.

Europaeum — europäischer B.

Afrum — afrikanischer B.

Celastrus V, 1. Celaster
scandens — kletternder C.

Evonymus V, 1. Spillbaum
latifolius — breitblättriger Sp.

verrucosus — warzichter Sp.

Americanus — amerikanischer Sp.

Viburnum V, 3. Schlingbaum

Lantana — gemeiner Schl.

Rhus V, 3. Sumach, Färberbaum

Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum

radicans — wurzelnder Sumach

typhina — Hirschkolben S.

in Lustwäldern und Alleen.

Staphilea V, 3. Pimpernuß

pinnata — gemeine P.

trifolia — dreyblättrige P.

Berberis VI, 1. Sauerdorn

vulgaris — gemeiner S.

Aesculus VII, 1. Roskastanie

Hippocastanum — gemeine R.

Pavia — carolinische R.

Prunus XII, 1. Pflaumen

virginiana — virginischer Vogelkirschenbaum

canadensis — canadischer V.

lusitanica -- portugiesisch. Lorbeerkirschbaum

Lauro-Cerasus — Kirschlorbeerbaum.

Sorbus XII, 3. Speierling

aucuparia — wilder S. Ebischbeerbaum

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

odoratus — wohlriechende B.

Tilia XIII, 1. Linde

grandifolia — großblättrige Sommer L.

parvifolia — kleinblättrige Winter L.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen G.

nigricans — schwärzlicher G.

sessilifolius — ungestielter G.

hirsutus — zottiger G.

argenteus — silberfarbiger G.

Robinia XVII, 3. Robinie

Pseudo-Acacia — unächte R.

frutescens — strauchartige R.

in Lustwäldern und Alleen.

Robinia XVII, 3. Robinie

pygmaea — Zwerg R.

hispida — borstige R.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum

arborescens — baumartiger Bl.

orientalis — morgenländischer Bl.

humilis — niedriger Bl.

Acer XXIII, 1. Ahorn

montanum — Berg A.

25) Auf Alpen und andern hohen
Gebirgen.

Paederota II, 1. Bonarotte

Ageria — blaue B.

Valeriana III, 1. Baldrian

Plu — großer B. Theriakwurzel

Scabiosa IV, 1. Scabiose

alpina — Alpen Sc.

Galium IV, 1. Labkraut

montanum — Berg L.

saxatile — Stein L.

Plantago IV, 1. Wegerich

alpina — Alpen W.

Onosma V, 1. Schminke

Echioides — otterkopftige S.

Diapensia V, 1. Diapensie

Lapponica — Lappländische D.

Aretia V, 1. Aretie

Helvetica — Schweizerische A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Androsace V, 1. Androsace
 villosa — haarige A.
 lactea — milchweisse A.

Cortusa V, 1. Cortuse
 Matthioli — Matthiols C.

Soldanella V, 1. Drattelblume
 alpina — Alpen Dr.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
 punctata — gedüpfelte L.

Campanula V, 1. Glocken
 Bononiensis — Bononische G.
 thyrsoides — strausige G.
 barbata — bärtige G.
 spicata — ährentragende G.
 alpina — Alpen G.

Phyteuma V, 1. Rapunzel
 haemisphaerica — halbkugelrunde R.

Verbascum V, 1. Königskerze
 phlomoides — phlomisartige K.
 Myconi — Myconische K.

Evonymus V, 1. Spillbaum
 verrucosus — warzichter Sp.

Thesium V, 1. Leinkraut
 alpinum — Alpen L.

Gentiana V, 2. Enzian
 utriculosa — bäuchiger E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
 amethystinum — amethystfarbige M.
 alpinum — Alpen M.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Horacleum V, 2. Heilkraut, Bärenklaub

Panaces — großes H.

Aethusa V, 2. Gleisse

Meum — Bärwurz, Herzwurzel.

Scandix V, 2. Kerbel

odorata — wohlriechender K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

hirsutum — zottiger K.

Imperatoria V, 2. Meisterwurz, Kaiserwurz

Ostruthium — gemeine M.

Rhus V, 2. Sumach, Färberbaum

Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum.

Staphylea V, 3. Pimpernuß

pinnata — gemeine P.

Lilium VI, 1. Lilie

pomponicum — pomponische L.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut

serotinum — spätblühendes Sp.

Liliago — astloses Sp.

Liliastrum — lilienartiges Sp.

caliculatum — kelchblumiges Sp.

Hyacinthus VI, 1. Hyazinthe

comosus — zopfige H.

Juncus VI, 1. Binsen

Jacquini — Jacquins B.

biglumis — zweybälige B.

triglumis — dreybälige B.

Polygonum VIII, 2. Wegtritt

divaricatum — auseinandergesperrter W.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Rhododendron X, 1. Alprose, Schneerose
ferrugineum — rostfarbige A.

hirsutum — zottige A.

Chamaecistus — niedrige A.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

Cotyledon — nabelkrautartiger St.

mutata — veränderter St.

androsacea — zweyblumiger St.

caesia — blaulicher St.

sedoides — mauerpfefferartiger St.

bryoides — moosartiger St.

stellaris — sternförmiger St.

hirsuta — zottiger St.

Geum — nierenförmiger St.

cuneifolia — keilförmiger St.

oppositifolia — heidenförmiger St.

aspera — rauher St.

aizoides — immergrüner St.

rotundifolia — rundblättriger St.

petraea — Felsen St.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

Pumilo — Zwerg C.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut

rupestris — Felsen S.

acaulis — Zwerg S.

Arenaria X, 3. Sandkraut

tetraquetra — vierseitiges S.

laricifolia — lerchenbaumblättriges S.

striata — gestreiftes S.

- auf Alpen und hohen Gebirgen.
- Sedum** X, 4. Sedum, fette Henne
 rupestre — Felsen-Sedum
 atratum — geschwärztes S.
- Euphorbia** XI, 3. Wolfsmilch
 pilosa — haarige W.
 hiberna — Irländische W.
- Sempervivum** XI, 5. Hauswurz
 arachnoideum — spinnenwebenartige H.
- Mespilus** XII, 4. Mispel
 Chamae Mespilus — Zwerg M.
 Cotoneaster — Quitten M.
- Rosa** XII, 5. Rose
 alpina — Alpenrose.
- Potentilla** XII, 5. Fünffingerkraut, Potentille
 caulescens — vielblumiges F.
- Geum** XII, 5. Geum, Benediktenkraut
 montanum — Berg B.
 reptans — kriechendes B.
- Chelidonium** XIII, 1. Schöllkraut
 Glaucium — eisengraues S.
- Cistus** XIII, 1. Cisten
 fumana — heidenartige C.
 canus — graue C.
 oelandicus — öländische C.
 serpyllifolius — quendelartige C.
 apenninus — apenninische C.
- Delphinium** XIII, 3. Rittersporn
 elatum — holier R.
- Aconitum** XIII, 3. Eisenhut, Sturmhut
 pyrenaicum — pyrenäischer E.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Aconitum XIII, 3. Eisenhut, Sturmhut

Cammarum — giftiger E.

variegatum — gefleckter E.

Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Anemone XIII, 6. Windblume, Anemone

sylvestris — Hainanemone

narcissifolia — narcissenartige An.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

integrifolia — ganzblättrige W.

Thalictrum XIII, 6. Thalictrum, Wiesenraute

foetidum — stinkende W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

aconitifolius — eisenhutartiger H.

monspeliacus — languedokischer H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

chamaedrys — edler G.

lucidum — glänzender G.

montanum — Berg G.

Polium — Bergpoley.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

scordioides — gezahntes staudiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug

Orvala — Orvelkraut.

Marrubium XIV, 1. Andorn

peregrinum — fremder A.

Thymus XIV, 1. Thymian

vulgaris — gemeiner Th. römischer Quendel

alpinus — Alpen Th.

Melissa XIV, 1. Melisse

grandiflora — großblumige M.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Bartsia XIV, 2. Bartsche

alpina — Alpen B.

Tozzia XIV, 2. Tozzie

alpina — Alpen T.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

rostrata — schnabelförmiges L.

Myagrum XV, 1. Leindotter

saxatile — Alpen L.

Draba XV, 1. Hungerblümchen

hirta — rauchhaariges H.

alpina — Alpen H.

Lepidium XV, 1. Kresse

alpinum — Alpen Kr.

petraeum — Stein Kr.

latifolium — breitblättrige Kr.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

saxatile — Stein T.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

alpina — Alpen G.

bellidifolia — maßliebenblättriges G.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

resedifolia — waublättriges S.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

argenteum — silberfarbiger St.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume

montana — Berg W.

Orobus XVII, 3. Erven, Fasankraut

luteus — gelbe E.

pyrenaicus — pyrenäische E.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen

comosa — zopfiges H.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.

montanus — Berg W.

exscapus — schaftloses W.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpestre — rother Berg Kl.

alpinum — Alpen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu

Ascyron — großblumiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

Plumeri — Plumiers G.

alpinus — Alpen G.

canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

alpinum — Alpen H.

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

alpina — Alpen P.

sibirica — sibirischer P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsallat, Habichtskraut

foetida — stinkender Sch.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

maculata — geflecktes F.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

mollis — weiches K.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

alpinus — Alpen Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Inula XIX, 2. Alant

bifrons — geflügelter A.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz

Pardalianches — gemeine G.

plantagineum — wegerichblättrige G.

Bellidiastrum — maßliebartige G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

atratum — geschwärzte W.

alpinum — Alpen W.

montanum — Berg W.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

alpina — Alpen Fl.

Centaureum — großes Tausendgüldenkraut

montana — Berg Fl.

alba — weiße Fl.

Rhapontica — unächte Rhabarber.

Filago XIX, 4. Filzkraut

gallica — französisches F.

Leontopodium — Alpen F.

Viola XIX, 6. Veilchen

montana — Berg V.

cenisia — Alpen V.

biflora — zweyblumiges V.

grandiflora — großblumiges V.

calcarata — gesporntes V.

cornuta — gehörntes V.

Satyrion XX, 1. Stendel

albidum — weißlicher St.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Ophrys XX, 1. Ragwurz.

Corallorhiza — Corallenwurzel

andropophora — menschenähnliche R.

myodes — insektentragende R.

arachnites — spinnenartige R.

Carex XXI, 3. Riedgras

foetida — stinkendes R.

curvula — gekrümmtes R.

atrata — schwarzes R.

pedata — fußförmiges R.

spadicea — kastanienbraunes R.

ferruginea — rostfarbiges R.

alba — weißes R.

Rhodiola XXII, 6. Rosenwurz

rosea — gemeine R.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz

album — weiße N.

nigrum — schwarze N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachs - Aussauger

Europaea — Europäischer Fl.

(Diese Pflanze, welche aus einem Büschel langer röthlicher Fäden besteht, keimt zwar aus ihrem Saamen aus der Erde hervor, windet sich aber alsdann mit ihren Fasern und Fäden um allerley Pflanzen, besonders um Lein und Dotter, in die Höhe, und zieht ihre Nahrung aus selbigen zum großen Nachtheil derselben.)

Schmarozerpflanzen.

Monotropa X, 1. Wurzelsauger

Hypopithys — Fichtenbaumwurzelsauger.

(In grossen dunkeln Wäldern, besonders in Nadelhölzern, an den Wurzeln grosser Bäume. Der ungefähr spannenhohe Stengel ist statt der Blätter mit Schuppen versehen, welche so wie die Blume gelblich weiss sind.)

Orobanche XIV, 2, Sommerwurz
major — grosse S.

(Auf Äckern, Wiesen, bergigen Wäldern auf den Wurzeln anderer Gewächse, besonders der Bäume und Sträucher.)

PHILADELPHIA - KALENDER

oder

VERGLEICHENDE JAHRES-ÜBERSICHT

der

PHILADELPHIA - EXPOSITION

1876

UND DER VERGLEICHENDE JAHRES-ÜBERSICHT

der

PHILADELPHIA - EXPOSITION

1876

VERGLEICHENDE JAHRES-ÜBERSICHT

PHILADELPHIA - EXPOSITION

1876

UND DER VERGLEICHENDE JAHRES-ÜBERSICHT

der

PFLANZEN - KALENDER

oder

Versuch einer Anweisung

welche

Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe

finden könne

und auf welchem Standorte

von

F. A. Heyne

Herzoglich Sächsischer Rath.

Zweytes Heft.

Zweyte vermehrte Auflage.

Leipzig,

bey Johann Ambrosius Barth.

1806.

PFLANZEN - KALENDER

oder

Versuch einer Anweisung

welche

Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe

finden könne

und auf welchem Standorte

von

F. A. H. v. H.

Herausgegeben von H. v. H.

Neuer Hefen

Zweite vermehrte Auflage

Leipzig

Verlag von C. F. W. Neumann

1860

J U L Y.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
maritima — Meerſtrands E.

Scirpus III, 1. Binsengras
lacustris — See B.

mucronatus — ſteifgeſpitztes B.
maritimus — Ufer B.

Elymus III, 2. Haargras
arenarius — Sand H.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
marinum — Meer S.

Convolvulus V, 1. Winde
Soldanella — Meer W.

Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblättrige Waſſerpimpinelle.

Chenopodium V, 2. Gänſefuß
maritimum — Seestrands G.

am Meerstrande.

Salsola V, 2. Salzkrant

Kali — rauchblättriges S.

Tragus — glattblättriges S.

Soda — Sode

altissima — höchstes S.

fruticosa — strauchartiges S.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Seestrands M.

Linum V, 5. Lein

maritimum — Strandlein, gelber Seeflachs.

Rumex VI, 3. Ampfer

maritimus — Seestrands A.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack

maritimum — Meerstrands S.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

maritima — Seestrands W.

Cochlearia XV, 2. Löffelkraut

officinalis — gebräuchliches L.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

maritimus — grünblättrige Meer L.

incanus — bestäubte L.

annuus — jährige L.

tricuspidatus — dreyzackige L.

Athanasia XIX, 1. Athanasie

maritima — Seestrands A.

Zostera XX, 3. Wasserriemen

marina — Meerriemen

oceanica — oceanischer W.

2) Im Wasser.

- Utricularia** II, 1. Wasserschlauch
 vulgaris — gemeiner W.
 minor — kleiner W.
- Scirpus** III, 1. Binsengras
 mucronatus — steifgespitztes B.
 maritimus — Ufer B.
- Festuca** III, 2. Schwingel
 fluitans — Schwaden S. Schwaden-Grütze.
- Arundo** III, 2. Rohr, Schilf
 phragmites — gemeines R.
- Galium** IV, 1. Labkraut
 palustre — Sumpf L.
- Potamogeton** IV, 3. Saamkraut
 natans — schwimmendes S.
 perfoliatum — durchstochenes S.
 densum — dichtes, Büschel S.
 marinum — Meer S.
 pusillum — kleines S.
- Menyanthes** V, 1. Zottenblume
 nymphoides — seerosenartige Z.
 trifoliata — dreyblättrige Z.
- Lysimachia** V, 1. Lysimachie
 vulgaris — gemeine L.
- Sium** V, 2. Merk, Eppich
 latifolium — breitblättriger M.
 angustifolium — schmalblättriger M.
- Phellandrium** V, 2. Peersaat, Pferdesaat
 aquaticum — Wasser P. Pferdefenchel.
- Cicuta** V, 2. Wüterich
 virosa — giftiger W.

im Wasser.

Acorus VI, 1. Kalmus

Calamus — gemeiner K.

Rumex VI, 3. Ampfer

Britannica — britannischer A.

Alisma VI, 4. Wasservegerich

Plantago aquatica — gemeiner W.

natans — schwimmender W.

ranunculoides — hahnenfußartiger W.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt

amphibium — Wechsel W.

Butomus IX, 3. Wasserviole

umbellatus — doldenförmige W.

Ranunculus XII, 6. Hahnenfuß

sceleratus — Gift H.

Chara XXI, 1. Armleuchter

tomentosa — filziger A.

vulgaris — gemeiner A.

hispida — steifborstiger A.

flexilis — biegsamer A.

Typha XXI, 3. Rohrkolbe

latifolia — breitblättrige R.

angustifolia — schmalblättrige R.

Sparganium XXI, 3. Igelsknospe

ramosum — ästige I.

natans — schwimmende I.

Najas XXI, 6. Najade

minor — kleine N.

Myriophyllum XXI, 7. Federkraut

spicatum — ährenförmiges F.

verticillatum — wirtelförmiges F.

im Wasser.

Sagittaria XXI, 7. Pfeilkraut

sagittifolia — gemeines Pf.

Hydrochaeris XXII, 7. Froschbiss

Morsus Ranae — gemeiner Fr.

Stratiotes XXII, 9. Wasserfeder

aloites — aloëartige W.

3) Am Wasser.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

quadrifolia — vierblättriger E.

maritima — Meerstrands E.

Lycopus II, 1. Wolfsfuß

Europaeus — Europäischer W.

Scirpus III, 1. Binsengras

lacustris — See B.

setaceus — borstenartiges B.

Galium IV, 1. Labkraut

uliginosum — Morast L.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Seestrands W.

subulata — pfriemenförmiger W.

Coronopifolia — Krähenfuß W.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides palustris — sumpfscorpionarti-
ges V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

vulgaris — gemeine L.

nummularia — Wiesengeld.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

am Wasser.

Solanum V, 1. Nachtschatten

Dulcamara — Bittersüßs.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Meerstrands M.

Selinum V, 2. Sylge

sylvestre — wilde S.

Sium V, 2. Merk, Eppich

latifolium — breitblättriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich

virosa — giftiger W.

Juncus VI, 1. Binsen

conglomeratus — Knopf B.

effusus — Flatter B.

inflexus — gebogene B.

articulatus aquaticus — gegliederte Wasser B.

bulbosus — knollige B.

bufonius — Kröten B.

Rumex VI, 1. Ampfer.

crispus — krausblättriger A.

nemolapathum — kleine Grindwurz

maritimus — Seestrands A.

acutus — spitzblättriger A.

obtusifolius — stumpfblättriger A.

aquaticus — Wasser A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

tetragonum — viereckiger W.

palustre — Sumpf W.

am Wasser.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt

amphibium — Wechsel W.

hydropiper — Wasserpfeffer.

Stellaria X, 3. Meirich

palustris — grasblättriger Sumpf M.

Cerastium X, 4. Hornkraut

aquaticum — Wasser H.

Lythrum XI, 1. Lythrum, Weiderich

salicaria — Purpur W. Blutkraut.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

Ulmaria — Johanniswedel, Wiesenkönigin.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut

rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut

palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

flammula — kleiner H.

reptans — kriechender H.

lingua — großer langblättriger H.

Mentha XIV, 1. Münze

sylvestris — wilde M.

aquatica — Wasser M.

gentilis — Balsam M.

arvensis — Acker M. wilder Poley.

Stachys XIV, 1. Andorn

palustris — Sumpf A.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut

galericulata — gemeines Sch.

hastifolia — spontonblättriges Sch.

am Wasser.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz

nodosa — knotige Br.

aquatica — Wasser Br.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze

aquatica — gewöhnliche S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Nasturtium — Brunnenkresse

sylvestre — wilde Rauke

amphibium — Wasser- oder Landrauke

palustre — Sumpfrauke.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

palustre — Sumpf St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

maritimus — Meerstrands Sch.

uliginosus — Sumpf Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

quadrangulare — viereckiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

maritimus — Seestrands G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

oleraceus — kohlartiges Kr.

palustris — Sumpf-Kratzdistel

tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorpflanze

cannabinum — Wasserhanf.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

nudum — nackendes Sumpf R.

tomentosum — filzichtetes Sumpf R.

am Wasser.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

aquaticus — Wasser Kr.

paludosus — Sumpf Kr.

Inula XIX, 2. Alant

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Sp.

Atriplex XXIII, 1. Melde

tatarica — tatarische M.

hastata — spontonblättrige M.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Meerstrands W.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut

marinum — Meer S.

Convolvulus V, 1. Winde

Soldanella — Meer W.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinello.

Glaux V, 1. Milchkraut, Salzkraut

maritima — gemeines M.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack

maritimum — Meerstrands S.

Sedum X, 4. Sedum, Hauslaub

Cepaea — burzelkrautartiges S.

Lactuca XIX, 1. Salat

saligna — weidenblättriger S.

an Salzquellen.

Aster XIX, 2. Sternblume

Tripolium — Salz St.

Chara XXI, 1. Armleuchter

hispida — steifborstiger A.

5) An quelllichten Orten.

Panicum III, 2. Hirsegras

crus corvi — rabenfüßiges H.

Galium IV, 1. Labkraut

palustre — Sumpf L.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf

phragmites — gemeines R.

Juncus VI, 1. Binsen

conglomeratus — Knopf B.

effusus — Flatter B.

inflexus — gebogene B.

filiformis — fadenförmige B.

bufonius — Kröten B.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Cyperus III, 1. Cypergras

flavescens — gelbliches C.

fuscus — schwarzbraunes C.

Cynosurus III, 2. Kammgras

caeruleus — blaues K.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

uliginosum — Morast L.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
thyrsiflora — sträußige L.
nummularia — Wiesengeld.

Hydrocotyle V, 2. Wassernabel
vulgare — gemeiner W.

Angelica V, 2. Angelik, Brustwurz
sylvestris — wilde A.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — Europäische P.

Rumex VI, 3. Ampfer
crispus — krausblättriger A.
nemolapathum — kleine Grindwurz.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
palustre — Sumpf Dr.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
palustris — grasblättriger Sumpf M.

Spergula X, 4. Spark
nodosa — knotiger S.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
palustre — Sumpf S.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
flavum — gelbe W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
flammula — kleiner H. Egelkraut
reptans — kriechender H.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Teucrium XIV, 1. Gamander
scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze
sylvestris — wilde M.
Pulegium — Poley.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut
palustris — Sumpf L.
sylvatica — Wald L.

Sysimbrium XV, 2. Rauke
sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1, Storchschnabel
chaerophyllum — kerbelblättriger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
palustris — Sumpf Pl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
siliquosus — Wiesen Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
quadrangulare — viereckiges J.
elodes — haariges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
palustris — Sumpf G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
paludosum — Sumpf H.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
oleraceus — kohllartiges Kr.
palustris — Sumpf Kr.
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Senecio XIX, 2. Kreuzwurz
aquaticus — Wasser Kr.
paludosus — Sumpf Kr.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
palustris — Sumpf A.

Inula XIX, 2. Alant
britannica — Großbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.
salicina — weidenblättriger A.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
paludosa — Sumpf R.

Serapias XX, 1. Zimbel
longifolia — langblättrige Z.

Carex XXI, 3. Riedgras
fulva — dunkelrothes R.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und
Grasplätzen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
austriaca — österreichischer E.
Teucrium — edler E.

Salvia II, 1. Salbey
pratensis — Wiesen S.
verticillata — wirtelförmige S.

Scirpus III, 1. Binsengras
holoschoenus — rundähriges B.

Melica III, 2. Perlgras
caerulea — blaues P.

Cynosurus III, 2. Kammgras
cristatus — gemeines K.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Festuca III, 2. Schwingel
decumbens — liegender S.

Bromus III, 2. Tresp
triflorus — dreyblumiger Tr.

Avena III, 2. Hafer
flavescens — Gold H.
pratensis — Wiesen H.

Elymus III, 2. Haargras
Europaeus — Europäisches H.

Triticum III, 2. Weizen
tenellum — zarter W.

Globularia IV, 1. Kugelblume
vulgaris — gemeine K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
ochroleuca — gelbliche S.

Galium IV, 1. Labkraut
rubroides — rötheartiges L.
verum — wahres L.
boreale — mitternächtliches L.

Campanula V, 1. Glocken
glomerata — knaulartige Gl.

Gentiana V, 2. Enzian
Centaureum — Tausendgüldenkraut.

Selinum V, 2. Silge
carvifolium — kümmelblättrige S.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
officinale — gewöhnlicher H.
Silaus — Silau, Roskümmel.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
aromaticum — gewürzhafter K.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Allium VI, 1. Lauch

oleraceum — Gemüs L.

senescens — narcissenblättriger L.

angulosum — eckiger L.

Polygonum VIII, 2. Wegetritt

Bistorta — Natterwurz, Krebswurz.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelken

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

filipendula — Filipendel.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

angustifolium — schmalblättrige W.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Prunella XIV, 1. Brunelle

laciniata — zerschlossene Br.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm

Crista Galli — gelber H. klingender Hanns.

alectorolophus — haariger H.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

officinalis — gebräuchlicher A.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

cristatum — kammartiger K.

pratense — Wiesen K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pratense — Wiesen St.

dissectum — zerschnittener St.

sanguineum — blutiger St.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichte H.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern

tuberosus — knollige Pl.

pratensis — Wiesen Pl.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

varia — bunte Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

perpusillus — sehr kleiner V.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut

Cicer — wilde Kichern.

Trifolium XVII, 3. Klee

hybridum — Bastard Kl.

fragiferum — Erdbeer Kl.

procumbens — liegender Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

arvensis — Feld Sch.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichelklee

lupulina — kleiner Hopfen Schn.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen

dubium — zweifelhaftes H.

Auricula — großes Mauseöhrchen

cymosum — langes M.

praemorsum — abgebissenes H.

umbellatum — doldenförmiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

biennis — zweyjähriger P.

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

maculata — geflecktes F.

radicata — langwurzlichtes F.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

acaulis — stengellose Distel.

Serratula XIX, 1. Scharte

tinctoria — Färber Sch.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

dioicum — getrenntes R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

crucifolius — raukenblättriges Kr.

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — wahrer A.

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

salicina — weidenblättriger A.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — grofse Mafsliebe
inodorum — geruchlose G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

bifolia — zweyblätteriges Kn.

globosa — kugelrundes Kn.

pyramidalis — pyramidenförmiges Kn.

coriophora — stinkendes Kn.

mascula — männliches Kn.

9) Auf Sandboden.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Dianthus X, 2. Nelke

arenarius — Sand N.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Spergula X, 4. Spark

saginoides — mastkrautartiger Sp.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Papaver XIII, 1. Mohn

Argemone — keulenartiger M.

dubium — zweifelhafter M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

Helianthemum — gemeiner Sonnen-Günsel.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Chamaepithys — Schlagkraut, Feldcypresse.

auf Sandboden.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
ladanum — schmalblättriger H.

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz
ramosa — ästige S.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
campestre — Feld St.

Brassica XV, 2. Kohl
Erucastrum — raukenartiger K.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
pilosa — haariger G.
germanica — deutscher G.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichte H.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
arenarius — Sand W.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen
dubium — zweifelhaftes H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
glabra — glattes F.

Gnaphalium XIX, 2. Rhurkraut
arenarium — Sand R. Mottenkraut

Filago XIX, 4. Filzkraut
Germanica — deutsches F.
pyramidata — pyramidenförmiges F.

Jasione XIX, 5. Jasione, Schafblume
montana — Berg J.

Holcus XXIII, 1. Honiggras
mollis — weiches H.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Melica III, 2. Perlgras
ciliata — gefranztes P.

Bromus III, 2. Tresp
pinnatus — gefiederter Tr.

Stipa III, 2. Pfiemengras
pennata — gefiedertes Pfr.
juncea — Rohr Pfr.
capillata — Haar Pfr.

Galium IV, 1. Labkraut
montanum — Berg L.
saxatile — Stein L.

Alchemilla IV, 1. Sinau, Frauenmantel
alpina — Alpen S.
pentaphylla — fünfblätteriger S.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Verbascum V, 1. Königskerze
Thapsus — wollichte K.
thapsoides — vollkrautartige K.
phlomoides — phlomisartige K.

Thesium V, 1. Leinblatt, Flachskraut
linophyllum — leinblättriges Fl.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Vincetoxicum — gemeine Schwalbenwurz.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Athamanta V, 2. Hirschwurz

Cervaria — gemeine H.

Oreoselinum — Bergpetersilie.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel

annuum — jähriger S.

Lilium VI, 1. Lilie

Martagon — rothe Berg L. Türkischer Bund.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

montanum — Berg W.

Erica VIII, 1. Heide

vulgaris — gemeine H.

Dictamnus X, 1. Diptam

albus — weißer D.

Dianthus X, 2. Nelke

deltoides — deltaförmige N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

Telephium — gemeines H.

reflexum — zurückgebogenes H.

rupestre — Felsen H.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Botrys — Trauben G.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn

galeobdolon — gelbe Hanfnessel.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Stachys XIV, 1. Andorn

germanica — großer Feld oder Berg A.

recta — gerader Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian, Quendel

Serpyllum — Feldkümmel

Acinos — basilienartiger Th.

Prunella XIV, 1. Brunelle, Braunheil

grandiflora — großblumige Br.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

saxatile — eigentliches St.

montanum — Berg St.

Erysimum XV, 2. Hederich

repandum — geschweiffter H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

erysimoides — hederichartige L.

Brassica XV, 2. Kohl

Erucastrum — raukenartiger K.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume

amara — bittere Kr.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster

sagittalis — pfeilförmiger G.

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichte H.

Vicia XVII, 3. Wicke

pisiformis — erbsenartige W.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Vicia XVII, 3. Wicke

dumetorum — Hecken W.

sylvatica — Wald W.

cassubica — cassubische W.

multiflora — vielblumige W.

angustifolia — schmalblättrige W.

lathyroides — platterbsenartige W.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen

comosa — zopfichtes H.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

pilosus — haarichtes W.

gelegiformis — geißrautenartiges W.

glycyphyllus — wildes Süßholz

danicus — dänisches W.

Trifolium XVII, 3. Klee

rubens — röthlicher Kl.

ochroleucum — blaßgelber Kl.

montanum — Berg Kl.

aureum — goldfarbiger Kl.

spadiceum — kastanienbrauner Kl.

filiforme — fadenförmiger Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

hispanica — spanische S.

graminifolia — grasartige S.

Lactuca XIX, 1. Salat

quercina — eichenblättriger S.

perennis — ausdauernder S.

- auf kleinen Bergen und Anhöhen.
Prenanthes XIX, 1. *Prenanthe*
 viminea — klebrige Pr.
 purpurea — purpurrothe Pr.
Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
 praemorsum — abgebissenes H.
 saxatile — Stein H.
Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
 maculata — geflecktes F.
Carduus XIX, 1. Distel
 defloratus — Bergdistel.
Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
 acaulis — stengellose Distel.
Carlina XIX, 1. Eberwurz
 vulgaris — gemeine E.
Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
 acre — scharfes Fl.
Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
 arenarium — Sand R. Mottenkraut.
Aster XIX, 2. Sternblume
 annuus — jährige St.
Inula XIX, 2. Alant
 hirta — steifhaariger A.
 montana — Berg A.
Doronicum XIX, 2. Gemswurz
 Pardalianches — gemeine G.
Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
 cherblume
 corymbosum — flachblumenstraufsartige W.
Anthemis XIX, 2. Chamille
 tinctoria — Färber Ch.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
nobilis — edle G.

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge
salicifolium — weidenblättriges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

phrygia — phrygische Fl.

nigra — schwarze Fl.

montana — Berg Fl.

paniculata — rispenförmige Fl.

scabiosa — Eisenwurzel, große wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

montana — Berg F.

Jasione XIX, 6. Jasione, Schafblume

montana — Berg J. gemeine Sch.

Satyrium XX, 1. Stendel

hircinum — stinkender St.

albidum — weißlicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

cordata — herzförmige R.

Serapias XX, 1. Zimbel

latifolia — breitblättrige Z.

rubra — rothe Z.

Poterium XXI, 7. Becherblume

sanguisorba — gemeine B.

11) Auf gebauten Äckern.

Avena III, 2. Hafer

sativa — gemeiner H.

auf gebauten Äckern.

Hordeum III, 2. Gerste

vulgare — gemeine vierzeilige G.

hexastichon — sechszeilige G.

distichon — zweyzeilige G.

Zeocriton — Reifsgerste.

Triticum III, 2. Weizen

aestivum — Sommer W.

Rubia IV, 1. Grapp, Färberröthe

tinctorium — gemeine F.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — türkischer T.

paniculata — Jungfern T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

tuberosum — Erdbirne, Kartoffel

Linum V, 5. Lein, Flachs

usitatissimum — gewöhnlicher L.

humile — niedriger L. Klänge L.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

fagopyrum — gemeiner Buchweizen.

Spergula X, 4. Spark

arvensis — Acker Sp.

Brassica XV, 2. Kohl

Napus sativa — gewöhnlicher Rübsen

Rapa — gemeine weisse Rübe.

Sinapis XV, 2. Senf

alba — weißer S.

nigra — schwarzer S.

Pisum XVII, 2. Erbsen

sativum — gemeine Feld E.

auf gebauten Äckern.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
sativus — zahme Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
sativa — zahme Futter W.
biennis — Winter W.

Ervum XVII, 3. Linse
Lens — gemeine L.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
Onobrychis — Esparcette.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
sativa — Lucerne.

Cannabis XXII, 4. Hanf
sativa — gemeiner H.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel
dendata — gezahnter Acker B.

Polycnemon III, 1. Knorpelkraut
arvense — gemeines Kn.

Agrostis III, 2. Straußgras
miliacea — hirsegrasartiges Str.
interrupta — unterbrochenes Str.

Sherardia IV, 1. Sherardie
arvensis — Acker Sh.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.
rubrum — rothes L.

Centunculus IV, 1. Centunkel, Klinker
minimus — kleinster C.

auf ungebauten Äckern.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut.

arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides arvensis — Acker V.

Anagallis V, 1. Gauchheil

arvensis — gemeiner Acker G.

caerulea — blauer G.

Convolvulus V, 1. Winde

arvensis — Acker W.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume

verticillatum — wirtelförmige Kn.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

album — weißer G.

viride — grüner G.

hybridum — unächter G.

polyspermum — vielsaamiger G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel

grandiflora — großblumiger Kl.

daucoides — möhrenartiger Kl.

leptophylla — kleinblättriger Kl.

Linum V, 5. Lein

Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch

oleraceum — Gemüs L.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

convolvulus — Buchwinde.

Sceleranthus X, 2. Knauel

annuus — jähriger Kn.

perennis — ausdauernder Kn.

auf ungebauten Äckern.

Gypsophila X, 2. Gipskraut

muralis — Mauer G.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze

arvensis — grasblättriger Acker M.

Spergula X, 4. Spark

arvensis — Acker Sp.

Mentha XIV, 1. Münze

arvensis — Acker M.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

purpureum — rother B.

amplexicaule — ungestielter B.

Stachys XIV, 1. Andorn

annua — jähriger A.

arvensis — kleiner Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian

Acinos — basilienartiger Th.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm

Crista galli — gemeiner H. klingender Hanns.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

arvense — Acker K.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

arvense — Acker L.

minus — kleines L.

Orontium — Orant, wildes L.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

rotundifolia — rundblättriger B.

amara — bitterer B.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

arvense — Acker T.

campestre — Feld T.

auf ungebauten Äckern.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

campestre — Feld St.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Brassica XV, 2. Kohl

Napus sylvestris — wilder Rübsen.

Sinapis XV, 2. Senf

arvensis — Acker S.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

dissectum — zerschnittener St.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weiberkrieg

arvensis — Acker H.

spinosa — stachlichter H.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

varia — bunte Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

perpusillus — sehr kleiner V.

Trifolium XVII, 3. Klee

agrarium — gelber Acker Kl.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichelklee

lupulina — kleiner Hopfen Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

humifusum — gestrecktes J. kleines J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

arvensis — Acker G.

auf ungebauten Äckern.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Auricula — großes Mauseöhrchen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

minima — kleinster Sch.

Serratula XIX, 1. Scharte

arvensis — Ackerdistel, Sandistel.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

acre — scharfes Fl.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

Leucanthemum — große Maßliebe

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Chamomilla — gemein. Chamille, Hellmerchen.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — wilde Hunds Ch.

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle Garben.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — Eisenwurzel, große wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V.

arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Bromus III, 2. Tresp
secalinus — Roggen Tr.

Avena III, 2. Hafer
fatua — wilder H.

Lolium III, 2. Lolch
temulentum — Taumel L.

Galium IV, 1. Labkraut
spurium — unächtes L.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Campanula V, 1. Glocken
Speculum Veneris — Venusspiegel.

Cacaulis V, 2. Klettenkerbel
latifolia — breitblättriger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Scandix V, 2. Kerbel
Pecten Veneris — Nadelkerbel, Venuskamm.

Myosurus V, 7. Mäuseschwanz
minimus — kleinster M.

Agrostemma X, 4. Raden
Githago — gemeine Korn R.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblättrige W.
helioscopia — sonnenwendige W. Garten W.

Papaver XIII, 1. Mohn
hybridum — unächter M.
Argemone — keulenförmiger M.
Rhoeas — Feld M. Klatschrosen.

im Getreide,

Delphinium XIII, 3. Rittersporn

Consolida — Feld R.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel

arvensis — Acker N.

Adonis XIII, 6. Adonis

aestivalis — Sommer A.

autumnalis — Herbst A.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Myagrum XV, 1. Leindotter

sativum — zahmer L.

paniculatum — rispenförmiger L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

arvense — Acker T.

Sinapis XV, 2. Senf

arvensis — Acker S.

Raphanus XV, 2. Rettig

Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich.

Pisum XVII, 3. Erbse

arvense — Acker E. Stock E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern

Nissolia — Nissolische Pl.

Aphaca — blattlose Pl.

hirsutus — zottige Pl.

tuberosus — knollichte Pl.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

arvensis — Acker G.

asper — rauhe G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

im Getreide.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
minima — kleinster Sch.

Serratula XIX, 1. Scharte
arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume
segetum — Getreide W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Chamomilla — gebräuchliche Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — Acker Ch. wilde Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Cyanus — gemeine Kornblume.

Valantia XXIII, 1. Vaillante
Aparine — Klebkraut-Vaillante.

14) In gröfsern und dichten Wäl-
dern.

Circaea II, 1. Hexenkraut
lutetiana — — großes gemeines H.
alpina — Alpen H.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
montana — Berg E.

Salvia II, 1. Salbey
nemorosa — Wald S.
sylvestris — wilde S.

Bromus III, 2. Tresp
giganteus — hoher Wald Tr. Futter Tr.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

in größern u. dichten Wäldern.

Asperula IV, 1. Waldmeister

cynarchica — kleiner W.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Campanula V, 1. Glocken

persicifolia — pfirsichblättrige Gl.

pyramidalis — pyramidenförmige Gl.

trachelium — gemeines Halskraut

cervicaria — größtes Halskraut

hybrida — Bastard Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere

Periclymenum — gemeine Je länger je lieber.

Atropa V, 1. Tollkraut

Belladonna — gemeines T. Wolfskirsche.

Juncus VI, 1. Binsen

articulatus sylvaticus — gegliederte Wald B.

uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.

bulbosus — knollige B.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

montanum — Berg W.

Ledum X, 1. Kühnrost

palustre — Sumpf K.

Pyrola X, 1. Wintergrün

rotundifolia — rundblättriges W.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

Telephium — gemeine fette H.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Loeselii — Lösels R.

in größern u. dichten Wäldern.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
paludosum — Sumpf H.
sabaudum — Savoisches H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
sylvaticus — Wald Kr.
erucifolius — raukenblätteriges Kr.
Jacobaea — Jakobkskraut.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
integrifolia — ganzblätterige A.

Satyrium XX, 1. Stendel
repens — kriechender St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
spiralis — spiralförmige R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

Asperula IV, 1. Waldmeister
laevigata — geglätteter W.

Campanula V, 1. Glocken
persicifolia — pfirsichblätterige Gl.

Rhamnus V, 1. Wegdorn
frangula — Faulbaum.

Sanicula V, 2. Sanikel
Europaea — Europäische S.

in lichten Laubholzwäldern.

Lilium VI, 1. Lilie

Martagon — Türkischer Bund, rothe Berg L.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut

ramosum — ästiges Sp.

Liliago — astloses Sp. Sandlilie.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

montanum — Berg W.

Erica VIII, 1. Heide

vulgaris — gemeine H.

Dianthus X, 2. Nelke

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze

nemorum — Wald M.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

Aruncus — Waldgeißbart.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

Vitalba — gemeine W. alter Mannsbart

flammula — brennende W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Scorodonia — salbeyblätteriger G.

Mentha XIV, 1. Münze

viridis — grüne M.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn

galeobdolon — gelbes K. gelbe Hanfnessel.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

nemorosum — Hain K.

in lichten Laubholzwäldern.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

sylvaticum — Wald K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

sylvaticum — Wald St.

sanguineum — blutiger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen, Kichern

sylvestris — wilde Pl.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

radicata — langwurzlichtes E.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arnica XIX, 2. Wulverley

montana — Berg W.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Sp.

16) In Feldebüschen u. Gesträuchen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

spuria — unächter E.

longifolia — langblättriger E.

officinalis — gebräuchlicher E.

Melica III, 2. Perlgras

nutans — überhängendes P.

Dipsacus IV, 1. Karten

fullonum — Weber K.

Galium IV, 1. Labkraut

boreale — mitternächtliches L.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

vulgaris — gemeine L.

in Feldebüschchen u. Gesträuchen.

Campanula V, 1. Glocken

rapunculoides — rapunzelartige Gl.

trachelium gemeines Halskraut.

Selinum V, 2. Silge

carvifolium — kümmelblättrige S.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus

bacciferus — beerentragender C.

Otites — Ohrlöfleinkraut.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

Galeobdolon — gelbes K. gelbe Hanfnessel.

Betonica XIV, 1. Betonie

officinalis — gebräuchliche B.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

dissectum — zerschnittener St.

Malva XVI, 2. Malve

alcea — Sigmarkraut.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

in Feldebüschchen u. Gesträuchen.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

radicata — langwurzlichtes F.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

bifolia — zweyblättriges Kn.

Atriplex XXIII, 1. Melde

tatarica — tatarische M.

17) An Hecken und Zäunen.

Elymus III, 2. Haargras

caninus — Hunds H.

Dipsacus IV, 1. Karten

pilosus — haarichte K.

laciniatus — zerschlossene K.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

Molugo — weißes L.

Convolvulus V, 1. Winde

sepium — Zaun W.

Campanula V, 1. Glocken

trachelium — gemeines Halskraut.

Lonicera V, 1. Lonicere

Periclimenum — gemeine Je länger je lieber.

Solanum V, 1. Nachtschatten

Dulcamara — Bittersüßs.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Bonus Henricus — guter Heinrich

vulvaria — stinkender G.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirnet

anthriscus — gemeines Dr.

nodosum — knotiges Dr.

an Hecken und Zäunen.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
daucoides — möhrenartiger Kl.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Aethusa V, 2. Gleifse
Cynapium — Garten G. tolle Petersilie.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
temulentum — berauschender K.

Polygonum VIII, 2. Wegtritt
convolvulus — Buchwinde
dumetorum — Vogelzunge.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupaloria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Rosa XII, 5. Rose
villosa — rauhe R. Moos R.
sempervirens — immergrüne R.
canina — Hunds R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
reptans — kriechendes F.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
erecta — aufrechte W.

an Hecken und Zäunen.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

maculatum — gefleckter B.

album — weißer B.

purpureum — rother B.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblättriges K.

grandiflora — großblumiges K.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

Cardiaca — Herzkraut, Wolfsfuß

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

vulgare — gemeine W.

Origanum XIV, 1. Dösten

vulgare — gemeine D.

Thymus XIV, 1. Thymian

serpillum — gemeiner Th. Feldkümmel.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — pappelblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

an Hecken und Zäunen.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kicher
pratensis — Wiesen Pl.
sylvestris — wilde Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
Cracca — Vogel W.
sepium — Zaun W.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut, Tragant
cicer — wilde Kichern, kichernartiges W.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

Lactuca XIX, 1. Salat
virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
muralis — Mauer Pr.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
virens — grüner P.
Dioscoridis — Dioscorides P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — große Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

an Hecken und Zäunen.

Carduus XIX, 1. Distel

crispus — krause D.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

viscosus — klebriges Kr.

erucifolius — raukenblättriges Kr.

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — wahrer A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cotula — Hunds Ch.

Bryonia XXI, 9. Zaunrube

alba — weisse Z.

Humulus XXII, 4. Hopfen

lupulus — gemeiner H.

Parietaria XXIII, 1. Glaskraut

officinalis — gebräuchliches Gl.

Atriplex XXIII, 1. Melde

rosea — Rosen M.

nitens — glänzende, pfeilförmige M.

hastata — spontonblättrige M.

18) An Wegen und Dämmen.

Panicum III, 2. Hirsegras

verticillatum — querlförmiges H.

an Wegen und Dämmen.

Dipsacus IV, 1. Karten

fullonum — Weber.K.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

Molugo — weisses L.

Campanula V, 1. Glocken

rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Chenopodium V, 2. Gänsefuss

urbicum — Stadt G.

glaucum — eisengrauer G.

vulvaria — stinkender G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel

grandiflora — großblumiger Kl.

Dianthus X, 2. Nelke

prolifer — sprossende N.

Thymus XIV, 1. Thymian

serpillum — gemeiner Th. Feldkümmel.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

Coronopus — Schweinskresse.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1, Storchschnabel

molle — weicher St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — pappelblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

alcea — Siegmarskraut.

an Wegen und Dämmen.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

arvensis — Feld Sch.

Lactuca XIX, 1. Salat

saligna — weidenblättriger S.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille

junceae — binsenartige Ch.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

nutans — Bisam D. Esels D.

crispus — krause D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege-Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebs-Distel

Acanthium — gemeine K.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

Inula XIX, 2. Alant

Oculus Christi — Christ-Auge, wilder A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

an Wegen und Dämmen.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — große Maßliebe
inodorum — geruchlose W.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
paniculata — rispenförmige Fl.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras

compressa — zusammengedrücktes R.

Galium IV, 1. Labkraut

verum — wahres L.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Bonus Henricus — guter Heinrich.

Conium V, 2. Schierling

maculatum — gefleckter Sch.

Dianthus X, 2. Nelke

prolifer — sprossende N.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne

reflexum — zurückgebogenes S.

album — weißes S.

acre — scharfes S. Mauerpfeffer

sexangulare — sechseckiges S.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

Eupatoria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

tectorum — gemeine H. Hauslauch.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

reptans — kriechendes F.

an nud auf Mauern und Dächern.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Galeopsis XIV, 1. Katzensicht, Hohlzahn
tetrahit — breitblättriges K.

grandiflora — großblumiges K.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiacus — Herzkraut, Wolfsfuß

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber Lack.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

Ervum XVII, 3. Linse

hirsutum — zottige L.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

an und auf Mauern und Dächern.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — grosse Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

acre — scharfes Fl.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

20) An ganz ungebauten Orten.

Verbena II, 1. Eisenkraut

officinalis — gebräuchliches E.

Dipsacus IV, 1. Karten

fullonum — Weber K.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

lappula — Kletten M.

Verbascum V, 1. Königskerze

lychnitis — lychnisartige K.

nigrum — schwarze K.

blattaria — Schabenkraut.

Datura V, 1. Stechapfel

Stramonium — gemeiner St.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut

niger — schwarzes B.

Atropa V, 1. Tollkraut

Bella donna — gemeines T. Wolfskirsche.

Solanum V, 1. Nachtschatten

villosum — gemeiner, raucher N.

- an ganz ungebauten Orten.
Chenopodium V, 2. Gänsefuß
 glaucum — eisengrauer G.
 vulvaria — stinkender G.
 polyspermum — vielsaamiger G.
Eryngium V, 2. Mannstreu
 campestre — Feld M.
Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirnet
 anthriscus — gemeines Dr.
 nodosum — knotiges Dr.
Conium V, 2. Schierling
 maculatum — gefleckter Sch.
Aethusa V, 2. Gleisse, Schierling
 Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.
Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
 temulentum — berauschender K.
Reseda XI, 3. Resede, Wau
 luteola — Färber-Wau
 lutea — gelbe R.
Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
 exigua — kleine W.
 Esula — eigentliche W.
Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
 argentea — silberfarbiges F.
Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn
 tetrahit — breitblättriges K.
 grandiflora — großblumiges K.
Ballota XIV, 1. Ballote
 nigra — schwarze B.
 alba — weiße B.
Marrubium XIV, 1. Andorn
 vulgare — gemeiner A. weißer Dorant.

an ganz ungebauten Orten.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiaca — Herzkraut, Wolfsfuß

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — gemeiner Frauenflachs.

Lepidium XV, 1. Kresse

ruderales — stinkende Kr.

iberis — Europäische Kr.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

rotundifolium — rundblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

mauritiana — mauritanische M.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille

juncea — binsenartige Ch.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

biennis — zweyjähriger P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

an ganz ungebauten Orten.

Arctium XIX, 1. Klette

tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

nutans — Bisam D. Esels D.

crispus — krause D.

marianus — Marien D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebs-Distel

Acanthium — gemeine Kr.

Serratula XIX, 1. Scharte

tinctoria — färbende Sch.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

viscosus — klebriges Kr.

Inula XIX, 2. Alant

germanica — deutscher A.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

arvensis — Acker F.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

annua — jähriges B.

an ganz ungebauten Orten.

Atriplex XXIII, 1. Melde
patula — ausgebreitete M.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Blitum I, 2. Schminkbeere
capitatum — kopfförmige S.
virgatum — ruthenförmige S.

Monarda II, 1. Monarde
didyma — vierfädige M.
fistulosa — röhrichte M.

Salvia II, 1. Salbey
officinalis — gebräuchliche S.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Gladiolus III, 1. Schwerdlilie
communis — gemeine S.

Phalaris III, 2. Glanzgras
arundinacea — rohrartiges Gl.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
alpina — Alpen S.
atro - purpurea — schwarzrothe S.
graminifolia — grasblätterige S.

Heliotropium V, 1. Scorpionkraut
Europaeum — Europäisches S.

Borago V, 1. Boretsch
officinalis — gebräuchlicher B.

Phlox V, 1. Flammenblume
maculata — gefleckte Fl.
pilosa — haarichte Fl.
ovata — eyrunde Fl.

in gewöhnlichen Gärten.

Polemonium V, 1. Sperrkraut

caeruleum — blaues Sp. Griechischer Baldrian

reptans — kriechendes Sp.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

Trachelium V, 1. Halskraut

caeruleum — blaues H.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immerblühende L.

Verbascum V, 1. Königskerze

phoeniceum — rothe K.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche

Alkekengi — gemeine J.

pubescens — haarige J.

Solanum V, 1. Nachtschatten

lycopersicon — Liebesapfel.

Rhamnus V, 1. Wegdorn

Paliurus — Christdorn, Judendorn,

Capsicum V, 1. Spanischer Pfeffer

annuum — jähriger Sp. Pf.

Vinca V, 1. Sinngrün, Inngrün

major — großes S.

Nerium V, 1. Oleander, Rosenlorbeer

Oleander — gemeiner O.

Apocynum V, 2. Hundskohl

androsaemifolium — mannsblutblättriger H.

cannabinum — hanfartiger H.

in gewöhnlichen Gärten.

Asclepias V, 2. Asclepie

Syriaca — syrische Seidenpflanze.

Daucus V, 2. Möhren

Carota — gemeine Möhren.

Sium V, 2. Merk, Eppich

sisarum — Zuckerwurz.

Aethusa V, 2. Gleifse

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie,

Scandix V, 2. Kerbel

odorata — wohlriechender K.

Anethum V, 2. Dille

graveolens — gemeine D.

foeniculum — Fenchel

dulce — süßer Fenchel.

Apium V, 2. Eppich

graveolens — Sellery.

Sambucus V, 2. Hollunder

Ebulus — Atich, krautartiger H.

Allium VI, 1. Lauch

Cepa — gemeine Zwiebel

fistulosum — Winterzwiebel.

Lilium VI, 1. Lilie

candidum — gemeine weisse L.

peregrinum — weisse fremde L.

Chalcedonicum -- scharlachrother Türkenbund

Martagon — rothe Berglilie.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

fulva — rothe T.

Tropaeolum VIII, 1. Kapuzinerkresse

minus — kleine K.

majus — grosse K.

in gewöhnlichen Gärten.

Oenothera VIII, 1. Nachkerze, Weinblume
biennis — zweyjährige N. *Rhapontica*.

Ruta X, 1. Raute

graveolens — starkkriechende R.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke

barbatus — Bart N.

Carthusianorum — Cartheuser N.

Caryophyllus — gemeine Garten N.

plumarius — Feder N.

Sedum X, 4. Sedum, Hauslaub

reflexum — zurückgebogenes S.

Oxalis X, 4. Sauerklee

corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden

coronaria — Sammltröschen, Vexirnelke

flos Jovis — Jupitersblume.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke

Chalcedonica — Brennende Liebe.

Reseda XI, 3. Wau

alba — weißer W.

undata — wellenförmiger W.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Lathyris — Springkraut

helioscopia — sonnenwendige W.

Portulaca XI, 4. Portulak

oleracea — Kohl P.

Punica XII, 1. Graubenbaum

Granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

in gewöhnlichen Gärten.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

salicifolia — weidenblättrige Sp.

tomentosa — filzichte Sp.

chamaedrifolia — gamanderblättrige Sp.

alba — weisse Sp.

Rosa XII, 5. Rose

Eglanteria — Wein R.

rubiginosa — rostfarbige R.

villosa — rauhe R.

Centifolia — hundertblättrige R.

gallica — französische R.

Rubus XII, 5. Brommbeere

odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut

fruticosa — strauchartiges F.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

Glaucium — eisengraues Sch.

corniculatum — gehörntes Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn

somniferum — Garten M.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn

Ajaxis — Garten R.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut

Lycoctonum — gelber St. — Wolfswurz

Napellus — blauer St.

Aquilegia XIII, 5. Akeley

vulgaris — gemeine A.

Nigella XIII, 5. Schwarzkümmel

Damascena — damascenische Nigelle

sativa — zahner Schwarzkümmel.

in gewöhnlichen Gärten.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
integrifolia — ganzblättrige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
platanifolius — ahornblättriger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander
flavum — gelber G.

Satureja XIV, 1. Saturey
hortensis — Garten S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
lophantus — chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblättriger Y.

Lavandula XIV, 1. Lavendel
spica — Spike, gemeiner L.
Stoechas — Stöchaskraut.

Mentha XIV, 1. Münze
crispa — Krausemünze.
piperita — Pfeffermünze.

Origanum XIV, 1. Dosten
Majorana — Majoran.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche Zitron M.

Ocimum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachyon — vielählige B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
majus — großes L.

in gewöhnlichen Gärten.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

lutea — gelber F.

ambigua — ockergelber F.

Lepidium XV, 1. Kresse

sativum — gemeine Garten K.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

officinalis — gebräuchliches L.

Armoracia — Meerrettig.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber Lack

incanus — bestäubter L.

fenestralis — Fenster L.

annuus — jähriger L.

tricuspidatus — dreyzackichter L.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

matronalis — Frauen N.

Brassica XV, 2. Kohl

orientalis — morgenländischer K.

oleracea viridis — gemeiner grüner K.

oleracea capitata — gemeiner weißer Kopf K.

oler. rubra — rother, blauer Kopf K.

oler. sabauda — Savoyer K.

oler. sabellica — grüner Wirsing K.

oler. selenesia — Plumage K.

oler. botrytis — Blumen K.

Napobrassica — Kohlrüben

gongylodes — Kohlrabi

Eruca — raukenartiger K.

in gewöhnlichen Gärten.

Sinapis XV, 2. Senf

alba — weißer S.

nigra — schwarzer S.

Raphanus XV, 2. Rettig

sativus — zahmer R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

striatum — gestreifter St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosenpappel

ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve

caroliniana — carolinische M.

parviflora — kleinblumige M.

Lavatera XVI, 2. Lavater

thuringiaca — thüringische L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

junceum — binsenartiges Pfr.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne

perennis — ausdauernde F.

albus — weiße F.

varius — bunte F.

hirsutus — zottige F.

pilosus — haarichte F.

luteus — gelbe F.

Phaseolus XVII, 3. Bohne

vulgaris — gemeine B.

in gewöhnlichen Gärten.

Phaseolus XVII, 3. Bohne

coccineus — scharlachrothe B. Feuerbohne

nanus — Zwergbohne, Franzbohne.

Pisum XVII, 3. Erbsen

sativum — gemeine E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen

odoratus — wohlriechende Pl.

latifolius — breitblättrige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicken

lutea — gelbe W.

hybrida — Bastard W.

fabia — Buffbohne, Saubohne.

Cicer XVII, 3. Kichern

sativum — zahme K.

arietinum — gemeine K.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

Emerus — Scorpions Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

compressus — zusammengedrückter V.

scorpioides — Scorpion V.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionkraut

vermiculata — wurmförmiges S.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

canadensis — canadisches W.

Trifolium XVII, 3. Klee

Melilotus caerulea — Siebengezeit, wohlriechender Steinklee

- in gewöhnlichen Gärten. *Wegw.*
Trifolium XVII, 5. Klee
Melilotus indica — Ostindischer Steinklee.
Lotus XVII, 3. Schotenklee
siliquosus — Wiesen Sch.
ornithopodioides — vogelfußartiger Sch.
Trigonella XVII, 3. Trigonelle
Foenum græcum — Griechisch Heu
Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
majus — großer B.
orientale — morgenländischer B.
Picris XIX, 1. Bitterkraut
laciniata — zerschlissenes B.
echioides — natterkopffartiges B.
Lactuca XIX, 1. Salat
sativa — gewöhnlicher Garten S.
Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
villosum — zottiges H.
Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
alpina — Alpen P.
rubra — rother P.
Cichorium XIX, 1. Wegwart
Endivia — Endivien, Winterendivien.
Carthamus XIX, 1. Saflor
tinctorius — gemeiner S. wilder Safran
lanatus — wollichter S.
Serratula XIX, 1. Scharte
alpina — Alpen Sch.
Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.

in gewöhnlichen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

annuus — jährige S.

multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

laciniata — zerschlissene R.

purpurea — purpurrothe R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

benedicta — Cardobenedicten.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

Balsamina — Garten-Balsamine.

Zea XXI, 3 Mays

Mays — gemeiner M. Türkisch Korn.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

sanguineus — blutrother A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

Cucumis XXI, 9. Gurke

sativus — gewöhnliche Garten G.

Humulus XXII, 4. Hopfen

lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 1. Melde

hortensis — Garten M.

22) In botanischen Gärten.

Jasminum II, 1. Jasmin

officinale — eigentlicher J.

Collinsonia II, 1. Collinsonie

canadensis — canadische C.

Iris III, 1. Schwerdlilie

variegata — bunte Sch.

Phalaris III, 2. Glanzgras

arundinacea — rohrartiges Gl.

in botanischen Gärten.

Triticum III, 2. Weizen

compositum — vielähriger W.

turgidum — englischer W.

polonicum — polnischer W.

spelta — zweykörniger Dinkel, Spelt

monococcon — einkörniger Dinkel, Einkorn

glaucum — thüringischer W.

Globularia IV, 1. Kugelblume

vulgaris — gemeine K.

Dipsacus IV, 1. Karten

laciniatus — zerschlossene K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

stellata — Stern Sc.

Knautia IV, 1. Knautie

orientalis — morgenländische Kn.

propontica — propontische Kn.

Rubia IV, 1. Grapp

tinctorum — Färberröthe.

Plantago IV, 1. Wegerich

Cynops — staudiger W.

Elaeagnus IV, 1. Oleaster

angustifolius — schmalblättriger Ölbaum.

Alchemilla IV, 1. Sinau

alpina — Alpen S.

pentaphylla — fünfblättriger S.

Hypocoum IV, 2. Lappenblume

procumbens — darniederliegende L.

pendulum — hangende L.

erectum — aufrechte L.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

sempervirens — immergrüne O.

in botanischen Gärten.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge
virginicum — virginische H.

Cerinthe V, 1. Wachsblume
major — größere W.
minor — kleinere W.

Lycopsis V, 1. Krummhals
vesicaria — blasichter Kr.
pulla — brauner Kr.
variegata — bunter Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
italicum — italienischer O.
violaceum — violettblauer O.
creticum — cretischer O.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
quadrifolia — vierblättrige L.

Spigelia V, 1. Spigelia, Wurmkraut
Marilandica — Marylandische Sp.

Phlox V, 1. Flammenblume
maculata — gefleckte Fl.
ovata — eyrunde Fl.

Convolvulus V, 1. Winde
Scammonia — Scammonien, Purgir W.
purpureus — purpurrothe W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde
coccinea — scharlachrothe Tr.
lacunosa — grubichte Tr.
violacea — violette Tr.
triloba — dreylappige Tr.
hederifolia — epheublättrige Tr.
tamnifolia — schmerwurzblättrige Tr.

in botanischen Gärten.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

lilifolia — lilienblättrige Gl.

saxatilis — Stein Gl.

Trachelium V, 1. Halskraut

caeruleum — blaues H.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — großblumige W.

longiflora — langblumige W.

Verbascum V, 1. Königskerze

phoeniceum — rothe Kerze

Myconi — Myconische K.

Datura V, 1. Stechapfel

tatula — bläulicher St.

fastuosa — rother St.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut

albus — weißes B.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche

Alkekengi — gemeine J.

pubescens — haarige Schl.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum patulum -- gemein. weitschweifiger N.

Guineense — Guineischer N.

virginicum — virginischer N.

Judaicum — Judaischer N.

racemosum — traubentragender N.

tomentosum — filzichter N.

in botanischen Gärten.

Celastrus V, 1. Celaster

bullatus — blasichter C.

Lagueria V, 1. Federknopf

cuminoides — kümmelartiger F.

Apocynum V, 2. Hundskohl

androsaemifolium — mannsblutblättriger H.

cannabinum — hanfartiger H.

venetum — venetianischer H.

Cynanchum V, 2. Hundswürger

acutum — spitzblättriger H.

monspeliacum — languedokischer H.

erectum — aufrechter H.

Asclepias V, 2. Aesculapie

Syriaca — Syrische Seidenpflanze

purpurascens — röthliche Aesc.

incarnata — fleischfarbige Aesc.

nigra — schwarze Aesc.

verticillata — wirtelförmige Aesc.

rubra — rothe Aesc.

tuberosa — knollige Aesc.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Botrys — traubenartiger G.

ambrosioides — wohlriechender G.

aristatum — borstiger G.

Salsola V, 2. Salzkraut

rosacea — rosenförmiges S.

Swertia V, 2. Swertie

perennis — perennirende Sw.

difformis — ungestaltete Sw.

Eryngium V, 2. Mannstreu

maritimum — Seestrands M.

in botanischen Gärten.

Sanicula V, 2. Sanikel

Canadensis — canadischer S.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirnet

maximum — größtes Dr.

Ferula V, 2. Steckenkraut

communis — gemeines St.

Asa foetida — Teufelsdreck.

Scandix V, 2. Kerbel

odorata — wohlriechender K.

nodosa — knotiger K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern

aureum — goldgelber K.

aromaticum — gewürzhafter K.

Thapsia V, 2. Thapsie. Flügelsaame

Asclepium — schmalblättrige Th.

Pastinaca V, 2. Pastinak

Opopanax — Gummi P.

Viburnum V, 3. Schlingbaum

nudum — nacktblumiger Sch.

Sambucus V, 3. Hollunder

Ebulus — Attich, krautartiger H.

Cassine V, 3. Cassine

Peragua — Peruaner Theestaude.

Telephium V, 3. Telephie

Imperati — Europäische T.

Aralia V, 5. Aralie, Beerangelik

nudicaulis — nackte Aralie.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume

Limonium — Widerstofs

vulgare — gemeines W.

in botanischen Gärten.

Linum V, 5. Lein

maritimum — Meerstrands L.

Uvularia VI, 1. Zäpfchenkraut

amplexifolia — gemeines Z.

perfoliata — durchstochenes Z.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

fulva — rothe T.

Rumex VI, 3. Ampfer

vesicarius — blasenartiger A.

scutatus — schildförmiger A.

spinosus — stachlichter A.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze

parviflora — kleinblumige N.

muricata — stachlichte N.

mollissima — weiche N.

hirta — rauhe N.

fruticosa — staudige N.

pumila — niedrige N.

Erica VIII, 1. Heide

triflora — dreyblumige H.

cinerea — aschgraue H.

australis — südliche H.

ciliaris — gefranzte H.

herbacea — krautartig grünliche H.

multiflora — vielblumige H.

mediterranea — mittelländische H.

Stellera VIII, 1. Stellere

Passerina — gemeine St.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

viviparum — keimender W.

virginicum — virginischer W.

in botanischen Gärten.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
orientale — morgenländischer W.
divaricatum — auseinandergesperrter W.
tataricum — sibirischer Buchweizen.

Sophora X, 1. Sophore, Schnurstrauch
australis — carolinische S.

Dictamnus X, 1. Diptam
albus — weißer D.

Tribulus X, 1. Burzeldorn
terrestris — Erd B.

Andromeda X, 1. Andromeda
paniculata — rispentragende A.
racemosa — traubentragende A.
calyculata — großkelchichte A.
arborea — baumartige A.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum
Vuedo — aufrechtstehender E.

Hydrangea X, 2. Hydrangea
arborea — baumartige H.

Saxifraga X, 2. Steinbrech
punctata — gedüpfelter St.
umbrosa — schattiger St.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
catholicus — allgemeiner C.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut
noctiflora — nächtliche S.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne
Anacampseros — Wundkraut
Cepaea — burzelkrautartiges S.
album — weißes S.

in botanischen Gärten.

Agrostemma X, 4. Raden
coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke
Flos Jovis — Jupitersblume.

Forskæhlea X, 4. Forskählie
tenacissima — zähe F.

Peganum XI, 1. Harmelstaude
Harmala — gemeine H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.
repens — kriechender O.
Agrimonoides — glatter O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Lathyris — Springkraut
platyphyllos — breitblättrige E.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz
globiferum — kugeltragende H.
arachnoideum — spinnenwebenartige H.
montanum — Berg H.
sediforme — sedumartige H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
Granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
tomentosa — filzichte Sp.
chamaedrifolia — gamanderblättrige Sp.
alba — weisse Sp.
laevigata — geglättete Sp.
palmata — handförmige Sp.
trifoliata — dreyblättrige Sp.

in botanischen Gärten.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

sericea — seidenartiges F.

multifida — vielspaltiges F.

fragaroides — erdbeerartiges F.

bifurca — zweyzinkiges F.

Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
virginianum — virginisches B.

montanum — Berg B.

reptans — kriechendes B.

Actaea XIII, 1. Christophskraut

racemosa — traubenförmiges Chr.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

Glaucium — eisengraues Sch.

corniculatum — gehörntes Sch.

hybridum — unächtes Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn

orientale — morgenländischer M.

Argemone XIII, 1. Argemone

mexicana — mexikanische A.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

ladaniferus — Ladanum schwitzende C.

creticus — cretische C.

albidus — weißliche C.

crispus — krause C.

italicus — italienische C.

Delphinium XIII, 1. Rittersporn

ambiguum — zweifelhafter R.

in botanischen Gärten.

Delphinium XIII, 1. Rittersporn
grandiflorum — großblumiger R.
elatum — hoher R.

Staphisagria — Stephanskraut.

Aconitum XIII, 1. Sturmhut, Eisenhut

Lycoctonum — gelber St.

pyrenaicum — pyrenäischer St.

Anthora — Giftheil.

Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel

damascena — damascenische N.

orientalis — morgenländische N.

Liriodendron XIII, 6. Tulpenbaum

tulipifera — gemeiner T.

Annona XIII, 6. Annonenbaum, Flaschenbaum

glabra — glatter A.

triloba — dreylappichter A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume

narcissiflora — narcissenartige An.

thalictroides — thalictrumartige An.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

viticella — blaue W.

crispa — krause W.

orientalis — morgenländische W.

Thalictrum XIII, 6. Thalictrum, Wiesenraute

cornuti — canadische W.

minus — kleine W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

illyricus — illyrischer H.

Trollius XIII, 6. Trollblume

asiaticus — asiatische Tr.

in botanischen Gärten.

Isopyrum XIII, 6. Doldocke
fumarioides — erdrauchartige D.

Teucrium XIV, 1. Gamander
campanulatum — glockenförmiger G.
multiflorum — vielblumiger G.
virginicum — virginischer G.
canadense — canadensischer G.
chamaedrys — gewöhnlicher G.
flavum — gelber G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Satureja XIV, 1. Saturey
Thymbra — Cretische S.
capitata — Kopf S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
Lophantus — Chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblättriger Y.

Nepeta XIV, 1. Nepten
pannonica — ungarische N.
violacea — violette N.
italica — italienische N.

Lavandula XIV, 1. Lavendel
Stoechas — Stöchaskraut.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
scordioides — gezahntes Gl.
elegans — zierliches Gl.

Mentha XIV, 1. Münze
piperita — Pfeffer M.

in botanischen Gärten.

Betonica XIV, 1. Betonie

orientalis — morgenländische B.

Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Ballota XIV, 1. Ballote

lanata — wollichte B.

Marrubium XIV, 1. Andorn

candidissimum — weißester A.

hispanicum — spanischer A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

tataricus — tatarischer W.

sibiricus — sibirischer W.

crispus — krausichter W.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

aegyptiacum — ägyptische W.

incanum — graue W.

Origanum XIV, 1. Dosten

Aegyptiacum — ägyptische D.

Dictamnus — Cretischer Diptam

sipyleum — sipylische D.

creticum — cretische D.

heracleoticum — heracleotische D.

Thymus XIV, 1. Thymian

alpinus — Alpen Th.

mastichina — Mastixkraut.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche M.

grandiflora — großblumige M.

fruticosa — strauchartige M.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf

moldavica — moldauischer Dr.

in botanischen Gärten.

Melittis XIV, 1. Melissenblatt
melissophyllum — gemeines M.

Ocymum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachion — vielährige B.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
lateriflora — seitenblühendes H.
albida — weißliches H.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Elatine — Erdwinde
linifolium — leinblättriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz
auriculata — geöhrte Br.
scorodonia — melissenblättrige Br.
betonicaefolia — betonienblättrige Br.
frutescens — staudige Br.

Celsia XIV, 2. Celsie
orientalis — morgenländische C.
arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
purpurea — purpurfarbiger F.
lutea — gelber F.
ambigua — ockergelber F.
ferruginea — eisenrostfarbiger F.
obscura — dunkelfarbiger F.
thapsi — wollkrautartiger F.

Bignonia XIV, 2. Bignonie, Trompetenblume
capreolata — gablichte B.
radicans — scharlachrothe B.

in botanischen Gärten.

Ruellia XIV, 2. Ruellie

strepens — rauschende R.

Myagrum XV, 1. Leindotter

hispanicum — spanischer L.

perfoliatum — durchstochener L.

austriacum — österreichischer L.

Vella XV, 1. Löffelschote

annua — jährige L.

Anastatica XV, 1. Rose von Jericho

hierochuntica — gewöhnliche R.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

semperflorens — immerblühender B.

sempervirens — immergrüner B.

umbellata — doldenartiger B.

amara — bitterer B.

pinnata — gefiederter B.

Thlaspi XV, 1. Hirtentäschel

hirtum — steifhäriges H.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut

officinalis — gebräuchliches L.

groenlandica — grönländisches L.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

spinosum — stachlichtes St.

halimifolium — immergrünes St.

saxatile — eigentliches St.

hyperboreum — amerikanisches St.

creticum — cretisches St.

vesicaria — Blasen St.

utriculatum — levantisches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

majus — großes D.

in botanischen Gärten.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

angustifolia — schmalblättriges D.

apula — apulisches D.

didyma — zweyköpfiges D.

Hesperis XV, 2. Nachtviole

tristis — traurige N.

africana — afrikanische N.

Brassica XV, 2. Kohl

Eruca — zahme Rauke.

Sinapis XV, 2. Senf

orientalis — morgenländischer S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

altissimum — höchste R.

strictissimum — senkrechte R.

Bunias XV, 2. Zackenschote, Meersenf

balearica — balearische Z.

Crambe XV, 2. Meerkohl

hispanica — spanischer M.

Cleome XV, 2. Cleome

violacea — violette Cl.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

chium — griechischer St.

malacoides — pappelantiger St.

tuberosum — knolliger St.

macrorrhizum — großwurzlichter St.

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

nodosum — knotiger St.

maculatum — gefleckter St.

bohemicum — böhmischer St.

prostratum — gestreckter St.

in botanischen Gärten.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosen P. gemeine Garten P.

ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve

caroliniana — carolinische M.

parviflora — kleinblumige M.

crispa — krausblätterige M.

moschata — Bisam M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

arborea — baumartige L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

claviculata — hakichter E.

vesicaria — blasichter E.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume

Senega — Klapperschlangenzur.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

juncum — binsenartiges Pfr.

monospermum — einsaamiges Pfr.

patens — ausgebreitetes Pfr.

radiatum — gestrahltes Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster

canariensis — canarischer G.

candicans — weißlicher G.

sagittalis — pfeilförmiger G.

tridentata — dreyzähliger G.

sibirica — sibirischer G.

florida — blühender G.

anglica — englischer G.

in botanischen Gärten.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote

incana — bestäubte Kl.

alba — weiße Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weiberkrieg

antiquorum — Hauhechel der Alten

repens — kriechende H.

Cherleri — Cherlerische H.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume

tetraphylla — vierblättrige W.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne

albus — weiße F.

varius — bunte F.

hirsutus — zottige F.

pilosus — haarichte F.

angustifolius — schmalblättrige F.

luteus — gelbe F.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse

Cicer — rothe Pl.

inconspicuus — kleinblumige Pl.

amphicarpos — unterirdische Pl.

angulatus — eckige Pl.

articulatus — gegliederte Pl.

tingitanus — Tangierische Pl.

clymenum — morgenländische Pl.

latifolius — breitblättrige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke

onobrychoides — esparcettenartige W.

nissoliana — nissolische W.

benghalensis — benghalische W.

in botanischen Gärten.

Vicia XVII, 3. Wicke

peregrina — fremde W.

narbonensis — narbonensische W.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen G.

nigricans — schwärzlicher G.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum

arborensens — baumartiger Bl.

orientalis — morgenländischer Bl.

humilis — niedriger Blasenstrauch.

Glycyrrhiza XVII, 3. Süßholz

echinata — stachlichtes S.

glabra — glattes S.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

Emerus — Scorpions Kr.

junceae — binsenartige Kr.

securidaca — beilkrautartige Kr.

cretica — cretische Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuß

compressus — zusammengedrückter V.

scorpioides — scorpionartiger V.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionkraut

vermiculata — wurmförmiges Sc.

muricata — zackiges Sc.

sulcata — gefurchtes Sc.

subvillosa — fast zottiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

canadense — canadischer H.

junceum — binsenartiger H.

in botanischen Gärten.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

violaceum — violetter H.

paniculatum — rispenförmiger H.

alpinum — Alpen H.

coronarium — Kronen H.

flexuosum — gebogener H.

caput galli — eigentlicher H.

crista galli — Hahnenkamm.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Phaca XVII, 3. Knollenkraut

alpina — Alpen Kn.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.

pilosus — haarichtes W.

galegiformis — geißrautenartiges W.

sulcatus — gefurchtes W.

uliginosus — Sumpf W.

hamosus — hakichtes W.

contortuplicatus — einwärtsgekrümmtes W.

baeticus — spanisches W.

sesameus — italienisches W.

pentaglottis — stachlichtes W.

epiglottis — luftröhrendeckelartiges W.

trimestris — ägyptisches W.

Tragacantha — wahrer Tragant.

Biserrula XVII, 3. Sägekraut

Pelecinus — gemeines S.

Psoralea XVII, 3. Psoralea, Harzklee

bituminosa — harzichte Ps.

in botanischen Gärten.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee

caerulea — blauer St. Siebengezeit

indica — ostindischer St.

italica — italienischer St.

cretica — cretischer St.

Trifolium XVII, 3. Klee

Lupinaster — sibirischer Kl.

hybridum — Bastard Kl.

incarnatum — röthlicher Kl.

ochroleucum — blasfgelber Kl.

stellatum — sternförmiger Kl.

clypeatum — schildförmiger Kl.

spumosum — Schaum Kl.

tomentosum — filziger Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

tetragonolobus — viereckiger Sch.

conjugatus — gepaarter Sch.

edulis — essbarer Sch.

peregrinus — fremder Sch.

ornithopodoides — vogelfußartiger Sch.

hirsutus — zottiger Sch.

rectus — gerader Sch.

cytisoides — cytissusartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

ruthenica — russische Tr.

platycarpus — sibirische Tr.

polycerata — vielhörnichte Tr.

spinosa — stachlichte Tr.

corniculata — gehörnte Tr.

monspeliaca — montPELLIERSche Tr.

in botanischen Gärten.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

striata — gestreifte Tr.

Foenum Graecum — Griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

radiata — gestrahlter Schn.

circinata — gekräuselter Schn.

falcata — gelber Sichelklee.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Harthen

Kalmianum — Kalmisches J.

calycinum — großkelchichtes J.

Ascyron — Peterswurz, großblumiges J.

pyramidatum — pyramidenförmiges J.

Androsaemum — beerentragendes J.

olympicum — olympisches J.

canariense — canarisches J.

hircinum — stinkendes J.

elatum — hohes J.

prolificum — sprossendes J.

canadense — canadisches J.

virginicum — virginisches J.

tomentosum — filzichtetes J.

monogynum — chinesisches J.

Geropogon XIX, 1. Graubart

glabrum — glatter Gr.

hirsutum — zottiger Gr.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

tingitana — tunitanische S.

picroides — bitterkrautartige S.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

in botanischen Gärten.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

tenerrimus — sehr zarte G.

Plumeri — Plumiers G.

floridanus — floridanische G.

sibiricus — sibirische G.

tuberosus — knollige G.

canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

sanctum — jüdisches H.

paniculatum — rispenförmiges H.

amplexicaule — herzförmiges H.

glutinosum — klebriges H.

pyrenaicum — pyrenäisches H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

aspera — rauher P.

rhagadioloides — rauchköpfiger P.

sibirica — sibirischer P.

pulchra — schöner P.

neglecta — versäumter P.

Andryala XIX, 1. Woll-distel

lanceolata — lanzettblättrige W.

integrifolia — ganzblättrige W.

cheiranthifolia — lackblättrige W.

lanata — wollichte W.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

lucida — glänzender Schw.

in botanischen Gärten.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

Zazinha — warzichter R.

stellata — sternförmiger R.

rhagadiolus — levantischer R.

Catananche XIX, 1. Zwangkraut

caerulea — blaues Zw.

lutea — gelbes Zw.

Scolymus XIX, 1. Golddistel

maculatus — gefleckte G.

hispanicus — spanische G.

Carduus XIX, 1. Distel

pycnocephalus — vielköpfige D.

argentatus — Silberdistel

parviflorus — kleinblumige D.

helenioides — alantartige D.

cernuus — nickende D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

syriacus — syrische Distel

ciliatus — gefranzte Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel

arabicum — arabische Kr.

acaule — stengellose Kr.

Cynara XIX, 1. Artischocke

humilis — niedrige A.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

pyrenaica — pyrenäische E.

Carthamus XIX, 1. Saflor

creticus — cretischer S.

in botanischen Gärten.

Carthamus XIX, 1. Saflor

caeruleus — blauer S.

Serratula XIX, 1. Scharte

coronata — Kranz Sch.

alpina — Alpen Sch.

Spilanthus XIX, 1. Fleckblume

Pseudo-Acmella — falsche Acmelle

Acmella — wahre Acmelle, A B C Kraut

oleraceus — kohlartige A.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

frondosa — belaubter Zw.

pilosa — haarichter Zw.

bipinnata — doppelt gefiederter Zw.

bullata — blasichter Zw.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz

saracenicæ — möhrische P

hastata — spöntonförmige P.

suaveolens — wohlriechende P.

atriplicifolia — meldenblättrige P.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorspflanze

sessilifolium — ungestielte E.

altissimum — sehr hohe E.

purpureum — purpurfarbige E.

maculatum — gefleckte E.

perfoliatum — durchbohrte E.

coelestinum — himmelblaue E.

aromaticum — gewürzhafte E.

urticaefolium — nesselblättrige E.

Ageratum XIX, 1. Ageratum

conyzoides — dürrwurmartiges Ag.

in botanischen Gärten.

Santolina XIX, 1. Heilige Pflanze

Chamae Cyparissias — gemeine heil. Pf.

rosmarinifolia — rosmarinblättrige heil. Pf.

Athanasia XIX, 1. Athanasie, Jüngling

maritima — Seestrands Ath.

crithmifolia — meerfenchelblättrige Ath.

annua — jährige Ath.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

sibiricum — sibirischer Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfuss

santonicum — Wurmsaame

annua — jähriger Beyfuss

integrifolia — ganzblättriger B.

Conyza XIX, 2. Dürrewurz, Flöhkraut

saxatilis — Stein D.

candida — weisse D.

bifrons — wohlriechende D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

viscosum — klebriges Fl.

bonariense — westindisches Fl.

aegyptiacum — ägyptisches Fl.

Gouani — Gouanys Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

aureum — goldfarbiges R.

orientale — ostindisches R.

rutilans — funkelndes R.

ignescens — feuriges R.

stoechas — Rheinblume, Sonnen-Goldblume

sanguineum — blutrothes R.

foetidum — stinkendes R.

in botanischen Gärten.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

undulatum — wellenförmiges R.

margaritaceum — perlartiges R.

plantaginifolium — wegerichblättriges R.

purpureum — purpurrothes R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume

annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

persicifolius — pfirsichblättriges Kr.

arabicus — arabisches Kr.

cernuus — nickendes Kr.

triflorus — dreyblumiges Kr.

lividus — bleyfarbiges Kr.

elegans — schönes Kr.

aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

tenellus — zarte St.

annuus — jährige St.

Solidago XIX, 2. Goldrute

canadensis — canadische G.

Inula XIX, 2. Alant

odora — wohlriechender A.

crithmifolia — meerfenchelblättriger A.

bifrons — geflügelter A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

monspeliense — montPELLIERSche G.

myconis — MYCONISCHE G.

in botanischen Gärten.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

bipinnatum — doppelt gefiederte G.

coronarium — kronenförmige G.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

Santolina — levantisches A.

tomentosa — filzichte G.

atrata — schwärzliche G.

Verbesina XIX, 2. Verbesine, Kelke

alata — geflügelte V.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge, Streichblume

spinosum — stachlichtes R.

aquaticum — Wasser R.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

verticillata — querlförmige C.

tenuifolia — schmalblättrige C.

leucantha — weißblumige C.

tripteris — dreifache C.

auriculata — geöhrt C.

lanceolata — lanzettblättrige C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

moschata — Bisam duftende Fl.

ambracea — Ambra duftende Fl.

pectinata — kammförmige Fl.

argentea — silberfarbige Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

sibirica — sibirische Fl.

sempervirens — immergrüne Fl.

splendens — glänzende Fl.

Rhapontica — unächte Rhabarber

romana — römische Fl.

sphaerocephala — rundköpfige Fl.

Isnardi — Isnards Fl.

napifolia — rübenblättrige Fl.

Calcitrapa — Sterndistel Fl.

melitensis — Maltheser Fl.

sicula — sicilianische Fl.

Centauroides — tausendgüldenkrautartige Fl.

verutum — spiefsartige Fl.

salmantica — salmantische Fl.

crocodilium — syrische Fl.

muricata — zackichte Fl.

Baltimora XIX, 4. Baltimore

erecta — aufrechtstehende B.

Silphium XIX, 4. Silphie

perfoliatum — durchwachsene S.

connatum — verwachsene S.

trifoliatum — dreyblättrige S.

trilobatum — dreylappichte S.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

pluvialis — Kapische R.

hybrida — Bastard R.

stellata — sternförmige R.

tomentosa — filzichte R.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr

calendulacea — ringelblumenartiges B.

in botanischen Gärten.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr
 trifida — dreyspaltiges B.
 laciniata — zerschlissenes B.
 aspera — rauhes B.
 paleacea — spreuiges B.

Echinops XIX, 5. Kugeldistel
 ritro — glattblätterige K.
 tenuifolius — zartblätterige K.

Lobelia XIX, 6. Lobelie
 comosa — zopfige L.
 cardinalis — Cardinalsblume
 inflata — aufgeblasene L.
 Erinus — langgestielte L.
 pubescens — weichhaarichte L.

Aristolochia XX, 2. Osterlucey
 arborescens — baumartige O.
 sempervirens — immergrüne O.
 serpentaria — Schlangenwurzel
 longa — lange O.
 rotunda — runde O.

Arum XX, 3. Aron, Zehrwurz
 Dracunculus — großer vielblättriger A.
 Dracontium — kleiner vielblättriger A.
 triphyllum — dreyblättriger A.

Urtica XXI, 4. Nessel
 pilulifera — pillentragende N.
 balearica — balearische N.
 cannabina — Hanf N.
 canadensis — canadische N.
 nivea — schneeweiße N.

in botanischen Gärten.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette
orientale — morgenländische Sp.
spinosum — stachlichte Sp.

Ambrosia XXI, 5. Götterkraut
trifida — dreispaltiges G.
maritima — Seestrands A.

Parthenium XXI, 5. Parthenie, Meydblume
Hysterophorus — vielspaltige P.
integrifolium — ganzblättrige P.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
polygonoides — kleinblättriger A.
sanguineus — blutrother A.

Theligonum XXI, 7. Hundskohl
Cynocrambe — gemeiner H.

Dioscorea XXII, 5. Dioscoride
villosa — zottige D.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
ambigua — zweifelhaftes B.

Menispermum XXII, 9. Mondsamen
canadense — canadischer M.
virginicum — virginischer M.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz
album — weisse N.

Andropogon XXIII, 1. Bartgras, Flockgras
contortum — gedrehtes B.

Gryllus — grillenförmiges, purpurrothes B.

distachyon — zweyjähriges B.

hirtum — rauchähriges B.

Ischaemum — deutsches B.

in botanischen Gärten.

Chloris XXIII, 1. Chloris

radiata — gestrahlte Chl.

barbata — bärtige Chl.

petraea — Stein Chl.

Holcus XXIII, 1. Honiggras

halepensis — halepensisches H.

bicolor — zweyfarbiges H.

saccharatus — Zucker H.

Cenchrus XXIII, 1. Klebgras, Stachelgras

echinatus — hakichtes Kl.

capitatus — kopfförmiges Kl.

ciliaris — gefranztes Kl.

Aegilops XXIII, 1. Walch, Twalch

ovata — eyrunder W.

geniculata — knieförmiger W.

triuncialis — rauher W.

caudata — geschwänzter W.

squarrosa — sparrichter W.

Atriplex XXIII, 1. Melde

sibirica — sibirische M.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

serpillifolia — quendelblättriger E.

Chamaedrys — gamanderartiger E.

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

hederifolia — ephenblättriger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras

odoratum — wahres R.

allenthalben.

Valeriana III, 1. Baldrian
officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras
viride — grünes H.

Poa III, 2. Rispengras
annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundegras
glomerata — gemeines Kn.

Bromus III, 2. Tresp
inermis — Quecken Tr.
sterilis — tauber Tr.
tectorum — Dach Tr.

Lolium III, 2. Lolch
perenne — ausdauernder L.

Hordeum III, 2. Gerste
murinum — Mäuse G.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
arvensis — Acker S.

Plantago IV, 1. Wegerich
major — großer W.
media — mittlerer W.
lanceolata — spitzer W. Hundsribbe

Sagina IV, 3. Mastkraut, Vierling
procumbens — darniederliegendes M.

Lycopsis V, 1. Krummhals
arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
vulgare — gemeiner O. stolzer Heinrich.

Campanula V, 1. Glocken
rotundifolia — rundblättrige Gl.

allenthalben.

Campanula V, 1. Glocken
 patula — weitblumige Gl.
 rapunculus — Rapunzel, Glockenblume.

Solanum V, 1. Nachtschatten
 nigrum — schwarzer N.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
 rubrum — rother G.
 murale — Mauer G.

Daucus V, 2. Möhren
 Carota — gemeine M.

Heracleum V, 2. Heilkraut, unächte Bärenklau
 Sphondylium — gemeine Bärenklau.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
 sylvestre — wilder K.
 bulbosum — knolliger K.
 temulentum — berauschender K.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume
 Armeria — nelkenartiges W.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze
 biennis — zweyjährige N. Rhapontica.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
 persicaria — Pflersichkraut, Rottig
 aviculare — gemeiner W.

Cerastium X, 4. Hornkraut
 vulgatum — gemeines H.
 viscosum — klebriges H.
 arvense — Acker H.

Spergula X, 4. Spark
 arvensis — Acker Sp.

allenthalben.

- Rubus** XII, 5. Brommbeere, Himbeere
 caesius — Bocksbeere, blaue Kratzbeere
 fruticosus — gemeine Brommbeere.
- Potentilla** XII, 5. Fünffingerkraut
 anserina — Gänserich.
- Tormentilla** XII, 5. Tormentille
 erecta — aufrechte T.
- Geum** XII, 5. Geum, Benediktenkraut
 urbanum — gemeines B.
- Chelidonium** XIII, 1. Schöllkraut
 majus — großes Sch.
- Ranunculus** XIII, 6. Hahnenfuß
 ficaria — Feigwarzenkraut.
- Prunella** XIV, 2. Brunelle, Braunheil
 vulgaris — gemeine Br.
- Thlaspi** XV, 1. Täschelkraut
 Bursa Pastoris — Hirtentäschel.
- Alyssum** XV, 1. Steinkraut
 incanum — bestäubtes St.
 calycinum — deutsches St.
- Erysimum** XV, 2. Hederich
 officinale — gewöhnlicher H.
 Barbarea — Barbenkraut
 cheiranthoides — levkojenartiger H.
- Geranium** XVI, 1. Storchschnabel
 cicutarium — schierlingsblättriger St.
- Trifolium Melilotus** XVII, 3. Steinklee
 officinale — gebräuchlicher St.
- Trifolium** XVII, 3. Klee
 repens — kriechender Kl. weißer Wiesen Kl.

allenthalben.

Trifolium XVII, 3. Klee
 pratense — spanischer Kl.
 arvense — Katzen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
 perforatum — gemeines J.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel
 oleraceus — gemüsartige G.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn
 Taraxacum — gemeiner L.

Apargia XIX, 1. Apargie
 hastilis — spontonförmige A.
 hispida — borstige A.
 hirta — rauchhärichte A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
 Intybus — wilde W. Hindläufte

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
 vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maßliebe
 perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
 Ptarmica — deutscher Bertram

Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
 Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel
 urens — Brennnessel, Eiter N.
 dioica — große Br.

Holcus XIII, 1. Honiggras
 lanatus — wollichtes H.

24) In Lustwäldern und Alleén.

Cephalanthus IV, 1. Knopfbaum
occidentalis — abendländischer Kn.

Elaeagnus IV, 1. Oleaster
angustifolius — Böhmischer Ölbaum.

Lycium V, 1. Bocksborn
Barbarum — Chinesischer B.
Europaeum — Europäischer B.
Afrum — Afrikanischer B.

Celastrus V, 1. Celaster
bullatus — blasichter C.

Rhus V, 3. Sumach, Färberbaum
Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum
radicans — wurzelnder Sumach
carolinianum — carolinischer S.
canadense — canadischer S.

Tamarix V, 3. Tamarisken
gallica — französische T.
germanica — deutsche T.

Aesculus VII, 1. Rosskastanie
Pavia — Carolinische R.

Rubus XII, 5. Brommbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum
arborescens — baumartiger Bl.
orientalis — morgenländischer Bl.
humilis — niedriger Bl.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
aphylla — blattloser E.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Salvia II, 1. Salbey

verticillata — wirtelförmige S.

Phleum III, 2. Lischgras, Timotheusgras

alpinum — Alpen L.

Triticum III, 2. Weizen

tenellum — zarter W.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

alpina — Alpen Sc.

graminifolia — grasblättrige Sc.

Galium IV, 1. Labkraut

saxatile — Stein L.

Alchemilla IV, 2. Sinau

alpina — Alpen S.

pentaphylla — fünfblättriger S.

Onosma V, 1. Lotwurz, Schminkwurz

echioides — natterkopffartige Sch.

Androsace V, 1. Androsace, Mannsharnisch

villosa — haarige A.

lactea — milchweisse A.

Verbascum V, 1. Königskerze

phlomidoides — phlomisartige K.

Myconi — Myconische K.

Thesium V, 1. Leinblatt, Flachskraut

alpinum — Alpen L.

Gentiana V, 2. Enzian

lutea — gelber E.

punctata — gedüpfelter E.

asclepiadea — schwalbenwurzblättriger E.

pumila — Zwerg E.

Astrantia V, 2. Astrantie

major — größere A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Astrantia V, 2. Astrantie
minor — kleinere A.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.

Athamanta V, 2. Hirschwurz
Libanctis — Hirschheilwurz
cretensis — cretische H.

Laserpitium V, 2. Laserkraut
trilobum — dreylappiges L.
gallicum — französisches L.
siler — Roskümmel.

Heracleum V, 2. Heilkraut, falsche Bärenklau
austriacum — österreichisches H.

Ligusticum V, 2. Liebstöckel
austriacum — österreichischer L.

Angelica V, 2. Angelik, Engelwurz
verticillaris — wirtelförmige E.

Scandix V, 2. Kerbel
odorata — wohlriechender K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
hirsutum — zottiger K.

Rhus V, 3. Sumach
Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum.

Linum V, 5. Lein
alpinum — Alpen L.

Allium VI, 1. Lauch
viclorialis — Allermannsharnisch
Moly — gelbblühender L.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut
serotinum — spätblühendes Sp.

Liliago — astloses Sp.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Juncus VI, 1. Binsen

spicatus — ährenförmige B.

Rumex VI, 3. Ampfer

digynus — unvollständiger A.

alpinus — Alpen A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

alpinum — Alpen W.

Moehringia VIII, 2. Möhringie

muscosa — moosartige M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

divaricatum — auseinandergesperrter W.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum

alpina — Alpen E.

Saxifraga X, 2. Steinbrech

caesia — bläulicher St.

sedoides — mauerpfefferartiger St.

bryoides — moosartiger St.

stellaris — sternförmiger St.

hirsuta — zottiger St.

Geum — nierenförmiger St.

cuneifolia — keilförmiger St.

oppositifolia — heidenförmiger St.

aspera — rauher St.

aizoides — immergrüner St.

rotundifolia — rundblättriger St.

petraea — Felsen St.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

Ocymoides — rundblättriges S.

lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke

caryophyllus — gemeine Garten N.

- auf Alpen und hohen Gebirgen.
Cucubalus X, 3. Cucubalus
 pumilo — Zwerg C.
Silene X, 3. Leimkraut
 rupestris — Felsen L.
 acaulis — Zwerg L.
Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
 dichotoma — zweytheiliger M.
Arenaria X, 3. Sandkraut
 tetraquetra — vierseitiges S.
 laricifolia — lerchenbaumblättriges S.
 striata — gestreiftes S.
Sedum X, 4. Zumpenkraut, fette Henne
 Anacampseros — Wundkraut
 stellatum — sternförmiges Z.
 rupestre — Felsen Z.
 atratum — geschwärztes Z.
Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
 quadridentata — vierzählige L.
Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
 globiferum — kugeltragendes H.
 arachnoideum — spinnenwebenartiges H.
 hirtum — rauches H.
 montanum — Berg H.
Rosa XII, 5. Rose
 alpina — Alpen R.
Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
 caulescens — vielblumiges F.
Geum XII, 5. Geum, Benediktenkraut
 montanum — Berg B.
 reptans — kriechendes B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut

Glaucium — eisengraues Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn

alpinum — Alpen M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

fumana — heidenartige C.

canus — graue C.

oelandicus — öländische C.

serpyllifolius — quendelblätterige C.

apenninus — apenninische C.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn

elatum — hoher R.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut

pyrenaicum — pyrenäischer St.

Cammarum — giftiger St.

variegatum — gefleckter E.

Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Aquilegia XIII, 5. Akeley

alpina — Alpen A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume

alpina — Alpen A.

narcissifolia — narcissenartige A.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

integrifolia — ganzblätterige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

aconitifolius — eisenhutartiger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

chamaedrys — edler G.

lucidum — glänzender G.

montanum — Berg G.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Teucrium XIV, 1. Gamander
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
montana — Berg Gl.
scordioides — gezahntes staudiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
Orvala — Orvelkraut.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Stachys XIV, 1. Andorn
alpina — Alpen A.

Marrubium XIV, 1. Andorn, weißer Dorant
peregrinum — fremder A.
supinum — liegender A.

Thymus XIV, 1. Thymian
alpinus — Alpen Th.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.
grandiflora — großblumige M.
Calamintha — Kalaminte, Berg M.
nepeta — poleyartige M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
alpina — Alpen Sch.
lupulina — Hopfen Sch.

Bartsia XIV, 2. Bartsche
alpina — Alpen B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

lutea — gelber A.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

verticillata — wirtelförmiges L.

recutita — beschnittenes L.

incarnata — incarnatrothes L.

tuberosa — dickwurzlichtes L.

flammea — feuerrothes L.

foliosa — blätteriges L.

acaulis — stengelloses L.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

alpinum — Alpen L.

genistaefolium — ginsterblätteriges L.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

rotundifolia — rundblätterige Schl.

Lepidium XV, 1. Kresse

alpinum — Alpen Kr.

latifolium — breitblätterige Kr.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

spinosum — stachlichtes St.

saxatile — eigentliches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

apula — apulisches D.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

alpina — Alpen G.

bellidifolia — maßliebenblätteriges G.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut

bellidifolia — maßliebenblätteriges Sch.

resedifolia — resendenblätteriges Sch.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

argenteum — silberfarbiger St.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume

montana — Berg W.

Orobus XVII, 3. Erven, Fasankraut

pyrenaicus — pyrenäische E.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

coronata — gekrönte Kr.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen

comosa — zopfichtes H.

Phaca XVII, 3. Knollenkraut

alpina — Alpen Kn.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut

alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.

pilosus — haarichtes W.

alpinus — Alpen W.

montanus — Berg W.

uralensis — wollichtes W.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpinum — Alpen Kl.

alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

alpinum — Alpen H.

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

villosum — zottiges H.

helveticum — schweizerisches H.

saxatile — Stein H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

alpina — Alpen P.

sibirica — sibirischer P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

maculata — geflecktes F.

Arctium XIX, 1. Klette

personata — Alpen Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

Erisithales — klebriges Kr.

pygmaeus — Zwerg Kr.

spinosissimus — stachlichtes Kr.

mollis — weiches Kr.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

pyrenaica — pyrenäische E.

Serratula XIX, 1. Scharte

alpina — Alpen Sch.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz

alpina — Alpen P.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

glacialis — Eis - Beyfuß

rupestris — Felsen - Beyfuß

annua — jähriger Beyfuß

Conyza XIX, 2. Dürrwurz

saxatile — Stein D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

alpinum — Alpen Fl.

uniflorum — einblumiges Fl.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
gramineum — grasartiges Fl.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
alpina — Alpen H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
alpinum — Alpen R.
supinum — rückwärtsliegendes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
incanus — bestäubtes Kr.
alpinus — Alpen Kr.

Doronicum — einblumiges Alpen Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
alpinus — Alpen St.

Solidago XIX, 2. Goldrute
canadensis — canadische G.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
integrifolia — ganzblättrige A.

Inula XIX, 2. Alant
montana — Berg A.

bifrons — geflügelter A.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz
Pardalianches — gemeine G.

Bellidiastrum — maßliebartige G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

atratum — geschwärzte W.

alpinum — Alpen W.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

montanum — Berg W.

corymbosum — flachblumenstraufsartige W.

coronarium — kronenförmige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille

alpina — Alpen Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

atrata — schwärzliche G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

salicifolium — weidenblättriges R.

grandiflorum — großblumiges R.

Centaurea XIX, 5. Flockenblume

alpina — Alpen Fl.

Centaureum — großes Tausendgüldenkraut

nigra — schwarze Fl.

montana — Berg Fl.

alba — weisse Fl.

Rhapontica — gemeine Rhapontik.

Filago XIX, 4. Filzkraut

gallica — französisches F.

Leontopodium — Alpen F.

Viola XIX, 6. Veilchen

grandiflora — großblumiges V.

calcarata — gesporntes V.

cornuta — gehörntes V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

globosa — kugelförmiges Kn.

pyramidalis — pyramidenförmiges Kn.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Satyrion XX, 1. Stendel

nigrum — schwarzer St.

albidum — weißlicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

alpina — Alpen R.

andropophora — menschenähnliche R.

Carex XXI, 3 Riedgras

mucronata — steifgespitztes R.

firma — steifes R.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz

album — weisse N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachs aussauger, Teufelszwirn

Europaea — Europäischer Fl. Seide

(Diese Pflanze, welche aus einem Büschel langer röthlicher Fäden besteht, keimt zwar aus ihrem Saamen aus der Erde hervor, windet sich aber mit ihren Fasern ohne Blätter an andern Pflanzen, welche sie erreichen kann, besonders gern an Flachs und Dotter in die Höhe, und zieht nun zum Nachtheil jener ihre Nahrung daraus.)

Epithymum — Thymseide, kleine Seide

(Ein dem vorigen ganz ähnliches Gewächs, nur noch zarter; es liebt besonders den Thymian (*Thymus Serpillum*), Sophienkraut (*Sisymbrium Sophia*) und ähnliche, und zieht ihre Nahrung daraus.)

Schmarozerpflanzen.

Monotropa X, 1. Fichtenbaumwurzelsauger
Hypopithys — gemeiner F.

(Diese Pflanze treibt einen spannenhohen Stengel ohne Blätter, und nur mit Schuppen besetzt, wächst besonders gern an den Wurzeln großer Bäume, vorzüglich in Nadelhölzern.)

Orobanche XIV, 2, Sommerwurz
major — große S.

(Auf Äckern, Wiesen, bergigen Wäldern auf den Wurzeln anderer Gewächse, besonders der Bäume und Sträucher.)

AUGUST.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
maritima — Meerstrands E.

Scirpus III, 1. Binsengras
mucronatus — steifgespitztes B.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
maritimum — Seestrands G.

Salsola V, 2. Salzkraut
Kali — rauchblätteriges S.
Tragus — glattblätteriges S.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Seestrands M.

Rumex VI, 3. Ampfer
maritimus — Seestrands A.

Artemisia XIX, 2. Beyfuß - Wermuth
maritima — Seestrands B.

2) Im Wasser.

Utricularia II, 1. Wasserschlauch
 vulgaris — gemeiner W.
 minor — kleiner W.

Scirpus III, 1. Binsengras
 mucronatus — steifgespitztes B.
 maritimus — Ufer B.

Phalaris III, 2. Glanzgras
 orizoides — reifsartiges Gl.

Poa III, 2. Rispengras
 palustris — Sumpf R.

Festuca III, 2. Schwingel
 fluitans — Schwaden S. Schwaden-Grütze.

Galium IV, 1. Labkraut
 palustre — Sumpf L.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
 gramineum — grasartiges S.

Menyanthes V, 1. Zottenblume
 nymphoides — seerosenartige Z.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
 vulgaris — gemeine L.

Sium V, 2. Merk, Eppich
 latifolium — breitblättriger M.
 angustifolium — schmalblättriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich
 virosa — giftiger W.

Alisma VI, 4. Wasserwegerich
 Plantago aquatica — gemeiner W.
 natans — schwimmender W.
 ranunculoides — hahnenfußartiger W.

im Wasser.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechsel W.

Butomus IX, 3. Wasserviole
umbellatus — doldenförmige W.

Naias XXI, 6. Najade
minor — kleine N.

Myriophyllum XXI, 7. Federkraut
verticillatum — wirtelförmiges F.

Hydrochaeris XXII, 7. Froschbiss
Morsus Ranae — gemeiner Fr.

3) Am Wasser.

Lycopus II, 1. Wolfsfuß
Europaeus — Europäischer W.

Scirpus III, 1. Binsengras
sylvaticus — Wald B.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.

Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Seestrands M.

Sium V, 2. Merk, Eppich
latifolium — breitblättriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

am Wasser.

Corrigiola V, 3. Uferlingenkraut, Knotenkraut
littoralis — gemeines Uf. braun Kn.

Juncus VI, 1. Binsen

articulatus aquaticus — gegliederte Wasser B.

Rumex VI, 3. Ampfer

nemolapathum — kleine Grindwurz

maritimus — Seestrands A.

acutus — spitzblättriger A.

obtusifolius — stumpfblättriger A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

hirsutum — zottiger, großblumiger W.

pubescens — weichwollichter W.

tetragonum — viereckiger W.

palustre — Sumpf W.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt

amphibium — Wechsel W.

Hydropiper — Wasserpfeffer.

Cerastium X, 4. Hornkraut

aquaticum — Wasser H.

Lythrum XI, 1. Lythrum, Weiderich

salicaria — Purpur W. Blutkraut

hyssopifolia — ysopblättriger W.

Spiraea XII, 4. Spierstaude

Ulmaria — Johanniswedel.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß

flammula — kleiner H. Egelkraut.

lingua — großer langblättriger H.

Mentha XIV, 1. Münze

sylvestris — wilde M.

am Wasser.

Mentha XIV, 1. Münze

aquatica — Wasser M.

gentilis — Balsam M.

arvensis — Acker M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut

galericulata — gemeines Sch.

hastifolia — spontonblättriges Sch.

minor — kleines Sch.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze

aquatica — gewöhnliche S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

sylvestre — wilde R.

amphibium — Wechsel R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

palustre — Sumpf St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

uliginosus — Sumpf Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

quadrangulare — viereckiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

maritimus — Seestrands G.

palustris — Sumpf G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

oleraceus — kohlartiges Kr.

palustris — Sumpf-Kratzdistel

tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

tripartita — dreytheiliger Zw.

am Wasser.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

minima — kleinster Zw.

cernua — nickender Zw.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorpflanze

cannabinum — Wasserhanf.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

nudum — nackendes Sumpf R.

tomentosum — filzichtiges R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

aquaticus — Wasser Kr.

Inula XIX, 2. Alant

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Spr.

Atriplex XXIII, 1. Melde

tatarica — tatarische M.

hastata — spontonblättrige M.

4) An Salzquellen.

Salicornia I, 1. Glasschmalz

herbacea — krautartiger G.

Plantago IV, 1. Wegerich

maritima — Meerstrands W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

maritimum — Seestrands G.

Lactuca XIX, 1. Salat

saligna — weidenblättriger S.

Aster XIX, 2. Sternblume

Tripolium — Salz St.

5) An quelllichten Orten.

Samolus V, 1. Samoskraut

Valerandi — rundblättrige Wasserpimpinelle.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Schoenus III, 1. Knopfgras

Mariscus — stachlicht. Kn. deutscher Galgant
albus — weißes Kn.

Arundo III, 2. Schilf, Rohr

Calamagrostis — Wiesenschilf, Rohrgras.

Drosera V, 6. Sonnentau

rotundifolia — rundblättriger S.

longifolia — langblättriger S.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Cyperus III, 1. Cypergras

flavescens — gelbliches C.

fuscus — schwarzbraunes C.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Wiesen-
knopf

officinalis — gewöhnliches S. Blutströpfchen.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides palustris — Sumpf V.

Gentiana V, 2. Enzian

Pnevmonanthe — Lungenblume.

Hydrocotyle V, 2. Wassernabel

vulgare — gemeiner W.

Parnassia V, 4. Parnasserkraut

palustris — Sumpf P.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Linum V, 5. Lein

catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis

portula — Europäische P.

Rumex VI, 3. Ampfer

nemolapathum — kleine Grindwurz.

Spergula X, 4. Spark

nodosa — knotiger Sp.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

flavum — gelbe W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze

sylvestris — wilde M.

sativa — zahme M.

Pulegium — Poley.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

Sceptrum Carolinum — Karls Scepter.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

chaerophyllum — kerbelblättriger St.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

quadrangulare — viereckiges J.

elodes — haarichtes J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

palustris — Sumpf G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

oleraceus — kohlartiges Kr.

palustris — Sumpf Kr.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

tripartita — dreytheiliger Zw.

minima — kleinster Zw.

cernua — nickender Zw.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

aquaticus — Wasser Kr.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze

palustris — Sumpf A.

Inula XIX, 2. Alant

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

salicina — weidenblätteriger A.

Arnica XIX, 2. Wolverley

montana — Berg W.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und
Grasplätzen.

Gratiola II, 1. Gnadenkraut

officinalis — gebräuchliches Gn.

Festuca III, 2. Schwingel

elatior — Französisch Raygras.

Triticum III, 2. Weizen

juncum — binsenartiger W.

Globularia IV, 1. Kugelblume

vulgaris — gemeine K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

succisa — Abbis S. Teufels Abbis

ochroleuca — gelbliche S.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Wiesenknopf

officinalis — gewöhnl. Sp. Blutströpfchen.

Campanula V, 1. Glocken

glomerata — knaulartige Gl.

Gentiana V, 2. Enzian

Centaureum — Tausendgüldenkraut

amarella — bitterer E.

Laserpitium V, 2. Laserkraut

Pruthenicum — preussisches L.

Allium VI, 1. Lauch

senescens — narcissenblättriger L.

Dianthus X, 2. Nelke

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

angustifolium — schmalblättrige W.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

officinalis — gebräuchlicher A.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume

cristatum — kammartiger K.

pratense — Wiesen K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

sanguineum — blutiger St.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Trifolium XVII, 3. Klee

hybridum — Bastard Kl.

fragiferum — Erdbeer Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

arvensis — Acker Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

hieracioides — habichtkrautartiges B.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen

praemorsum — abgebissenes H.

umbellatum — doldenförmiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

biennis — zweyjähriger P.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

acaulis — stengellose Distel.

Serratula XIX, 1. Scharte

tinctoria — Färber Sch.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobs Kr.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — wahrer A.

britannica — großbritannischer A.

dysenterica — Ruhr A.

pulicaria — Flöh A.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

inodorum — geruchlose G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — grofse wilde Scabiose.

9) Auf Sandboden.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

Helianthemum — gemeiner Sonnen - Günsel.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Chamaepithys — Schlagkraut, Feldcypresse.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

Ladanum — schmalblättriger H.

Orobancha XIV, 2. Sommerwurz

ramosa — ästige S.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen.

Filago XIX, 4. Filzkraut

Germanica — deutsches F.

pyramidata — pyramidenförmiges F.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Asperula IV, 1. Waldmeister
cynanchica — Bräunewurzel.

Verbascum V, 1. Königskerze
thapsus — wollichte K.
thapsoides — wollkrautartige K.
phlomoides — phlomisartige K.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Vincetoxicum — gemeine Schwalbenwurz.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
falcatum — sichelförmiges H.

Athamanta V, 2. Hirschwurz
Cervaria — gemeine H.

Oreoselinum — Bergpetersilie.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
annuum — jähriger S.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblättriger W.
montanum — Berg W.

Dianthus X, 2. Nelke
deltoides — deltaförmige N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeines H.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
Ladanum — schmalblättriger H.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.
Stachys XIV, 1. Stachys, Andorn

germanica — großer Feld A.

recta — gerader Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian

Serpillum — Feldkümmel

Acinos — basilienblättriger Th.

Alyssum XV, 1. Steinkraut

saxatile — eigentliches St.

montanum — Berg St.

Erysimum XV, 2. Hederich

repandum — geschweiffter H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

erysimoides — hederichartige L.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster

tinctoria — färbender G.

germanica — deutscher G.

Vicia XVII, 3. Wicke

pisiformis — erbsenartige W.

sylvatica — Wald W.

Trifolium XVII, 3. Klee

strictum — starrender Kl.

ochroleucum — blasgelber Kl.

alpestre — rother Berg Kl.

montanum — Berg Kl.

aureum — goldfarbiger Kl.

filiforme — fadenförmiger Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere

graminifolia — grasartige S.

Lactuca XIX, 1. Salat

quercina — eichenblättriger S.

scariola — wilder S.

perennis — ausdauernder S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

praemorsum — abgebissenes H.

porrifolium — lauchblättriges H.

chondrilloides — chondrillenartiges H.

saxatile — Stein H.

Carduus XIX, 1. Distel

defloratus — Berg D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

acaulis — stengellose Distel.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

acaulis — stengellose E.

vulgaris — gemeine E.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume

Linosyris — leinblättriges G.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

maritima — Seestrands B.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

acre — scharfes Fl.

Aster XIX, 2. Sternblume

Amellus — Virgils St.

annuus — jährige St.

Inula XIX, 2. Alant

hirta — steifhaarichter A.

montana — Berg A.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz

Pardalianches — gemeine G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

corymbosum — flachblumenstraufsartige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille

tinctoria — Färber Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle G.

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

salicifolium — weidenblättriges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

phrygia — phrygische Fl.

nigra — schwarze Fl.

montana — Berg Fl.

scabiosa — große wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

montana — Berg F.

Jasione XIX, 6. Jasione, Schafblume

montana — Berg J.

Serapias XX, 1. Zimbel

latifolia — breitblättrige Z.

rubra — rothe Z.

11) Auf gebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras

miliaceum — gemeines Haushaltungs H.

Hordeum III, 2. Gerste

vulgare — gemeine vierzeilige G.

auf gebauten Äckern.

Hordeum III, 2. Gerste

hexastichon — sechszeilige G.

distichon — zweyzeilige G.

Zeocrita — Reifsgerste.

Dipsacus IV, 1. Karten

sativus — zahme Weber K.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — türkischer, Bauern T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

tuberosum — gemeine Erdbirn, Kartoffeln.

Beta V, 2. Mangold

vulgaris — gemeiner M. rothe Rüben

cicla — weißer M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

fagopyrus — gemeiner Buchweizen.

Brassica XV, 2. Kohl

Napus sativa — Rübsaamen, Rübsen

Rapa — gemeine weiße Rübe.

Vicia XVII, 3. Wicke

sativa — gemeine Futter W.

biennis — zweyjährige W.

faba — Buffbohne, Saubohne.

Ervum XVII, 3. Linse

Lens — gemeine L.

Cannabis XXII, 4. Hanf

sativa — gemeiner H.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta olitoria — Feld B. Rapunzel

auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian

locusta dentata — gezahnter Acker B.

Panicum III, 2. Hirsegras

glaucum — graues H.

Sherardia IV, 1. Sherardie

arvensis — Acker Sh.

Galium IV, 1. Labkraut

rubrum — rothes L.

Centunculus IV, 1. Centunkel

minimus — kleinster C.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht

scorpioides arvensis — Acker M.

Anagallis V, 1. Gauchheil

arvensis — Acker G.

caerulea — blauer G.

Convolvulus V, 1. Winde

arvensis — Acker W.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume

verticillatum — wirtelförmige Kn.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

album — weißer G.

viride — grüner G.

hybridum — unächter G.

polyspermum — vielsaamiger G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel

grandiflora — großblumiger Kl.

daucoides — möhrenartiger Kl.

leptophylla — kleinblättriger Kl.

auf ungebauten Äckern.

Linum V, 5. Lein

Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch

oleraceum — Gemüs L.

ascalonium — Schalottenzwiebel.

Scleranthus X, 2. Knauel

annuus — jähriger Kn.

perennis — ausdauernder Kn.

Gypsophila X, 2. Gypskraut

muralis — Mauer G.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Mentha XIV, 1. Münze

arvensis — Acker M.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

purpureum — rother B.

amplexicaule — ungestielter B.

Stachys XIV, 1. Andorn

annua — jähriger A.

arvensis — kleiner Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian

Acinos — basilienblättriger Th.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleisch-
blume

arvense — Acker Fl.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Orontium — Orant, wildes L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut

campestre — Feld T.

auf ungebauten Äckern.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

hirsutum — zottige L.

monanthus — einblumige L.

Trifolium XVII, 3. Klee

agrarium — gelber Acker Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

humifusum — gestrecktes J.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

arvensis — Acker G.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

minima — kleinster Schw.

Serratula XIX, 1. Scharte

arvensis — Acker Sch.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

acre — scharfes Fl.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Chamomilla — gemeine Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — wilde Hunds Ch.

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle Garben.

auf ungebauten Äckern.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — groſſe wilde Scabiose.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
arvensis — Acker R.

Filago XIX, 4. Filzkraut
germanica — deutsches F.
arvensis — Acker F.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbiges V.
arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Anagallis V, 1. Gauchheil
arvensis — gemeiner rother G.
caerulea — blauer G.

Campanula V, 1. Glocken
Speculum Veneris — Frauenspiegel
hybrida — Bastard Gl. unächter Frauensp.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
rotundifolium — rundblätter. H. Durchwachs.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
latifolia — breitblätteriger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblätterige W.

Nigella XIII, 5. Schwarzkümmel
arvensis — Acker-Nigelle.

im Getreide.

Adonis XIII, 6. *Adonis*

autumnalis — Herbst A.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

Odontites — rother A. Zahntrost.

Raphanus XV, 2. Rettig

Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich,

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern

Aphaca — blattlose Pl.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel

arvensis — Acker G.

asper — rauhe G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

minima — kleinster Schw.

Serratula XIX, 1. Scharte

arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-

cherblume

segetum — Getreide W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Chamomilla — gebräuchliche Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — wilde Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Cyanus — gemeine Kornblume.

14) In größern und dichten Wäldern.

Salvia II, 1. Salbey

nemorosa — Wald S.

in größern u. dichten Wäldern.

Bromus III, 2. Tresp

giganteus — hoher Wald Tr. Futter Tr.

Galium IV, 1. Labkraut

Rubioides — rötheartiges L.

Campanula V, 1. Glocken

cervicaria — größtes Halskraut.

Atropa V, 1. Tollkraut

Bella donna — gemeines T. Wolfskirsche.

Juncus VI, 1. Binsen

articulatus sylvestris — gegliederte Wald B.

uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

angustifolium — schmalblättriger W.

latifolium — breitblättriger W.

montanum — Berg W.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub

Telephium — gemeine fette H.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Loeselii — Lösels R.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

hirsuta — zottiger E.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

sabaudum — savoisches H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

sylvaticus — Wald Kr.

in größern u. dichten Wäldern.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

Jacobaea — Jakobs Kr.

saracenicus — saracenisches Kr.

Impatiens XIX, 6. Springsaame

noli tangere — gemeiner Spr.

Satyrium XX, 1. Stendel

repens — kriechender St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz

spiralis — spiralförmige R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Scirpus III, 1. Binsengras

sylvaticus — Ufer B.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

columbaria — Tauben Sc.

Lysimachia V, 1. Lysimachie

vulgaris — gemeine L.

Campanula V, 1. Glocken

pyramidalis — pyramidenförmige Gl.

Epilobium VIII, 1. Weiderich

montanum — Berg W.

Dianthus X, 2. Nelke

superbus — stolze N. staudige Feder N.

Clematis XIII, 6. Waldrebe

vitalba — gemeine W.

flammula — brennende W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute

minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander

scorodonia — salbeyblättriger G.

in lichten Laubholzwäldern,

Mentha XIV, 1. Münze
viridis — grüne M.

Origanum XIV, 1. Dosten
vulgare — gemeine D.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
sanguineum — blutiger St.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arnica XIX, 2. Wolderley
montana — Berg W.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
sylvatica — Wald Sc.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.
Otites — Ohrlöffleinkraut.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
hieracioides — habichtkrautartiges B.

in Feldebüschchen u. Gesträuchen.

Atriplex XXIII, 1. Melde
tatarica — tatarische M.

17) An Hecken und Zäunen.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

Galium IV, 1. Labkraut
Aparine — Klebkraut.

Convolvulus V, 1. Winde
sepium — Zaun W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
Bonus Henricus — guter Heinrich.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
daucoides — möhrenartiger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Aethusa V, 2. Gleisse
Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
convolvulus — Buchwinde
dumetorum — Vogelzunge.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchlicher O.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — Katzen Münze.

an Hecken und Zäunen.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel

maculatum — gefleckter B.

album — weißer B.

purpureum — rother B.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblättriger H.

grandiflora — großblumiger H.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiaca — Herzkraut

marrubiastrum — unächter Andorn.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

vulgare — gemeine W.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Thymus XIV, 1. Thymian

Serpillum — Quendel, Feldkümmel.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

malvaefolium — malvenblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblättrige M.

sylvestris — wilde M.

alcea — Siegmarskraut.

Ervum XVII, 3. Linse

tetraspermum — viersaamige L.

an Hecken und Zäunen.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut

montanum — Berg J.

hirsutum — zottiges J.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

crispus — krause D.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

viscosus — klebriges Kr.

aquaticus — Wasser Kr.

Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant

Helenium — gemeiner A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

inodorum — geruchlose G.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Humulus XXII, 4. Hopfen

Lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 1. Melde

rosea — Rosen M.

nitens — glänzende, pfeilförmige M.

an Hecken und Zäunen.

Atriplex XXIII, 1. Melde
hastata — spontonblättrige M.

18) An Wegen und Dämmen.

Panicum III, 2. Hirsegras
verticillatum — wirtelförmiges H.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — Languedokisches K.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
urbicum — Stadt G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — großblumiger Kl.

Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.

Thymus XIV, 1. Thymian
Serpillum — Quendel, Feldkümmel.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.
columbinum — Taubenschnabel
rotundifolium — rundblättriger St.
malvaefolium — malvenblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Acker Sch.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblättriger S.

an Wegen und Dämmen.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille
juncea — binsenartige Ch.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — große Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
crispus — krause D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel
Acanthium — gemeine Kr.

Tanacetum XIX, 1. Rheinfarn
vulgare — gemeiner Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfuß-Wermuth
Absinthium — gemeiner W.
vulgaris — gemeiner Beyfuß.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Inula XIX, 2. Alant

Oculus Christi — Christ-Auge, wilder A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume
inodorum — geruchlose W.

- 19) An und auf Mauern und Dächern.
Poa III, 2. Rispengras
compressa — zusammengedrücktes R.
Chenopodium V, 2. Gänsefuß
Bonus Henricus — guter Heinrich.
Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.
Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.
album — weißes H.
acre — scharfes H.
sexangulare — sechseckiges H.
Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.
Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
tectorum — Dach H.
Nepeta XIV, 1. Nepten
Cataria — gemeine Katzenmünze.
Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
tetralix — breitblättriger H.
grandiflora — großblumiger H.
Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp
Cardiaca — Herzkraut
marrubiastrum — unächter Andorn.
Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblättriger H.
Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.
Malva XVI, 2. Malve
rotundifolia — rundblättrige M.
sylvestris — wilde M.

an nud auf Mauern und Dächern.

Ervum XVII, 3. Linse

hirsutum — zottige L.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

vulgare — gewöhnlicher Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Absinthium — gemeiner Wermuth

vulgaris — gemeiner Beyfuß.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

acre — scharfes Fl.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Parthenium — gemeines M.

20) An ganz ungebauten Orten.

Verbena II, 1. Eisenkraut, Eiserich

officinalis — gebräuchliches E.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergifsmeinnicht

lappula — Kletten M.

an ganz ungebauten Orten.

Verbascum V, 1. Königskerze

lychnitis — lychnisartige K.

blattaria — Schabenkraut.

Solanum V, 1. Nachtschatten

villosum — zottiger N.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

polyspermum — vielsaamiger G.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

Aethusa V, 2. Gleisse, Schierling

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Reseda XI, 3. Resede, Wau

luteola — Färber-Wau

lutea — gelbe Resede.

Euphorbia XI, 3. Euphorbie, Wolfsmilch

exigua — kleinste E.

Esula — eigentliche W.

Galeopsis XIV, 1. Katzens Gesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblättriger H.

grandiflora — großblumiger H.

Ballota XIV, 1. Ballote

nigra — schwarze B.

alba — weiße B.

Marrubium XIV, 1. Andorn

vulgare — gemeiner A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

Cardiaca — Herzkraut

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — gemeiner Frauenflachs.

an ganz ungebauten Orten.

Lepidium XV, 1. Kresse

ruderales — stinkende Kr.

iberis — Europäische Kr.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

Robertianum — stinkender St.

rotundifolium — rundblättriger St.

Malva XVI, 2. Malve

mauritanica — mauritanische M.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Lactuca XIX, 1. Salat

scariola — wilder S.

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille

juncea — binsenartige Ch.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

biennis — zweyjähriger P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — große Kl.

minus — kleine Kl.

tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel

nutans — Bisam D. Esels D.

acanthoides — Bärenklau D.

crispus — krause D.

marianus — Marien D.

- an ganz ungebauten Orten.
- Cnicus** XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.
- Onopordon** XIX, 1. Krebsdistel
Acanthium — gemeine Kr.
- Serratula** XIX, 1. Scharte
tinctoria — Färber Sch.
- Tanacetum** XIX, 2. Rheinfarn
Balsamita — breitblättriger R. Frauenmünze.
- Artemisia** XIX, 2. Beyfußwermuth
Absinthium — gemeiner Wermuth
vulgaris — gemeiner Beyfuß.
- Erigeron** XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.
- Senecio** XIX, 2. Kreuzkraut
viscosus — klebriges Kr.
- Inula** XIX, 2. Alant
Germanica — deutscher A.
- Matricaria** XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.
- Anthemis** XIX, 2. Chamille
Cotula — stinkende Hunds Ch.
- Centaurea** XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — große wilde Scabiose.
- Filago** XIX, 3. Filzkraut
arvensis — Acker F.
- Amaranthus** XXI, 5. Amaranth
Blitum — Meier A.
viridis — grüner A.
- Mercurialis** XXII, 7. Bingelkraut
annua — jähriges B.

an ganz ungebauten Orten.

Atriplex XXIII, 1. Melde

patula — ausgebreitete, spitzblättrige M.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Monarda II, 1. Monarde

didyma — vierfädige M.

fistulosa — röhrichte M.

Crocus sativus III, 1. Safran

autumnalis — Herbst S.

Scabiosa IV, 1. Scabiose

stellata — weisse Stern Sc.

atropurpurea — schwarzrothe Sc.

Heliotropium V, 1. Scorpionkraut

Eurpaeum — Europäisches S.

Borago V, 1. Boretsch

officinalis — gebräuchlicher B.

Phlox V, 1. Flammenblume

maculata — gefleckte Fl.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immerblühende, geruchlose L.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

lycopersicon — Liebesapfel.

Vinca V, 1. Sinngrün, Inngrün

major — grosses S.

Nerium V, 1. Oleander, Rosenlorbeer

Oleander — gemeiner Ol.

in gewöhnlichen Gärten.

Beta V, 2. Mangold

vulgaris — gemeiner M. rothe Rübe

Cicla — weisser M. Beiskohl.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirnet

officinale — gebräuchliches Dr.

Daucus V, 2. Möhren

Carota — gemeine M.

Sium V, 2. Merk, Eppich

sisarum — Zuckerwurz.

Aethusa V, 2. Gleisse

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie,

Pastinaca V, 2. Pastinak

sativa — Garten P.

Passiflora V, 3. Passionsblume

caerulea — blaue, gemeine P.

incarnata — fleischfarbige P.

lutea — gelbe P.

Tradescantia VI, 1. Tradescantie

virginica — virginische Tr.

Levcojum VI, 1. Knotenblume, Sommer-
thierchen

aestivum — Sommer Kn.

Allium VI, 1. Lauch

Cepa — gemeine Zwiebel.

Tropaeolum VIII, 1. Kapuzinerkresse

minus — kleine K.

majus — grosse K.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

- in gewöhnlichen Gärten.
- Dianthus** X, 2. Nelke
 Caryophyllus — gemeine Garten N.
 plumarius — Feder N.
- Oxalis** X, 4. Sauerklée
 corniculata — gehörnter S.
- Agrostemma** X, 4. Raden
 coronaria — Sammltröschen, Vexirnelke.
- Reseda** XI, 3. Resede, Wau
 alba — weißer W.
 undata — wellenförmige R.
- Portulaca** XI, 4. Portulak
 oleracea — Kohl P.
- Punica** XII, 1. Granatenbaum
 Granatum — gemeiner Gr.
 nana — Granatenstrauch.
- Spiraea** XII, 4. Spierstaude
 alba — weiße Sp.
- Potentilla** XII, 5. Fünffingerkraut
 fruticosa — strauchartiges F.
- Clematis** XIII, 6. Waldrebe
 integrifolia — ganzblättrige W.
- Teucrium** XIV, 1. Gamander
 flavum — gelber G.
- Satureja** XIV, 1. Saturey
 hortensis — Garten S.
- Hyssopus** XIV, 1. Ysop
 officinalis — gebräuchlicher Y.
 lophantus — chinesischer Y.
 nepetoides — virginischer Y.
 ooymifolius — basilienblättriger Y.

in gewöhnlichen Gärten.

Lavandula XIV, 1. Lavendel

Stoechas — Stöchaskraut.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

hirsuta — zottiges Gl.

Mentha XIV, 1. Minze

crispa — krause M.

piperita — Pfeffer M.

Origanum XIV, 1. Dosten

Majorana — gewöhnlicher Majoran.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche Zitron M.

Ocimum XIV, 1. Basilien

Basilicum — gemeine B.

minimum — kleinste B.

polystachyon — vielährige B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

majus — grosses L.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber L.

incanus — bestäubter L.

fenestralis — Fenster L.

annuus — jähriger L.

tricuspidatus — dreyzackiger L.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

phaeum — Alpen St.

fuscum — brauner St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume

rosea — Rosenpappel

ficifolia — feigenblätterige P.

in gewöhnlichen Gärten.

Malva XVI, 2. Malve

caroliniana — carolinische M.

parviflora — kleinblumige M.

Lavatera XVI, 2. Lavater

thuringiaca — thüringische L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

juncum — binsenartiges Pfr.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen

odoratus — wohlriechende Pl.

latifolius — breitblättrige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke

lutea — gelbe W.

hybrida — Bastard W.

fabia — Buschbohne, Saubohne.

Cicer XVII, 3. Kichern

sativum — zahme K.

arietinum — gemeine K.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke

varia — bunte Kr.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut

vermiculata — wurmförmiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gebräuchliche G.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee

italica — italienischer St.

cretica — cretischer St.

in gewöhnlichen Gärten.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

ornithopodioides — vogelfußartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

Foenum Graecum — griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

falcata — gelber Sichelklee.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

porrifolium — lauchblättriger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

echioides — natterkopffartiges B.

Lactuca XIX, 1. Salat

sativa — gemeiner Garten S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

alpina — Alpen P.

rubra — rother P.

Cichorium XIX, 1. Wegwart

Endivia — Endivien, Winterendivien.

Cynara XIX, 1. Artischocke

scolymus — gemeine A.

Cardunculus — Cardonen

humilis — niedrige A.

Carthamus XIX, 1. Saflor

tinctorius — gemeiner Saflor, wilder Safran.

lanatus — wollichter S.

in gewöhnlichen Gärten.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Abrotanum — Stabwurz.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

elegans — schönes Kr.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume

patula — weitausgebreitete S.

erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie

pauciflora — wenigblumige Z.

multiflora — vielblumige Z.

verticillata — wirtelförmige Z.

elegans — zierliche Z.

Anthemis XIX, 2. Chamille

nobilis — edle, römische Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

annuus — jährige S.

multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

laciniata — zerschlossene R.

purpurea — purpurrothe R.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

officinalis — gebräuchliche R.

Impatiens XIX, 5. Springsaame

Balsamina — Garten-Balsamine.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

tricolor — dreyfarbiger A.

Blitum — Meier A.

in gewöhnlichen Gärten.

Amaranthus XXI, 5. *Amaranthi*

sanguineus — blutrother A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

Humulus XXII, 4. Hopfen

lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 2. Melde

hortensis — Garten M.

22) In botanischen Gärten.

Jasminum II, 1. Jasmin

officinale — eigentlicher J.

Gratiola II, 1. Gnadenkraut

officinalis — gemeines Gn.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf

donax — zahmes Sch.

Globularia IV, 1. Kugelblume

vulgaris — gemeine K.

Dipsacus IV, 1. Karten

sativus — zahme K.

Knautia IV, 1. Knautie

orientalis — morgenländische Kn.

propontica — propontische Kn.

Spermacoe IV, 1. Zahnwirbel

tenuior — dünner Z.

Plantago IV, 1. Wegerich

Cynops — staudiger W.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bluts-
tröpfchen

canadensis — canadisches Sp.

in gewöhnlichen Gärten.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

sempervirens — immergrüne Ochs.

Phlox V, 1. Flammenblume

maculata — gefleckte Fl.

Convolvulus V, 1. Winde

purpureus — purpurrothe W.

Nil — arabische W.

siculus — sicilianische W.

lineatus — gestrichelte W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde

coccinea — scharlachrothe Tr.

lacunosa — grubichte Tr.

violacea — violette Tr.

triloba — dreylappige Tr.

hederifolia — epheublätterige Tr.

tamnifolia — schmerwurzblätterige Tr.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

lilifolia — lilienblätterige Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immergrünende L.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — großblumige W.

longiflora — langblumige W.

Nicotiana V, 1. Tabak

Tabaccum — gemeiner T.

rustica — türkischer, Bauern T.

in botanischen Gärten.

Nicotiana V, 1. Tabak

paniculata — Jungfern T.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schlottenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum patulum -- gemein. weitschweifiger N.

Guineense — Guineischer N.

virginicum — virginischer N.

Judaicum — Judaischer N.

racemosum — traubentragender N.

tomentosum — filzichter N.

Apocynum V, 2. Hundskohl

Venetum — venetianischer H.

Cynanchum V, 2. Hundswürger

acutum — spitzblättriger H.

monspeliacum — languedokischer H.

erectum — aufrechter H.

Asclepias V, 2. Aesculapie

incarnata — fleischfarbige Aesc.

tuberosa — knollige Aesc.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß

Botrys — traubenartiger G.

Swertia V, 2. Swertie

perennis — perennirende Sw.

Tordylium V, 2. Drehkraut

syriacum — syrisches Dr.

officinale — gebräuchliches Dr.

Aralia V, 5. Aralie

spinosa — stachlichte A.

in botanischen Gärten.

Statice V, 5. Wiesenkraut
cordata — herzförmiges W.

Tradescantia VI, 1. Tradescantie
virginica — virginische Tr.

Leucojon VI, 1. Knotenblume, Sommer-
 thierchen
aestivum — Sommer Kn.

Rumex VI, 3. Ampfer
spinosus — stachlichter A.

Gaura VIII, 1. Gaura
biennis — zweyjährige G.

Stellera VIII, 1. Stellere, Sperlingszunge
passerina — gemeine Sp.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
viviparum — keimender W.
virginicum — virginischer W.
orientale — morgenländischer W.
divaricatum — auseinandergesperrter W.
tataricum — sibirischer Buchweizen.

Cassia X, 1. Cassie
ligustrina — hartriegelartige C.
marylandica — maryländische C.
Chamaecrista — kammartige C.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum
unedo — aufrechtsstehender E.

Clethra X, 1. Clethra
alnifolia — erlenblättrige Cl.

Hydrangea X, 2. Hydrangea
arborea — baumartige Hydr.

in botanischen Gärten.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
album — weisse fette H.

Agrostemma X, 4. Raden
Coronaria — Sammltröschen, Vexirnelke.

Peganum XI, 1. Harmelstaude
Harmala — gemeine H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.

repens — kriechender O.

Agrimonoides — glatter O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
platyphyllos — breitblättrige W.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz
globiferum — kugeltragende H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
tomentosa — filzichte Sp.
alba — weisse Sp.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
serpillifolius — quendelblättrige C.
pilosus — haarichte C.

Aconitum XIII, 1. Sturmhut, Eisenhut
Anthora — Giftheil.

in botanischen Gärten.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander
multiflorum — vielblumiger G.
virginicum — virginischer G.
canadense — canadischer G.
chamaedrys — gewöhnlicher G.
flavum — gelber G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Satureja XIV, 1. Saturey
Thymbra — cretische S.
capitata — kopfartige S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
Lophanthus — Chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblättriger Y.

Nepeta XIV, 1. Nepten
violacea — violette N.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
scordioides — gezahntes Gl.
hirsuta — zottiges Gl.
elegans — zierliches Gl.

Mentha XIV, 1. Münze
piperita — Pfeffer M.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Ballota XIV, 1. Ballote
lanata — wollichte B.

- in botanischen Gärten.
- Marrubium** XIV, 1. Andorn
candidissimum — weißester A.
- Leonurus** XIV, 1. Wolfstrapp
tataricus — tatarischer W.
sibiricus — sibirischer W.
crispus — krausichter W.
- Phlomis** XIV, 1. Phlomis, Jerusalems-Salbey.
herba venti — Windkraut
tuberosa — knollige Phlomis.
- Clinopodium** XIV, 1. Wirbeldost
aegyptiacum — ägyptische W.
incanum — graue W.
- Origanum** XIV, 1. Dosten
aegyptiacum — ägyptische D.
sipylaeum — sipylische D.
creticum — cretische D.
- Melissa** XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.
- Dracocephalum** XIV, 1. Drachenkopf
virginicum — virginischer Dr.
moldavicum — moldauischer Dr.
- Ocimum** XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachion — vielährige B.
- Scutellaria** XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
lateriflora — seitenblühendes H.
albida — weißliches H.
- Chelone** XIV, 2. Schildblume
glabra — glatte Sch.

in botanischen Gärten.

Chelone XIV, 2. Schildblume

obliqua — schiefe Sch.

hirsuta — zottige Sch.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Elatine — Erdwinde

linifolium — leinblättriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz

auriculata — geöhrte Br.

scorodonia — melissenblättrige Br.

betonicaefolia — betonienblättrige Br.

Celsia XIV, 2. Celsie

arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut

purpurea — purpurfarbiger F.

ambigua — ockergelber F.

ferruginea — eisenrostfarbiger F.

Ruellia XIV, 2. Ruellie

strepens — rauschende R.

Anastatica XV, 1. Rose von Jericho

hierochuntica — gemeine R.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume

semperflorens — immerblühender B.

sempervirens — immergrüner B.

umbellata — doldenförmiger B.

amara — bitterer B.

pinnata — gefiederter B.

Lepidium XV, 1. Kresse

iberis — Europäische Kr.

Biscutella XV, 1. Doppelschild

majus — großes D.

in botanischen Gärten.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
angustifolia — schmalblättriges D.
apula — apulisches D.

Cleome XV, 2. Cleome
violacea — violette Cl.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.
prostratum — gestreckter St.

Sida XVI, 2. Sammtpappel
spinosa — stachlichte S.
Abutilon — gelbe Sonnenpappel
cristata — kammförmige S.

Althaea XVI, 2. Eibisch
officinalis — gebräuchlicher E.
cannabina — hanfblättriger E.
hirsuta — zottiger E.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosen P.
ficifolia — feigenblättrige P.

Malva XVI, 2. Malve
peruviana — peruvianische M.
limensis — limaische M.
bryonifolia — zaunrübenblättrige M.
caroliniana — carolinische M.
parviflora — kleinblumige M.
crispa — krausblättrige M.
moschata — Bisam M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
arborea — baumartige L.
trimestris — dreymonatliche L.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus

syriacus — syrischer H.

cannabinus — hanfartiger H.

trionum — aufgeblasener H.

africanus — afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

vesicaria — blasichter E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

junceum — binsenartiges Pfr.

monospermum — einsamiges Pfr.

patens — ausgebreitetes Pfr.

radiatum — gestrahltes Pfr.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote

incana — bestäubte Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

alopecuroides — fuchsschwanzartige H.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne

pilosus — haarichte F.

angustifolius — schmalblättrige F.

luteus — gelbe F.

Dolichos XVII, 3. Faseln

Lablap — ägyptische F.

Glycine XVII, 3. Erdnuss

Apios — Amerikanische E.

Vicia XVII, 3. Wicke

onobrychoides — esparcettenartige W.

nissoliana — nissolische W.

benghalensis — benghalische W.

peregrina — fremde W.

narbonensis — narbonensische W.

in botanischen Gärten.

Cytisus XVII, 3. Geißklee

Laburnum — gemeiner Bohnenbaum

alpinus — Alpen G.

nigricans — schwärzlicher G.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut

vermiculata — wurmförmiges Sc.

muricata — zackiges Sc.

sulcata — gefurchtes Sc.

subvillosa — fast zottiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf

flexuosum — gebogener H.

caput galli — eigentlicher H.

crista galli — Hahnenkamm.

Galega XVII, 3. Geißraute

officinalis — gewöhnliche G.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee

italica — italienischer St.

cretica — cretischer St.

Trifolium XVII, 3. Klee

Lupinaster — sibirischer Kl.

hybridum — Bastard Kl.

incarnatum — röthlicher Kl.

ochroleucum — blassgelber Kl.

stellatum — sternförmiger Kl.

clypeatum — schildförmiger Kl.

tomentosum — filziger Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

ornithopodoides — vogelfußartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle

ruthenica — russische Tr.

in botanischen Gärten.

Trigonella XVII, 3. *Trigonelle*

platycarpus — sibirische Tr.

polycerata — vielhörnichte Tr.

spinosa — stachlichte Tr.

corniculata — gehörnte Tr.

monspeliaca — montPELLIERSche Tr.

striata — gestreifte Tr.

Foenum Graecum — Griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee

radiata — gestrahlter Schn.

circinata — gekräuselter Schn.

falcata — gelber Sichelklee.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu

Kalmianum — Kalmisches J.

calycinum — großkelchichtes J.

Ascyron — Peterswurz

pyramidatum — pyramidenförmiges J.

androsaemum — beerentragendes J.

olympicum — olympisches J.

canariense — canarisches J.

hircinum — stinkendes J.

elatum — hohes J.

prolificum — sprossendes J.

canadense — canadisches J.

virginicum — virginisches J.

tomentosum — filzichtetes J.

monogynum — chinesisches J.

Geropogon XIX, 1. Graubart

glabrum — glatter Gr.

hirsutum — zottiger Gr.

in botanischen Gärten.

Tragopogon XIX. 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

porrifolium — lauchblättriger B.

picroides — bitterkrautartiger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

echioides — natterkopffartiges B.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

tenerrimus — sehr zarte G.

Plumeri — Plumiers G.

floridanus — floridanische G.

sibiricus — sibirische G.

tuberosus — knollige G.

canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

sanctum — jüdisches H.

paniculatum — rispenförmiges H.

amplexicaule — herzförmiges H.

glutinosum — klebriges H.

pyrenaicum — pyrenäisches H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

rubra — rother P.

aspera — rauher P.

rhagadioloides — rauchköpfiger P.

sibirica — sibirischer P.

pulchra — schöner P.

neglecta — versäumter P.

in botanischen Gärten.

Andryala XIX, 1. Wolldistel

lanceolata — lanzettblättrige W.

integrifolia — ganzblättrige W.

cheiranthifolia — lackblättrige W.

lanata — wollichte W.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

lucida — glänzender S.

scabra — rauher S.

virginica — virginischer S.

Hedypnois — glattköpfiger S.

rhagadioloides — rauchköpfiger S.

Seriola XIX, 1. Hasenkohl

laevigata — glatter H.

aetnensis — sicilianischer H.

cretensis — cretischer H.

urens — brennender H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut

pontana — schweizerisches F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

Zazinthia — warzichter R.

stellata — sternförmiger R.

rhagadiolus — levantischer R.

Catananche XIX, 1. Zwangkraut

caerulea — blaues Zw.

lutea — gelbes Zw.

Scolymus XIX, 1. Golddistel

maculatus — gefleckte G.

hispanicus — spanische G.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

- in botanischen Gärten.
Carduus XIX, 1. Distel
stellatus — sternförmige D.
helenioides — alantartige D.
cernuus — nickende D.
Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
syriacus — syrische Distel
ciliatus — gefranzte Distel.
Onopordon XIX, 1. Krebsdistel
arabicum — arabische Kr.
acaule — stengellose Kr.
Carlina XIX, 1. Eberwurz
pyrenaica — pyrenäische E.
Carthamus XIX, 1. Saflor
creticus — cretischer S.
caeruleus — blauer S.
Serratula XIX, 1. Scharte
coronata — Kranz Sch.
praealta — sehr hohe Sch.
glauca — graue Sch.
squarrosa — sparrichte Sch.
scarriosa — rauschende Sch.
spicata — in Ähren blühende Sch.
multiflora — vielblumige Sch.
Spilanthus XIX, 1. Fleckblume
Pseudo-Acmella — falsche Acmelle
Acmella — wahre Acmelle, A B C Kraut
oleraceus — kohlartige Fleckblume.
Bidens XIX, 1. Zweyzahn
frondosa — belaubter Zw.
pilosa — haarichter Zw.

in botanischen Gärten.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn

bipinnata — doppelt gefiederter Zw.

bullata — blasichter Zw.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz

saracenica — saracenische P.

suaveolens — wohlriechende P.

atriplicifolia — meldenblättrige P.

albifrons — weiszweigige P.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorspflanze

sessilifolium — ungestielte E.

altissimum — sehr hohe E.

purpureum — purpurfarbige E.

maculatum — gefleckte E.

coelestinum — himmelblaue E.

aromaticum — gewürzhafte E.

Ageratum XIX, 1. Ageratum

conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume

biflora — zweyblumiges G.

graminifolia — grasblättriges G.

Santolina XIX, 1. Heilige Pflanze

Chamae Cyparissias — gemeine heil. Pfl.

rosmarinifolia — rosmarinblättrige heil. Pfl.

Athanasia XIX, 1. Athanasie, Jüngling

annua — jährige Ath.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

sibiricum — sibirischer Rh.

Balsamita — Frauenmünze, römische Salbey.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

judaica — jüdischer B.

in botanischen Gärten.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

contra — persischer B.

Abrotanum — Stabwurzel

arborescens — baumartiger B.

Santonicum — Wurmsaame, heiliger B.

Pontica — Römischer B.

annua — jähriger B.

integrifolia — ganzblättriger B.

maderaspatana — ostindischer B.

Conyza XIX, 2. Dürrewurz, Flöhkraut

saxatilis — Stein D.

anthelmintica — wurmtreibende D.

cinerea — aschgraue D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

viscosum — klebriges Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

orientale — morgenländisches R.

rutilans — funkelndes R.

ignescens — feuriges R.

undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume

annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Baccharis XIX, 2. Bacchuspflanze

ivefolia — ivablättrige B.

halimifolia — meerblättrige B.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

persicifolius — pfirsichblättriges Kr.

arabicus — arabisches Kr.

in botanischen Gärten.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

cernuus — nickendes Kr.

triflorus — dreyblumiges Kr.

lividus — bleyfarbiges Kr.

elegans — schönes Kr.

aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

tenellus — zarte St.

sibiricus — sibirische St.

divaricatus — weit auseinander gesperrte St.

hyssopifolius — ysopblättrige St.

dumosus — buschige St.

tenuifolius — schmalblättrige St.

linarifolius — leinkrautblättrige St.

linifolius — leinblättrige St.

concolor — einfarbige St.

Novae Angliae — Neu - Engländische St.

undulatus — wellenförmige St.

grandiflorus — großblumige St.

annuus — jährige St.

laevis — glatte St.

mutabilis — veränderliche St.

Tradescanti — Tradescants St.

Novi Belgii — Neu - Holländische St.

tardiflorus — langsamblühende St.

miser — kurzgestrahlte St.

macrophyllus — großblättrige St.

Solidago XIX, 2. Goldrute

canadensis — canadische G.

mexicana — mexikanische G.

in botanischen Gärten.

Solidago XIX, 2. Goldrute
latifolia — breitblättrige G.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
canadensis — canadische A.

Inula XIX, 2. Alant
crithmifolia — meerfenchelblättriger A.

Helenium XIX, 2. Bastard-Sonnenblume
autumnale — Herbst B.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrle
abrotanoides — schwarzblättrige S.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

serotinum — spätblühende W.

coronarium — kronenförmige G.

Cotula XIX, 2. Laugenblume
aurea — goldfarbige L.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

altissima — höchste Ch.

mixta — doppelfarbige Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Verbesina XIX, 2. Verbesine, Kelke

alata — geflügelte V.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge

spinosum — stachlichtes R.

aquaticum — Wasser R.

helianthoides — sonnenblumenartiges R.

Kochii — Kochisches R.

in botanischen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

dodecapetatus — zwölfblättrige S.

strumosus — kropfige S.

giganteus — Riesen S.

altissimus — höchste S.

laevis — glatte S.

divaricatus — ausgesperrte S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbeckie

laciniata — zerschlissene R.

triloba — dreylappige R.

hirta — rauhe R.

purpurea — purpurrothe R.

oppositifolia — entgegengesetztblättrige R.

angustifolia — schmalblättrige R.

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

alata — geflügelte R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

verticillata — querlförmige C.

tenuifolia — schmalblättrige C.

leucantha — weisblumige C.

tripteris — dreifache C.

auriculata — geöhrte C.

lanceolata — lanzettblättrige C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

moschata — Bisam duftende Fl.

ambracea — Ambra duftende Fl.

pectinata — kammförmige Fl.

sibirica — sibirische Fl.

Calcitrapa — Sterndistel Fl.

melitensis — Maltheser Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
sacula — sicilianische Fl.

Centauroides — tausendgüldenkrautartige Fl.

Crocodilium — syrische Fl.

muricata — zackichte Fl.

galactites — Milch Fl.

Baltimora XIX, 4. Baltimore
erecta — aufrechtstehende B.

Silphium XIX, 4. Silphie

perfoliatum — durchwachsene S.

connatum — verwachsene S.

asteriscus — sternblumenartige S.

solidaginoides — goldruthenartige S.

trifoliatum — dreyblättrige S.

trilobatum — dreylappichte S.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

sancta — jüdische, heilige R.

pluvialis — Kapische R.

hybrida — Bastard R.

stellata — sternförmige R.

tomentosa — filzichte R.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr

calendulacea — ringelblumenartiges B.

trifida — dreyspaltiges B.

laciniata — zerschlissenes B.

aspera — rauhes B.

paleacea — spreuiges B.

Echinops XIX, 5. Kugeldistel

ritro — glattblättrige K.

tenuifolius — zartblättrige K.

in botanischen Gärten.

Lobelia XIX, 6. Lobelie

comosa — zopfige L.

cardinalis — Cardinalsblume

siphylitica — antivenerische L.

inflata — aufgeblasene L.

Cliffortiana — Cliffortische L.

Erinus — langgestielte L.

pubescens — weichhaarichte L.

Urtica XXI, 4. Nessel

pilulifera — pillentragende N.

balearica — balearische N.

cannabina — Hanf N.

canadensis — canadische N.

nivea — schneeweiße N.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette

orientale — morgenländische Sp.

spinosum — stachlichte Sp.

Ambrosia XXI, 5. Götterkraut

trifida — dreispaltiges G.

maritima — Seestrands G.

Parthenium XXI, 5. Parthenie, Meydblume

Hysterophorus — vielspaltige P.

integrifolium — ganzblättrige P.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

albus — weißer A.

graecizans — griechischer A.

melancholicus — melancholischer A.

tricolor — dreyfarbiger A.

lividus — bleyfarbiger A.

oleraceus — gemüsartiger A.

in botanischen Gärten.

Amaranthus XIX, 5. Amaranth
polygonoides — kleinblättriger A.

hybridus — Bastard A.

paniculatus — rispenförmiger A.

sanguineus — blutrother A.

retroflexus — rückwärtsgebogener A.

flavus — gelblicher A.

cruentus — blutiger A.

parisiensis — Pariser A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

spinosus — stachlichter A.

Theligonum XXI, 7. Hundskohl

Cynocrambe — gemeiner H.

Ricinus XXI, 8. Wunderbaum

communis — gemeiner W.

lividus — bleyfarbiger W.

Dioscorea XXII, 5. Dioscoride

villosa — zottige D.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

ambigua — zweifelhaftes B.

Veratrum XXIII, 1. Nießwurz

album — weiße N.

Andropogon XXIII, 1. Bartgras, Flockgras

contortum — gedrehtes B.

Gryllus — grillenförmiges, purpurrothes B.

distachyon — zweyjähriges B.

hirtum — rauchähriges B.

Ischaemum — deutsches B.

Chloris XXIII, 1. Chloris

radiata — gestrahlte Chl.

barbata — bärtige Chl.

in botanischen Gärten.

Chloris XXIII, 1. Chloris

petraea — Stein Chl.

Holcus XXIII, 1. Honiggras

saccharatus — Zucker H.

Cenchrus XXIII, 1. Klebgras, Stachelgras

echinatus — hakichtes Kl.

capitatus — kopfförmiges Kl.

ciliaris — gefranztes Kl.

Aegilops XXIII, 1. Walch, Twalch

ovata — eyrunder W.

geniculata — knieförmiger W.

triuncialis — rauher W.

caudata — geschwänzter W.

squarrosa — sparrichter W.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

hederifolia — epheublätteriger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras

odoratum — wahres R.

Valeriana III, 1. Baldrian

officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras

viride — grünes H.

crus galli — hahnenfüßiges H.

Poa III, 2. Rispengras

annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras

glomerata — gemeines Kn. Hundsgras.

allenthalben.

Bromus III, 2. Tresp
inermis — Quecken Tr.
sterilis — tauber Tr.
tectorum — Dach Tr.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
arvensis — Acker Sc.

Plantago IV, 1. Wegerich
major — großer W.
media — mittlerer W.
lanceolata — spitziger W. Hundsribbe.

Sagina IV, 3. Mastkraut, Vierling
procumbens — darniederliegendes M.

Lycopsis V, 1. Krummhals
arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
vulgare — gemeiner O. stolzer Heinrich.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum — schwarzer N.

Chenopodium V, 2. Gänsefuß
rubrum — rother G.
murale — Mauer G.

Daucus V, 2. Möhren
Carota — gemeine M.

Heracleum V, 2. Heilkraut, unächte Bärenklau
Sphondylium — gemeine B.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
sylvestre — wilder K.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume
Armeria — nelkenartiges W.

allenthalben.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
aviculare — gemeiner W.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.

Spergula X, 4. Spark
arvensis — Acker Sp.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Tormentilla XII, 5. Tormentille
erecta — aufrechte T.

Prunella XIV, 2. Brunelle, Braunheil
vulgaris — gemeine Br.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
bursa Pastoris — Hirtentäschel.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
incanum — bestäubtes St.
calycinum — deutsches St.

Erysimum XV, 2. Hederich
officinale — gewöhnlicher H.
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
officinale — gebräuchlicher St.

Trifolium XVII, 3. Klee
repens — kriechender Kl. weißer Wiesen Kl.
pratense — spanischer Kl.
arvense — Katzen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
perforatum — gemeines J.

allenthalben.

Sonchus XIX, 1. Gänse-distel

oleraceus — gemüsartige G.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn

Taraxacum — gemeiner L.

Apargia XIX, 1. Apargie

hastilis — spontonförmige A.

autumnalis — Herbst A.

hirta — rauchhaarichte A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart

Intybus — wilder W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maßliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut; Garben

Ptarmica — deutscher Bertram

Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel

urens — Brenn N. Eiter N.

dioica — groſſe getrennte Brenn N.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cephalanthus IV, 1. Knopfbaum

occidentalis — abendländischer Kn.

Lonicera V, 1. Lonicere

symphoricarpos — carolinische L.

Lycium V, 1. Bocksdorn

Barbarum — Chinesischer B.

Europaeum — Europäischer B.

in Lustwäldern und Alleen.

Lycium V, 1. Bocksborn

Chinense — Afrikanischer B.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

odoratus — wohlriechende Br.

Robinia XVII, 3. Robinie

Caragana — Caraganastrauch.

frutescens — strauchartige R.

25) Auf Alpen und andern hohen
Gebirgen.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

aphylla — blattloser E.

Onosma V, 1. Lotwurz, Schminkwurz

echioides — natterkopffartige Schm.

Androsace V, 1. Androsace, Mannsharnisch

villosa — haarichte A.

lactea — milchweifse A.

Verbascum V, 1. Königskerze

phlomoides — phlomisartige K.

Myconi — Myconische K.

Thesium V, 1. Leinblatt

alpinum — Alpen L.

Gentiana V, 2. Enzian

lutea — gelber E.

punctata — gedüpfelter E.

asclepiadea — schwalbenwurzblätteriger E.

pumila — Zwerg E.

ciliata — gefranzter E.

Astrantia V, 2. Astrantie

major — größere A.

minor — kleinere A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
juncum — binsenartiges H.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.

Heracleum V, 2. Heilkraut, falsche Bärenklau
austriacum — österreichisches H.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
Hippomarathrum — Rosdill.

Linum V, 5. Lein
alpinum — Apen L.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
alpinum — Alpen W.

Moehringia VIII, 2. Möhringie
muscosa — moosartige M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
divaricatum — auseinandergesperrter W.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
Ocymoides — rundblättriges S.
lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke
Caryophyllus — gemeine Garten N.
alpinus — Alpen N.

Silene X, 3. Leimkraut
rupestris — Felsen L.
acaulis — Zwerg L.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
dichotoma — zweytheiliger M.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
quadridentata — vierzählige L.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
globiferum — kugeltragendes H.
hirtum — rauches H.
montanum — Berg H.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
caulescens — vielblumiges F.

Papaver XIII, 1. Mohn
alpinum — Alpen M.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut
Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Aquilegia XIII, 5. Akeley
alpina — Alpen A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume
alpina — Alpen A.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
aconitifolius — eisenhutartiger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander
chamaedrys — edler G.
lucidum — glänzender G.
supinum — kriechender G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
montana — Berg Gl.

scordioides — gezahntes standiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
Orvala — Orvelkraut.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Stachys XIV, 1. Andorn

alpina — Alpen A.

Marrubium XIV, 1. Andorn, weißer Dorant

peregrinum — fremder A.

supinum — liegender A.

Melissa XIV, 1. Melisse

officinalis — gebräuchliche M.

Calamintha — Kalaminthe, Berg M.

nepeta — poleyartige M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut

alpina — Alpen Sch.

lupulina — Hopfen Sch.

Bartsia XIV, 2. Bartsche

alpina — Alpen B.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost

lutea — gelber A.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut

verticillata — wirtelförmiges L.

recutita — beschnittenes L.

incarnata — incarnatrothes L.

tuberosa — dickwurzlichtes L.

flammea — feuerrothes L.

foliosa — blätteriges L.

acaulis — stengelloses L.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

alpinum — Alpen L.

genistaefolium — ginsterblätteriges L.

Lepidium XV, 1. Kresse

alpinum — Alpen Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
saxatile — eigentliches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
apula — apulisches D.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
alpina — Alpen G.
bellidifolia — maßliebenblätteriges G.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen
comosa — zopfiges H.

Trifolium XVII, 3. Klee
alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
porrifolium — lauchblätteriges H.
chondrilloides — chondrillartiges H.
amplexicaule — herzförmiges H.
helveticum — schweizerisches H.
saxatile — Stein H.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
Erisithales — klebriges Kr.
pygmaeus — Zwerg Kr.
spinosissimus — stachlichtes Kr.
canus — graues Kr.
mollis — weiches Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carlina XIX, 1. Eberwurz
pyrenaica — pyrenäische E.

Serratula XIX, 1. Scharte
alpina — Alpen Sch.

Cacalia XIX, 1. Pestwurz
alpina — Alpen P.
albifrons — weiszweigige P.

Artemisia XIX, 2. Beyfusswermuth
Abrotanum — Stabwurz
glacialis — Eis-Beyfuss
rupestris — Felsen B.
annua — jähriger B.

Conyza XIX, 2. Dürkraut
saxatilis — Stein D.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
alpina — Alpen H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
pusillum — Alpen R.
supinum — rückwärtsliegendes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
incanus — bestäubtes Kr.
abrotanifolius — stabwurzblättriges Kr.
alpinus — Alpen Kr.

Doronicum — einblumiges Alpen Kr.

Solidago XIX, 2. Goldrute
canadensis — canadische G.
minuta — kleine G.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
integrifolia — ganzblättrige A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wu-
cherblume

corymbosum — flachblumenstraufsartige G.

coronarium — kronenförmige G.

Anthemis XIX, 2. Chamille
alpina — Alpen Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
atrata — schwärzliche G.

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge
salicifolium — weidenblättriges R.

grandiflorum — großblumiges R.

Viola XIX, 6. Veilchen
calcarata — gesporntes V.

Satyrion XX, 1. Stendel
nigrum — schwarzer St.

albidum — weißlicher St.

Veratrum XXIII, 1. Nieswurz
album — weiße N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachsaussauger

Europaea — Europäischer Fl.

Epithymum — Thymseide.

(Mehr von diesen beyden Pflanzen siehe
am Ende des July Nr. 26.)

SEPT E M B E R.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreis
maritima — Meerstrands E.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth
maritima — Seestrands - Beyfuß.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
autumnalis — Herbst W.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W. Wasserschieferling.

Alisma VI, 3. Wasserwegerich
Plantago aquatica — gemeiner W.

natans — schwimmender W.

ranunculoides — hahnenfußartiger W.

3) Am Wasser.

Lycopus II, 1. Wolfsfuß, Wasserandorn
Europaeus — Europäischer W.

Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

am Wasser.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
hirsutum — zottiger, großblumiger W.
pubescens — weichwollichter W.

Lythrum XI, 1. Lythrum
salicaria — gemeiner Purpurweiderich.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
flammula — kleiner H.
lingua — größer, langblättriger H.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gemeine S.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
tuberosus — Knolldistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.
minima — kleinster Zw.
cernua — nickender Zw.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

5) An quelllichten Orten.
Vacat.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf
Calamagrostis — Wiesenschilf.

Drosera V, 6. Sonnentau
rotundifolia — rundblättriger S.
longifolia — langblättriger S.

7) Auf sumpfigen und feuchten
Wiesen.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bibernell
officinalis — gebräuchliche B.

Gentiana V, 2. Enzian

Pneumonanthe — schmalblättriger Herbst E.

Parnassia V, 4. Parnasserkraut
palustris — Sumpf P.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — Europäische P.

Teucrium XIV, 1. Gamander
scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze
sativa — zahme M.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
tuberosus — Knolldistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.

minima — kleinster Zw.

cernua — nickender Zw.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und
Grasplätzen.

Festuca III, 2. Schwingel
elatior — Wiesen Sch.

Avena III, 2. Hafer
elatior — Wiesen H. Französisch Raygras.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bibernell
officinalis — gebräuchliche B.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Gentiana V, 2. Enzian

amarella — bitterer E.

campestris — Feld E.

Colchicum VI, 3. Zeitlose

autumnale — Herbst Z.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

9) Auf Sandboden.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Filago XIX, 4. Filzkraut

Germanica — deutsches F.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Verbascum V, 1. Königskerze

thapsus — wollichte K.

thapsoides — wollkrautartige K.

phlomoides — phlomisartige K.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel

annuum — jähriger S.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Dianthus X, 2. Nelke

deltoides — deltaförmige N.

Trifolium XVII, 3. Klee

alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

porrifolium — lauchblättriges H.

Carduus XIX, 1. Distel

defloratus — Berg D.

Carlina XIX, 1. Eberwurz

acaulis — stengellose E.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

maritima — Seestrands B.

Aster XIX, 2. Sternblume

annuus — jährige St.

Amellus — Virgils St.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

11) Auf gebauten Äckern.

Solanum V, 1. Nachtschatten

tuberosum — gewöhnliche Erdbirne, Kartoffel.

Brassica XV, 2. Kohl

Rapa — gemeine weisse Rübe.

12) Auf ungebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras

glaucum — graues H.

Aphanes IV, 1. Ohmkrut

arvensis — gemeines O.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume

verticillatum — wirtelförmige Kn.

auf ungebauten Äckern.

Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Trifolium XVII, 3. Klee
agrarium — gelber Acker Kl.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
arvensis — Acker R.

Filago XIX, 4. Filzkraut
Germanica — deutsches F.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbarbiges V.
arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 1. Ohmkraut
arvensis — gemeines O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblättrige W.

Adonis XIII, 6. Adonis
aestivalis — Sommer A.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

14) In größern und dichten Wäldern.

Brömus III, 2. Tresp
giganteus — Futter Tr. Buchweizen.

Hedera V, 1. Epheu
helix — gemeiner E.

in größern u. dichten Wäldern.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

hirsuta — zottiger E.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

sylvaticus — Wald Kr.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Althaea XVI, 2. Eibisch

officinalis — gebräuchlicher E.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Solidago XIX, 2. Goldrute

Virga aurea — gemeine G.

17) An Hecken und Zäunen.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

officinalis — gebräuchliches S.

Agrimonia X, 2. Odermennig

Eupatoria — gebräuchlicher O.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

rotundifolium — rundblättriger St.

18) An Wegen und Dämmen.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut

monspeliaca — languedokisches K.

an Wegen und Dämmen.

Arabis XV, 2. Gänsekraut

thaliana — thalianisches G.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras

compressa — zusammengedrücktes R.

Bromus III, 2. Tresp

tectorum — Dach Tr.

Hedera V, 1. Epheu

helix — gemeiner E.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

Eupatoria — gewöhnlicher O.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

tectorum — gemeines H.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblättriger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

rotundifolium — rundblättriger St.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.

Solanum V, 1. Nachtschatten

villosum — zottiger N.

Eryngium V, 2. Mannstreu

campestre — Feld M.

an ganz ungebauten Orten.

Reseda XI, 3. Resede, Wau.

luteola — Färber-Wau

lutea — gelbe Resede.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

exigua — kleine W.

Ballota XIV, 1. Ballote

nigra — schwarze B.

alba — weisse B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — Frauenflachs.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

rotundifolium — rundblättriger St.

Carduus XIX, 1. Distel

acanthoides — Bärenklau D.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

Blitum — Mayerkraut.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut

annua — jähriges B.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Borago V, 1. Boretsch

officinalis — gebräuchlicher B.

Lonicera V, 1. Lonicere

sempervirens — immergrünende L.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten

Lycopersicon — Liebesapfel, Goldapfel.

Vinca V, 1. Sinngrün, Wintergrün

major — großblumiges W.

in gewöhnlichen Gärten.

Nerium V, 1. Oleander, Lorbeerrose

Oleander — gemeiner Ol.

Scandix V, 2. Kerbel

Cerfolium — gemeiner K. Garten K.

Levcojum VI, 1. Knotenblume, Sommer-
thierchen

aestivum — Herbst Kn.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke
plumarius — Feder N.

Oxalis X, 4. Sauerklee
corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden
Coronaria — Sammttröschen, Vexirnelke.

Reseda XI, 3. Resede, Wau
alba — weisse R.

undata — wellenförmige R.

Punica XII, 1. Granatenbaum
Granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

Origanum XIV, 1. Dosten

Majorana — gemeiner Majoran.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
majus — grosses L.

Althaea XVI, 2. Eibisch

cannabina — hanfblättriger E.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

trimestris — dreymonatliche L.

in gewöhnlichen Gärten.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
juncum — binsenartiges Pfr.

Dolichos XVII, 3. Faseln
Lablap — ägyptische F.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
majus — großer B.
orientale — morgenländischer B.
porrifolium — lauchblättriger B.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth
Abrotanum — Stabwurzel
Dracunculus — Dragon.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
ericoides — heideartige St.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume
patula — weitausgebreitete S.
erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie
pauciflora — wenigblumige Z.
multiflora — vielblumige Z.
verticillata — wirtelförmige Z.
elegans — schöne Z.

Anthemis XIX, 2. Chamille
nobilis — edle, römische Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.

in gewöhnlichen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

annuus — jährige S.

multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

laciniata — zerschlossene R.

purpurea — purpurrothe R.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

officinalis — gebräuchliche R.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

tricolor — dreyfarbiger A. Papageyfeder

Blitum — Mayer A.

viridis — grüner A.

sanguineus — blutrother A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

22) In botanischen Gärten.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge

sempervirens — immergrüne Ochs.

Cyclamen V, 1. Erdscheibe, Saubrod

Europaeum — Europäische E.

Convolvulus V, 1. Winde

Nil — arabische W.

siculus — sicilianische W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde

violacea — violette Tr.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — großblumige W.

longiflora — langblumige W.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

in botanischen Gärten.

Gaura VIII, 1. Gaura

biennis — zweyjährige G.

Stellera VIII, 1. Stellere, Sperlingszunge

passerina — gemeine Sp.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt

viviparum — keimender W.

virginicum — virginischer W.

orientale — morgenländischer W.

divaricatum — auseinandergesperrter W.

tataricum — sibirischer Buchweizen.

Cassia X, 1. Cassie

ligustrina — hartriegelartige C.

marylandica — maryländische C.

Chamae crista — kammartige C.

Agrimonia XI, 2. Odermennig

minor — kleiner O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

platyphyllos — breitblättrige W.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

globiferum — kugeltragende H.

Punica XII, 1. Granatenbaum

granatum — gemeiner Gr.

nana — Granatenstrauch.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere

odoratus — wohlriechende Br.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut

elegans — zierliches Gl.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp, Löwenschwanz

tataricus — tatarischer W.

sibiricus — sibirischer W.

crispus — krauser W.

in botanischen Gärten.

Phlomis XIV, 1. Phlomis, Jerusalems - Salbey
herba venti — Windkraut
tuberosa — knollige Phlomis.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf
virginicum — virginischer Dr.
moldavicum — moldauischer Dr.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
linifolium — leinblättriges L.

Vitex XIV, 2. Keuschbaum
Agnus castus — gemeiner K.
latifolia — breitblättriger K.

Cleome XV, 2. Cleome
violacea — violette Cl.

Sida XVI, 2. Sammtpappel, Sida
spinosa — stachlichte S.
Abutilon — gelbe Sonnenpappel
cristata — kammförmige S.

Althaea XVI, 2. Eibisch
cannabina — hanfblättriger E.
hirsuta — zottiger E.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosen P.
ficifolia — feigenblättrige P.

Malva XVI, 2. Malve
peruviana — peruvianische M.
limensis — limaische M.
bryonifolia — zaunrübenblättrige M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
trimestris — dreymonatliche L.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus, Ketmie
syriacus — syrischer H.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus, Ketmie

cannabinus — hanfartiger H.

trionum — aufgeblasener H.

Africanus — Afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch

lutea — gelber E.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote

incana — bestäubte Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel

alopecuroides — fuchsschwanzartige H.

Dolichos XVII, 3. Faseln

Lablap — Ägyptische F.

Glycine XVII, 3. Erdnuss

Apios — Amerikanische E.

Vicia XVII, 3. Wicke

onobrychoides — esparcettenartige W.

nissoliana — nissolische W.

benghalensis — benghalische W.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut

subvillosa — fast zottiges Sc.

Lotus XVII, 3. Schotenklee

ornithopodioides — vogelfußartiger Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

majus — großer B.

orientale — morgenländischer B.

porrifolium — lauchblättriger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut

laciniata — zerschlissenes B.

echioides — natterkopffartiges B.

in botanischen Gärten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

barbata — bärtiger P.

rubra — rother P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

scabra — rauher Schw.

virginica — virginischer Schw.

Hedypnois — glattköpfiger Schw.

rhagadioloides — rauchköpfiger Schw.

Seriola XIX, 1. Hasenkohl

laevigata — glatter H.

aetnensis — sicilianischer H.

cretensis — cretischer H.

urens — brennender H.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

helenioides — alantartige D.

Serratula XIX, 1. Scharte

praealta — sehr hohe Sch.

Ageratum XIX, 1. Ageratum

conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume

biflora — zweyblumiges G.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarn

Balsamita — Frauenmünze.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth

Abrotanum — Stabwurzel

Pontica — Römischer B.

Conyza XIX, 2. Dürrwurz

saxatilis — Stein D.

in botanischen Gärten.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

bonariense, westindisches Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

aureum — goldfarbiges R.

undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume

annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Baccharis XIX, 2. Bacchuspflanze

ivifolia — ivablätterige B.

halimifolia — meerblätterige B.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

persicifolius — pfirsichblätteriges Kr.

arabicus — arabisches Kr.

cernuus — nickendes Kr.

lividus — bleyfarbiges Kr.

elegans — schönes Kr.

aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume

divaricatus — weit auseinander gesperrte St.

hyssopifolius — ysopblätterige St.

dumosus — buschige St.

tenuifolius — schmalblätterige St.

linarifolius — leinkrautblätterige St.

linifolius — leinblätterige St.

concolor — einfarbige St.

Novae Angliae — Neu-Engländische St.

undulatus — wellenförmige St.

grandiflorus — großblumige St.

in botanischen Gärten.

Aster XIX, 2. Sternblume

cordifolius — herzblättrige St.

puniceus — purpurfarbige St.

annuus — jährige St.

laevis — glatte St.

mutabilis — veränderliche St.

Tradescanti — Tradescants St.

Novi Belgii — Neu-Holländische St.

tardiflorus — langsamblühende St.

miser — kurzgestrahlte St.

macrophyllus — großblättrige St.

Solidago XIX, 2. Goldrute

sempervirens — immergrüne G.

altissima — höchste G.

procera — lange G.

laterifolia — seitenblumige G.

caesia — bläuliche G.

mexicana — mexikanische G.

flexicaulis — gebogene G.

latifolia — breitblättrige G.

Helenium XIX, 2. Helenie, Bastardsonnenblume

autumnale — Herbst H.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrie

abrotanoides — stabwurzblättrige Schk.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

serotinum — spätblühende W.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

altissima — höchste Ch.

mixta — doppelfarbige Ch.

in botanischen Gärten.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

dodecapetatus — zwölfblättrige S.

strumosus — kropfige S.

giganteus — Riesen S.

altissimus — höchste S.

laevis — glatte S.

divaricatus — ausgesperrte S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbeckie

laciniata — zerschlossene R.

triloba — dreylappige R.

hirta — rauhe R.

purpurea — purpurrothe R.

oppositifolia — entgegengesetztblättrige R.

angustifolia — schmalblättrige R.

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

alata — geflügelte R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

alternifolia — höchste C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Calcitrapa — Sterndistel Fl.

muricata — zackichte Fl.

galactites — Milch Fl.

Silphium XIX, 4. Silphie, unächte Goldblume

laciniatum — zerschlossene S.

perfoliatum — durchwachsene S.

connatum — verwachsene S.

asteriscus — sternblumenartige S.

in botanischen Gärten.

Silphium XIX, 4. Silphie, unächte Goldblume
solidaginoides — goldruthenartige S.
trifoliatum — dreyblättrige S.
terebinthinaceum — harzige S.

Polymnia XIX, 4. Polymnie
canadensis — canadische P.
Vuedalia — virginische P.
tetragonotheca — viereckige P.
Wedelia — Wedelische P.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
sancta — jüdische R.
stellata — sternförmige R.

Lobelia XIX, 6. Lobelie
siphylitica — antivenerische L.
Cliffortiana — Cliffortische L.
Erinus — langgestielte L.
pubescens — weichhaarichte L.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette
orientale — morgenländische Sp.
spinosum — stachlichte Sp.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
albus — weißer A.
graecizans — griechischer A.
melancholicus — melancholischer A.
tricolor — dreyfarbiger A. Papageyfeder
lividus — bleyfarbiger A.
oleraceus — gemüsartiger A.
polygonoides — kleinblättriger A.
hybridus — Bastard A.
paniculatus — rispenförmiger A.

in botanischen Gärten.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

sanguineus — blutrother A.

retroflexus — rückwärtsgebogener A.

flavus — gelblicher A.

cruentus — blutiger A.

parisiensis — Pariser A.

caudatus — Fuchsschwanz A.

spinosus — stachlichter A.

Atriplex XXIII, 1. Melde

portulacoides — Portulak M.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreis

agrestis — Acker E.

arvensis — Feld E.

Valeriana III, 1. Baldrian

officinalis — gebräuchlicher B.

Poa III, 2. Rispengras

annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundsgras

glomerata — gemeines Kn.

Bromus III, 2. Tresp

sterilis — tauber Tr.

tectorum — Dach Tr.

Lycopsis V, 1. Krummhals

arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf

vulgare — gemeiner O.

Campanula V, 1. Glocken

rapunculoides — rapunzelartige Gl.

allenthalben.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum — schwarzer N.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Erysimum XV, 2. Hederich
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblättriger St.

Trifolium XVII, 3. Klee
pratense — Wiesen Kl. Spanischer Kl.

Apargia XIX, 1. Apargie
autumnalis — Herbst A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Intybus — gemeiner W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maßliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

Ptarmica — deutscher Bertram, weißer
Dorant

Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel

urens — kleine Brenn N. Eiter N.

dioica — große getrennte N.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Lycium V, 1. Bocksdorn

Barbarum — Chinesischer B.

Europaeum — Europäischer B.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Gentiana V, 2. Enzian

purpurea — purpurrother E.

bavarica — bayerischer E.

ciliata — gefranzter E.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen

junceum — binsenartiges H.

Peucedanum V, 2. Haarstrang

Alsaticum — Elsassischer H.

Moehringia VIII, 2. Möhringie

muscosa — moosartige M.

Saponaria X, 2. Seifenkraut

ocymoides — rundblättriges S.

lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke

alpinus — Alpen N.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub

globiferum — kugeltragendes H.

Teucrium XIV, 1. Gamander

supinum — kriechender G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

porrifolium — lauchblättriges H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carduus XIX, 1. Distel

parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut

canus — graues Kr.

Artemisia XIX, 2. Beyfußswermuth

Abrotanum — Stabwurzel

Conyza XIX, 2. Dürrewurz

saxatilis — Stein D.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut

pusillum — kleinstes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume

cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

abrotanifolius — stabwurzblätteriges Kr.

Solidago XIX, 2. Goldrute

flexicaulis — gebogene G.

minuta — kleine G.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX. 2. Rindsauge, Streich-
blume

grandiflorum — großblumiges R.

26) Schmarozerpflanzen.

Vacat.

OCTOBER.

1) Am Meerstrande.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
autumnalis — Herbst W.

3) Am Wasser.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gewöhnliche S.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

5) An quellichten Orten.

Vacat.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Drosera V, 6. Sonnentau
rotundifolia — rundblättriger S.
longifolia — langblättriger S.

7) Auf feuchten und sumpfigen
Wiesen.

Gentiana V, 2. Enzian
Pneumonanthe — schmalblättriger Herbst-
Enzian.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften
und Grasplätzen.

Gentiana V, 2. Enzian
campestris — Feld E.
Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B.
Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

9) Auf Sandboden.

Vacat.

10) Auf kleinen Bergen und Anhö-
hen.

Aster XIX, 2. Sternblume
annuus — jährige St.
Amellus — Virgils St.

11) Auf gebauten Äckern.
Vacat.

12) Auf ungebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras
glaucum — graues H.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbiges V. Freysaamenkraut.
arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.
Vacat.

14) In gröfsern und dichten Wäldern.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
sylvaticus — Wald Kr.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Solidago XIX, 2. Goldrute
Virga aurea — gemeine G.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Vacat.

17) An Hecken und Zäunen.

Agrimonia XI, 2. Odermennig*Eupatoria* — gebräuchliche O. Heil aller Welt.

18) An Wegen und Dämmen.

Agrimonia XI, 2. Odermennig*Eupatoria* — gebräuchliche O.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste*tectorum* — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.

Vacat.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Scandix V, 2. Kerbel*Cerfolium* — gemeiner K. Garten K.*Lavatera* XVI, 2. Lavatere*trimestris* — dreymonatliche L.*Fumaria* XVII, 1. Erdrauch*lutea* — gelber E.*Senecio* XIX, 2. Kreuzkraut*elegans* — schönes Kr.*Aster* XIX, 2. Sternblume*ericoides* — heideartige St.

in gewöhnlichen Gärten.

Tagetes XIX, 2. Samtblume

patula — weitausgebreitete S.

erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie

pauciflora — wenigblumige Z.

multiflora — vielblumige Z.

verticillata — wirtelförmige Z.

elegans — schöne Z.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

tuberosus — knollige S. Erdapfel.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

officinalis — gebräuchliche R.

22) In botanischen Gärten.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

linifolium — leinblättriges L.

Vitex XIV, 2. Keuschbaum

Agnus Castus — gemeiner K.

latifolia — breitblättriger K.

Lavatera XVI, 2. Lavatere

trimestris — dreymonatliche L.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus

trionum — aufgeblasener H.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus
africanus — afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.

Tanacetum XIX, 1. Rheinfarn
Balsamita — Frauenmünze.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
aureum — goldfarbiges R.
undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Aster XIX, 2. Sternblume
cordifolius — herzblättrige St.
puniceus — purpurfarbige St.
annuus — jährige St.

Tradescanti — Tradescants St.
miser — kurzgestrahlte St.

Solidago XIX, 2. Goldrute
altissima — höchste G.

procera — lange G.

laterifolia — seitenblumige G.

caesia — bläuliche G.

flexicaulis — gebogene G.

Helenium XIX, 2. Helenie
autumnale — Herbst H.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrle
abrotanoides — stabwurzblättrige Schk.

in botanischen Gärten.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

serotinum — spätblühende G.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie

orientalis — morgenländische S.

dichotoma — zweytheilige S.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

alternifolia — höchste C.

Polymnia XIX, 4. Polymnie

canadensis — canadische P.

Vuedalia — virginische P.

tetragonotheca — viereckige P.

Wedelia — Wedelische P.

Calendula XIX, 4. Ringelblume

stellata — sternförmige R.

Lobelia XIX, 6. Lobelie

siphylitica — antivenerische L.

Cliffortiana — Cliffortische L.

Erinus — langgestielte L.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth

graecizans — griechischer A.

paniculatus — rispenförmiger A.

23) Allenthalben.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St.

allenthalben.

Senecio XIX, 1. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 1. Mafsliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Hamamelis IV, 2. Zauberstrauch

virginica — virginischer Z.

Lycium V, 1. Bocksorn

chinense — Millerischer B.

25) Auf Alpen und andern hohen
Gebirgen.

Vacat.

26) Schmarozerpflanzen.

Vacat.

NOVEMBER UND DECEMBER.

Diese beyden letztern Monate des Jahres sind in den meisten Provinzen Deutschlands wegen der unfreundlichen und kalten Witterung, welche gewöhnlich einzutreten beginnt, der Pflanzenwelt eben so wenig hold und günstig, als die beyden erstern. Deswegen ist auch in ihnen nur eine ganz unbedeutende Ernte für die Pflanzensammlungen zu erwarten. Bloss der *Helleborus niger* ist ihnen beynahe allein eigen, denn die übrigen Pflanzen hat der fleissige Botaniker alle schon in den vorhergehenden Monaten in ihrer Blüthe sammeln können. Ohne auf die in den vorigen Monaten bestimmten Rubriken Rücksicht zu nehmen, sind es nachstehende:

Aphanes IV, 2. Ohmkraut

arvensis — Acker O. — auf Äckern, besonders im Korn.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz

niger — schwarze N. Weynachtsrose —
an steinigen und schattigen Orten in meh-
rern Gegenden, außerdem in Gärten.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

cicutarium — schierlingsblättriger St. —
allenthalben.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart

pratense — Wiesen B. — auf Wiesen und
grasigen Orten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P. — an vielen Orten.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut

vulgaris — gemeines Kr. — allenthalben.

Bellis XIX, 2. Maßliebe

perennis — ausdauernde M. Gänseblümchen
— allenthalben.

Aster XIX, 2. Sternblume

Amellus — Virgils St. — in bergigen Wäl-
dern und Gebüsch.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V. Freysaamenkraut
— auf Brachen.

arvensis — zweyfarbiges V. — auf Brachen.

A N N H A N G.

Die Bestimmung der Pflanzen der neunzehnten Klasse des Linnéischen Sexualsystems macht den Anfängern in der Botanik, wenn sie nicht einen zuverlässigen Rathgeber bey der Hand haben, besondere Schwierigkeiten, weil ein großer Theil der Gattungen derselben in ihrer Blüthe sehr viel Ähnlichkeit mit einander haben.

Ich habe einen Versuch gemacht, ihnen durch nachfolgende Tabellen diese Schwierigkeiten in etwas zu erleichtern, weil sich durch sie die Charaktere der Gattungen, und also auch die Verschiedenheiten der einen von der andern, leichter übersehen, und folglich leichter und richtiger bestimmen lassen. Ich habe weiter nichts hinzu zu setzen, als den unschuldigen Wunsch, daß mir meine Absicht gelungen seyn möge.

H.

Neunzehnte Klasse.

Enthält Pflanzen mit in eine Röhre zusammengewachsenen Staubgefäßen.

Erste Ordnung.

Mit vielen und lauter fruchtbaren Zwitterblümchen in einem gemeinschaftlichen Kelche.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Geropogon</i>	einfach	borstig spreuartig	die Saamen in der Scheibe haben eine gefiederte Haarkrone, die in den Strahlen eine fünfgrannichte.
<i>Tragopogon</i>	einfach	nackend	gefiedert.
<i>Scorzonera</i>	schuppenartig, wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	gefiedert.
<i>Picris</i>	doppelt	nackend	gefiedert.
<i>Sonchus</i>	bauchicht, geschuppt	nackend	haaricht.
<i>Lactuca</i>	walzenförmig, die Blätter am Rande häutig, und dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	gestielt.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Chondrilla</i>	an der Grundfläche mit kleinen Schuppen umgeben	nackend	gestielt.
<i>Prenanthes</i>	an der Grundfläche mit einer Reihe kleiner Schuppen umgeben	nackend	fast gestielt.
<i>Leontodon</i>	längliche, dachziegelförmige Schuppen, wovon die äußern zurückgebogen sind	nackend und punktirt	gestielt und haarförmig.
<i>Apargia</i>	die Schuppen dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	ungestielt u. langgefiedert.
<i>Hieracium</i>	eyförmig	nackend	einfach und ungestielt.
<i>Crepis</i>	doppelt, dessen Schuppen abfallen	nackend	haaricht und gestielt.
<i>Andryala</i>	mehrmal getheilt, zugrundet	filzicht	einfach ungestielt.
<i>Hyoseris</i>	fast gleichförmig	nackend	haaricht mit einer kelcharartigen Decke.
<i>Seriola</i>	einfach	mit spreuarartigen Blättchen besetzt	beynahe gefiedert.
<i>Hypochaeris</i>	schuppenartig, wie Dachziegel übereinander liegend	mit spreuarartigen Blättchen besetzt	gefiedert.
<i>Lapsana</i>	die Blättchen rinnenförmig ausgehöhlt, die Grundfläche mit Schuppen umgeben	nackend	ohne Saamenkrone.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamen - Haarkrone.</i>
<i>Catananche</i>	aus Schuppen bestehend, wie Dachziegel übereinander liegend	fast spreuig	fünfborstig.
<i>Cichorium</i>	an der Grundfläche mit kleinen Schuppen umgeben	etwas mit Spreu besetzt	fünzfähig.
<i>Scolymus</i>	stachlicht, und die Blättchen dachziegelförmig übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
<i>Arctium</i>	kugelrund, mit Schuppen bedeckt, die an der Spitze hakenförmig gekrümmt sind	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
<i>Carduus</i>	bauchicht, dessen wie Dachziegel übereinander liegende Schuppen mit steifen Stacheln versehen sind	haaricht	einfach.
<i>Cnicus</i>	eyförmig, und die stachlichten Schuppen dachziegelförmig übereinander liegend	eben und mit weichen Haaren besetzt	aufsitzend gefiedert.
<i>Onopordon</i>	bauchicht, aus stachlichten Schuppen bestehend	senkrecht durchschnitten wie in Bienenzellen abgetheilt	gefiedert.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamen-Haarkrone.</i>
<i>Cynara</i>	erweitert, aus fleischigen ausgeschnittenen spitzigen Schuppen bestehend, dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	gefiedert.
<i>Carlina</i>	gestrahlt, die Randschuppen lang und gefärbt	mit so viel Zellen als Blümchen besetzt	dreyspaltig, und stark gefiedert.
<i>Carthamus</i>	eyrund, die Schuppen auf der Spitze beynahe eyrundblätterartig liegen dachziegelförmig übereinander	mit Spreublättchen besetzt	einfach.
<i>Serratula</i>	beynahe walzenförmig, die unbewehrten Schuppen wie Dachziegel übereinander liegend	mit ziemlich langen u. flachen Spreublättchen besetzt	bey einigen Arten gefiedert, bey einigen einfach.
<i>Spilanthus</i>	fast gleichförmig	mit spreuartigen Blättern besetzt	zweygrannicht.
<i>Bidens</i>	die Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	aufrechtstehende rauhe Grannen.
<i>Cacalia</i>	länglichlich röhricht, mit kleinen Afterblättchen besetzt.	nackend	gefiedert.
<i>Eupatorium</i>	schuppenartig übereinander liegende Blättchen	nackend	gefiedert.

	Kelch	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Ageratum</i>	länglich, fast gleichförmig	nackend	fünfgrannicht.
<i>Chrysocoma</i>	halbkugelrund, die Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	einfach.
<i>Santolina</i>	halbkugelrund, wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
<i>Athanasia</i>	eyrund, schuppenartig	mit Spreublättchen besetzt	kurz und spreuartig.

Zweyte Ordnung.

Mit fruchtbaren Zwitter- und unfruchtbaren weiblichen Blümchen.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Tanacetum</i>	halbkugelrund, die Blättchen dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	einigermaßen ausgerandet.
<i>Artemisia</i>	rundlichte, schuppenartig übereinander liegende und zusammenschließende Blättchen	haaricht, oder zuweilen fast nackend	ohne Kronen.
<i>Conyza</i>	rundlicht schuppicht	nackend	einfach.
<i>Erigeron</i>	länglich	nackend	haaricht.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamen- Haarkrone.</i>
<i>Tussilago</i>	die Schuppen, welche gleichförmig und so lang als die Scheiben sind, haben einen etwas häutigen Rand	nackend	einfach.
<i>Gnaphalium</i>	schuppicht, die äußern Schuppen sind hohl, rundlicht, häutig, trocken u. gefärbt	nackend	federartig.
<i>Xeranthemum</i>	schuppicht	bey einigen Arten mit Spreublättchen besetzt, bey andern nackend	borstig oder gefiedert.
<i>Carpesium</i>	dachziegelförmig übereinander liegende Schuppen, wovon die äußern zurückgebogen sind	nackend	ohne Krone.
<i>Baccharis</i>	walzenförmig, schuppicht	nackend	einfach.
<i>Senecio</i>	walzenförmig, und besteht aus gleichbreiten, lanzettförmigen, an der Spitze größtentheils geschwärzten oder wie verbrannten Blättchen, und wird an der Grundfläche von einem kleinern Kelch umgeben	nackend	einfach.
<i>Aster</i>	schuppicht, dessen untere Schuppen ausgebreitet sind	nackend	einfach.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamen - Haarkrone.</i>
<i>Solidago</i>	die Kelchschuppen sind geschlossen, u. liegen dachziegel- förmig übereinander	nackend	einfach.
<i>Cineraria</i>	einfach, gleichför- mig, vielblättrig	nackend	einfach.
<i>Inula</i>	aus sehr vielen hoch übereinander liegen- den kleinen Blättern bestehend	nackend	einfach, an einer Art aber doppelt.
<i>Arnica</i>	aus vielen Blättern bestehend	borstig	einfach, ge- fiedert.
<i>Doronicum</i>	die Kelchblätter ste- hen in doppelter Reihe, und sind län- ger als die Scheibe	nackend	einfach bey den Zwitter- blümchen, ohne Krone bey den Strahlen- blümchen.
<i>Bellis</i>	halbrund, mit gleich- förmigen Blättchen	kegelförmig	ohne Krone.
<i>Schkuhria</i>	gleichförmig, ge- wöhnlich fünfblätte- rig	viereckig, mit acht Spreublätt- chen gekrönt, wovon vier wechsels- weise kleiner sind	ohne Krone.
<i>Tagetes</i>	einfach, röhrenför- mig fünfzählig	nackend	fünfgran- nicht.
<i>Zinnia</i>	eyrund, walzenför- mig geschuppt, die Schuppen von ver- schiedener Gröfse	mit Spreu- blättchen be- setzt	zweygran- nicht.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
<i>Chrysanthemum</i>	halbkugelrund, aus häutig geränderten Schuppen bestehend, von verschiedener Gröfse, die wie Dachziegel übereinander liegen	nackend	ein häutiger Rand.
<i>Matricaria</i>	halbkugelrund, die Schuppen gerändert, etwas spitzig, und wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	ohne Krone.
<i>Cotula</i>	blättrig, gleich groß	fast nackend	gerändert.
<i>Anacyclus</i>	blättrig, verschiedener Gröfse	mit Spreublättchen besetzt	ausgerändert.
<i>Anthemis</i>	halbkugelrund, fast gleichförmig	mit Spreublättchen besetzt	ohne Krone.
<i>Achillea</i>	eyrund, die schuppenartigen Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	erhöht, und mit Spreublättchen besetzt	ohne Krone.
<i>Sigesbeckia</i>	doppelt, der äußere enthält fünf lange gleichbreite abstehende Blättchen; der innere ist fünfeckig, und hat ebenfalls fünf kürzere, aufrechte, ey- u. nachenförmige, u. so wie vorige, mit gestielt. Drüsen besetzte Blättchen	mit Spreublättchen besetzt, und ebenfalls mit kleinen gestielten Drüsen versehen	ohne Krone.
<i>Verbesina</i>	doppelt übereinander liegende Blättchen	mit Spreublättchen besetzt	ungleich zweygran- nicht.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamen-Haarkrone.</i>
<i>Euphthalmum</i>	verschieden blätterig, wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	sehr wenig gerändert.

D r i t t e O r d n u n g .

Mit fruchtbaren Zwitter- und unfruchtbaren weiblichen Blümchen.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamenkrone.</i>
<i>Helianthus</i>	viele, fast sparrichte, wie Dachziegel übereinander liegende Blättchen	flach, groß, mit Spreublättchen besetzt	zweyblättrig.
<i>Rudbeckia</i>	eine doppelte Reihe beysammen stehender Schuppen	kegelförmig mit Spreublättchen besetzt	vierzählig.
<i>Coreopsis</i>	aufrecht, aus vielen Blättchen bestehend, und an der Grundfläche mit strahlweise ausgebreiteten Blättern umgeben	mit Spreublättchen besetzt	zweyhörnig.
<i>Centaurea</i>	sehr verschieden, nach den verschiedenen Arten	bald borstig, bald spreuartig, nach den verschiedenen Arten	bald einfach, bald gedoppelt, nach den verschiedenen Arten.

V i e r t e O r d n u n g .

Mit fruchtbaren weiblichen Blümchen im Strahl, und unfruchtbaren Zwittern in der Scheibe.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamenkrone.</i>
<i>Baltimora</i>	walzenförmig, vielblättrig	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar- krone.
<i>Silphium</i>	sparricht	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar- krone.
<i>Polymnia</i>	doppelt, der äußere besteht aus vier bis fünf, der innere aus acht bis zehn ausgehöhlten Blättchen	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar- krone.
<i>Calendula</i>	vielblättrig	nackend	ohne Haar- krone.
<i>Arctotis</i>	die Schuppen liegen dachziegelförmig übereinander, und sind an der Spitze rauschend	rauhhaar- richt, oder mit Spreublättchen besetzt	fünfblättrig.
<i>Filago</i>	schuppicht, und zwischen den Schuppen verschiedene weibliche Blümchen enthaltend	nackend	ohne Saamen- krone.
<i>Micropus</i>	doppelt	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haar- krone.

F ü n f t e O r d n u n g .

Mit Blümchen in einem gemeinschaftlichen Kelche, wovon jedes noch seinen besondern Kelch hat.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamenkrone.</i>
<i>Echinops</i>	viele Kelche auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden	mit Spreublättchen besetzt	gefranzt.

S e c h s t e O r d n u n g .

Mit einzelnen Zwitterblumen.

	<i>Kelch.</i>	<i>Fruchtboden.</i>	<i>Saamenkrone.</i>
<i>Jasione</i>	ein gemeinschaftlicher zehnbblätteriger Kelch, welcher viele Blumen mit einem fünftheiligen Kelche und ähnlicher Krone auf einem zweyfächerichten Fruchtboden enthält	zweyfächericht	ohne Saamenkrone.
<i>Lobelia</i>	fünfspaltig, mit einer einblätterigen Blumenkrone	zwey- und dreyfächericht	ohne Saamenkrone.
<i>Viola</i>	fünfblätterig, mit einer ungleichen fünfblätterigen Blumenkrone	— — —	ohne Saamenkrone.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamenkrone.
<i>Impatiens</i>	zweyblättrig, mit einer fünfblät- rigen ungleichen Blumenkrone mit einem kappenförmigen Honigbehälter nisse	— — —	ohne Saamen- krone.

Berichtigungen.

Seite III. der Vorerinnerung auf der letzten Zeile
ist nach denkenden Anbeter
einzuschalten: des Unendlichen.

S. 20. Zeile 4 lese man statt: zerschitztblätterige
E. — zerschlitztblätterige E.

S. 25. Z. 11. statt: Assodille — Affodille.

S. 26. Z. 15. st. sträubige — strauchichte H.

S. 27. Z. 16. st. Leontadon — Leontodon.

S. 31. Z. 15. st. Hipparis — Hippuris.

S. 32. Z. 30. st. Catha — Caltha.

S. 44. Z. 6. st. Ackerslern — Ackerstern.

Z. 22. st. Teld T. — Feld T.

Z. 24. st. Gänzekraut — Gänsekraut.

S. 67. Z. 24. st. Kottig — Rottig.

S. 77. Z. 15. st. Bellidiastrum — Bellidiasstrum.

S. 84. Z. 22. st. optusifolius — obtusifolius.

S. 93. Z. 29. st. perpasillus — perpusillus.

S. 100. Z. 15. st. Sactuca — Lactuca.

S. 121. Z. 14. st. brausender — berauscher.

S. 127. Z. 13. st. gemeiner weißer Kopf K. — ge-
meiner grüner K.

Z. 14. nach capitata — gemeiner weißer
Kopf K.

Z. 21. st. gonyglodes — gongylodes.

S. 152. Z. 3. st. Kottig — Rottig.

Zum zweyten Hefte.

S. 171. Z. 22. st. trifoliata — trifoliata.

S. 191. Z. 13. st. gelegiformis — galegiformis.

S. 194. Z. 10. st. tinctorium — tinctorum.

S. 200. Z. 14. st. Cacaulis — Caucalis.

S. 209. Z. 22. st. Eupaloria — Eupatoria.

S. 235. Z. 4. st. Laguecia — Lagoecia.

S. 238. Z. 18. st. Vuedo — Vnedo.

S. 269. Z. 28. st. victorialis — victorialis.

S. 297. Z. 5. st. zeocrita — zeocriton.

S. 333. Z. 29. st. ornithopodoides — ornithopo-
dioides.

Bey demselben Verleger, J. Ambr. Barth
in Leipzig, sind auch folgende Werke
herausgekommen und zu haben:

Ebermaiers (D. Joh. Chr.) pharmaceutische Re-
ceptirkunst, oder Anleitung für Apotheker, die
von den Ärzten vorgeschriebenen Arzneimittel
kunstmässig zu bereiten. 8. 20 Gr.

Desselben Tabellarische Übersicht der Kennzei-
chen der Ächtheit und Güte, so wie der Ver-
wechselungen und Verfälschungen sämtlicher
einfachen und zusammengesetzten Arzneymit-
tel zum Gebrauch für Ärzte und Apotheker.
Fol. 2 Rthl.

Funke (Heinr. Christ.) cryptogamische Gewächse
des Fichtelgebirgs in natürlichen Gestalten ge-
sammelt. 1s—4s Heft. 3 Rthl.

Hedwigii (D. Joan.) Species Muscorum frontoso-
rum descriptae et tabulis aeneis coll. LXXVII.
illustratae, opus posthumum edid. D. Frider.
Schwaegrichen. 4. maj. 20 Rthl. Auf Velin-
papier 24 Rthl.

Dieses prächtige Werk zur Kenntniss der
cryptogamischen Pflanzen beschreibt und zerglie-
dert nach der bekannten Methode des Verf. diese
kleinen Gewächse so genau, daß Kenner und
Liebhaber immer neue Nahrung darin wieder fin-
den; zugleich sind diese Gewächse dadurch in eine
gewisse Ordnung gebracht worden, welches ohne
dergleichen Untersuchungen eher nicht möglich
wurde.

Ejusdem theoria generationis et fructificationis
plantarum cryptogamicar. Linnaei c. Tab. XLII.
color. emendata et aucta. 4. maj. 20 Rthl.

Dieses Werk, welches der berühmte Verf.
kurz vor seinem Tode mit vielen neuen Unter-

suchungen vermehrt herausgab, ist die bekannte Preisschrift der Russ. Kaiserl. Akademie in St. Petersburg, wodurch er zuerst den Wachsthum und die Fortpflanzung der kleinen Gewächse nach Grundsätzen deducirte, welche ein ganz neues Licht über die Botanik verbreiteten.

Laicharting (J. Nep.) Manuale botanicum, sistens plantarum Europaearum Characteres generum specierum differentias, nec non earum loca natalia. 2 Tomi. 8. maj. 1 Rthl. 18 Gr.

Dieses Handbuch ist den Botanikern darum besonders wichtig, weil der Verf. nicht nur die Autores citirt, welche die Pflanzen besonders beschreiben, sondern auch durch Zeichen die Standorte, ihren Wachsthum, Fortdauer u. s. w. genau und deutlich bezeichnet.

Schwägrichen (D. Friedr.) Leitfaden zum Unterrichte in der Naturgeschichte für Schulen. 2 Theile, mit 3 Kupfertafeln. 8. 2 Rthl. 4 Gr.

Unter den neuern Handbüchern der Naturgeschichte hat dieses unstreitig sehr wesentliche Vorzüge durch das immer im Zusammenhange vorgetragene System, ohne welches die Naturgeschichte dem Anfänger nie deutlich und anschaulich wird, durch die darin gelieferte Physiologie der Naturgegenstände, die gemeiniglich in allen fehlt, durch die so kurz als genau beschriebenen Kennzeichen jeder Thier- und Gewächsgattung, nebst Anführung ihres Nutzens oder ihrer Schädlichkeit aufs gemeine Leben, u. ihres technischen Gebrauchs. Zugleich ist dem Anfänger durch die Kupfertafeln eine anschauliche Übersicht der vorzüglichsten Thiere und Gewächse nach den Klassenordnungen mitgetheilt worden, die in Schulen auch bequem aufgehangen werden können. Die Einführung desselben in mehrern Schulen scheint auch den nützlichen Gebrauch desselben immer allgemeiner zu machen, den es mit Recht verdient.

Heyne, Friedrich A.

Pflanzen-Kalender oder Versuch einer Anweisung welche Pflanzen man in
jedem Monat in ihrer Blüthe finden könne und auf welchem Standorte

Bd.: Heft 1 (1804) - 2 (1806)

Leipzig 1804

Bamberg, Staatsbibliothek -- Bot.o.183-a
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11437717-1